



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaeptsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaeptsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Drudstykker
af
en mathematisk Lærebog.
I—IV.

Af
J. Christian H. Fischer.

Indbydelseskrift

til
den offentlige Gramen i Slagelse lærde Skole
i Juli 1849.

—♦—
Kjøbenhavn.

Trykt hos Kgl. Høsbogtrykker Bianco Lun o.

Grundstykker



af

en mathematisk Lærebog.

I—IV.

af

J. Christian H. Fischer.



Kjøbenhavn.

Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Lunio.

1849.

Forord.

Det hænder sig oftere for Mathematik-Læreren, idet han skal fremsette Videnskabens Indhold efter en bestemt Lærebog, at han kan savne noget ved denne, eller at en ny Bei til Maaleet kan vise sig for ham. Denne kan han da strax indslæge, og prøve dens Værd for Underviisningen; er den tjenlig, vil han følge den ogsaa for Fremtiden, og den formeentlige Mangel vil han søge at afhjælpe. Saaledes bliver han efterhaanden Lærebogens Fremstilling noget utro, og uden at derfor enhver Lærer kan give en heel ny Bog, kan han have Lyft til at fremlægge for Andre hvad han selv har prøvet, og troer at have befundet godt. Saaledes ere efterfølgende Brudstykker fremkomme, hvis Bestemmelse nærmere skal blive angivet ved hvert enkelt.

I.

Addition og Subtraction af Sum og Differents.

Bed Addition og Subtraction af Sum og Differents føres Disciplen først ind i Behandlingen af Bogstavstørrelser, og vil man her strax, inden han endnu er fortrolig med Bogstaverne og deres Betydning, lære ham Neglerne at hænde gennem en mathematisk Slutningsrække, da taber han Traaden, og det kommer tilsynে, hvilken Forstsel der er paa at funne føre et Bevis, og paa at fatte dets Beviskraft. Giver man derhos enkelte Negler, forvirres han ved disses Mængde. Det er Hensigten med efterfølgende Fremstilling, at gjøre dette for Begyndere saa vanffelige Afsnit let fatteligt, ved at gjøre Beviserne saa umiddelbare som muligt, og let overstueligt. Da jeg bruger Bergs Lærebøger her i Skolen, har jeg affattet den netop i en saadan Form, at den omtrent kan træde istedetfor det tilsvarende Afsnit i Bergs Bog. Jeg giver kun et Par Exempler, men vil anbefale lignende.

§ 1. En fleerleddet Størrelse har man vedtaget iffe blot at løse i Ordenen fra Venstre til Heire, men ogsaa at beregne esterhaanden som dens enkelte Størrelser følge paa hverandre.

$a + b - c - d + e \dots$ betyder, at til a skal lægges b , fra det Udkomme drages c , derfra igjen d , til det Udkomme lægges e o. s. v. Derimod maa man ikke til Ex. først lægge e til d , og saa subtrahere det Udkomme. Vil man tilfjendegive, at dette skal skee, da sætter man en Parenthes om $d + e$.

En Parenthes tilfjendegiver nemlig i Mathematiken, at de i samme indesluttede Størrelser skulle betragtes som een med Hensyn til en vis Regningsart; altsaa her at d og e skulle betragtes som een med Hensyn til den ved det foranstaende Minus tilfjendegivne Subtraction. Dersom man havde med Tal at gjøre, vilde man bringe dem til at være een Størrelse ved at udføre Additionen, f. Ex. $16 - (9 + 2) = 16 - 11 = 5$; men da Bogstaver funne gjælde for hvilkesomheft Tal, lader Sammentællingen der sig kun angive. Den i Parenthesen angivne Beregning maa altsaa tænkes udført først, inden der skrides til at udføre den, der er tilfjendegivet ved det Tegn, hvortil Parenthesen har Hensyn.

§ 2. Har man allerede dannede Summer og Differentser, som man vil addere og subtrahere, da maa dette angives ved Hjælp af Parenthesen. F. Ex.: Til det Tal a at addere Summen af c og b , og derfra drage Differentien mellem p og q , skrives

$$a + (b + c) - (p - q).$$

Bed saadanne Størrelser bliver det øste af Vigtighed, at funne tilfjendegive deres Værdie uden denne særegne Beregningsmaade, ellers med andre Ord at slappe Parenthesen bort.

Den kan paa to Maader have Hensyn til Addition og Subtraction, idet enhver af disse Regningsarter kan være sat i Forbindelse med den ved et forangaaende eller efterfølgende Tegn, og det bliver da at overveie, 1, hvorvidt egentlig nogen særegen Beregningsmaade er angiven ved Parenthesen, og

2, hvilken Indflydelse denne i saa Tilfælde har paa Størrelsens Verdi.

§ 3. Tilfældene blive:

A, Parenthesen har Hensyn til et efterfølgende Tegn.

- 1) $(a + b) + c$
- 2) $(a - b) + c$
- 3) $(a + b) - c$
- 4) $(a - b) - c$

I alle disse fire Tilfælde vil man let see, at Parenthesen kun udtrykkeligt tilhjælper, hvad der dog staaer alligevel. Saaledes betyder $(a - b) - c$, at fra a skal drages b, og fra det udkomme igjen c; men det selv samme angiver $a - b - c$. Man har derfor:

- 1) $(a + b) + c = a + b + c$
- 2) $(a - b) + c = a - b + c$
- 3) $(a + b) - c = a + b - c$
- 4) $(a - b) - c = a - b - c.$

Parenthesen kan derfor stedse udslettes uden videre Forandring, forsaavidt den har Hensyn til et efterfølgende Additions- eller Subtractions-Tegn.

Et Eksempel. Igaar føjte jeg nogle Tønder Havre, hvoraf jeg dog strax tog noget til at fodre med. Idag har jeg etter føjte nogle Tønder. Hvorledes skal jeg nu ved et almindeligt Udtryk angive den Maade, paa hvilken man kan beregne, hvormeget der er i Behold? Kalder jeg nu de først føjte Tønders Antal a, Antallet paa dem, jeg har taget til at fodre med, b, da er Beholdningen fra igaar $(a - b)$ Tønder; lægges nu dertil de idag føjte, som vi ville betegne ved c, da udkommer $(a - b) + c = a - b + c.$

§ 4. B, Parenthesen har Hensyn til et forangaardende Tegn.

- 5) $a + (b + c)$
- 6) $a + (b - c)$
- 7) $a - (b + c)$
- 8) $a - (b - c)$

Med Hensyn til Beregningsmaaden, da angiver Parenthesen her en Afsigelse fra den, der vilde haves uden samme, idet Størrelserne $b + c$ og $b - c$ beregnete til een skulle lægges til eller drages fra a .

Hvad den hele Størrelses Værdie angaaer, da vil den forandrede Beregningsmaade ingen Indflydelse have i 5) og 6), men derimod i 7) og 8). Vi gjennemgaae de enkelte Tilfælde.

5) $a + (b + c)$ betyder, at naar a er opoldt i Talræffen, skal deraf tælles $(b + c)$ Enheder fremad; men derved tælles, uagtet b og c ere lagte sammen til eet Tal, først b , saa c fremad. Er $b = 9$, $c = 16$, skal jeg tælle 25 Enheder fremad; men derved tæller jeg dog først 9, saa 16 fremad. Uden at Størrelsens Værdie forandres, kan da $a + (b + c)$ skrives $a + b + c$.

6) $a + (b - c)$ betyder, at naar c er draget fra b , skal det Udkomme lægges til a . c vil her komme til at formindse Resultatet, idet denne Størrelse formindsker b , der skal foruge a ; men det samme vil den, naar ingen Parenthes skrives, og c da skal drages fra $(a + b)$. $a + (b - c) = a + b - c$.

I begge disse Tilfælde komme altsaa de samme enkelte Størrelser til at foruge eller formindse det Heles Værdie, enten der staaer Parenthes eller ikke, hvorfaf da følger, at naar Parenthesen har Hensyn til et forangaardende Plus, kan den og det til samme svarende Tegn utslettes, uden at Størrelsens Værdie derved forandres. Man erindre kun, at naar den

første Størrelse i Parenthesen intet Fortegn har, da er et Plus foran den udeladt, som altsaa maa skrives.

§ 5. 7) $a - (b + c)$ betegner, at naar man har opoldt a i Talsætten, skal der tælles $(b + c)$ Enheder tilbage; men dette (see § 4. 5)) er det samme som at tælle b og saa c Enheder tilbage, hvilket sidste maa udtrykkes ved at skrive $a - b - c$.

8) $a - (b - c)$ betyder, at a skal opledes i Talsætten, og deraf tælles de Enheder, der udkomme, naar c er talt fra b . Idet c her formindsker den Størrelse b , som skal formindskes a , kommer den til at forsøge Resultatet med ligesaa mange Enheder, som den selv indeholder, og man vil deraf faae det samme ud, naar man først tæller hele Tallet b fra a , og derpaa legger c til. Man kan da skrive Størrelsen $a - b + c$.

I de to sidste Tilfælde, nemlig naar Parenthesen har Hensyn til et forangaaende Minus, angiver den ikke blot en forandret Beregningssmaade, men ogsaa en forandret Værdie, idet uden dens Tilstedeværelse b vel i begge Tilfælde vilde være at subtrahere, men c i 7) at addere og i 8) at subtrahere, medens netop det Omvendte bor skee; og tager man det Tegn, hvortil Parenthesen har Hensyn, bort tilligemed den, da vil det Omvendte være angivet i begge Tilfælde baade med b og c . De Størrelser altsaa, der i de to sidste Tilfælde forsøge Parenthesens Værdie betrægtet for sig alene, formindsker den hele Størrelses, og de, som formindsker hüns, forsøge dennes. Heraf fremgaaer da følgende Regel: har Parenthesen Hensyn til et forangaaende Minus, kan saavel den som Fortegnet udflettes, naar alle Størrelserne i Parenthesen gives modsat Fortegn.

$$5) \quad a + (b + c) = a + b + c$$

$$6) \quad a + (b - c) = a + b - c$$

$$7) \quad a - (b + c) = a - b - c$$

$$8) \quad a - (b - c) = a - b + c$$

Oversigt. Har Parenthesen Hensyn til et efterfølgende Plus eller Minus, kan den udelades uden videre. Har den Hensyn til et forangaaende Plus, kan den og Fortegnet udelades. Har den Hensyn til et forangaaende Minus, kan den og Fortegnet udelades, naar alle Tegn i Parenthesen forandres til det Modsatte.

Et Exempel. Hos A. beholdt jeg ved vor sidste Afregning tilgode 300 Nbdl.; senere har jeg faaet af ham 20 Tdr. Rug à 5 Nbdl., hvorimod han har modtaget 4 Tdr. Kalf à 2 Nbdl. Hvorledes staer nu vort Regnskab? Jeg har tilgode 300 Nbdl. — (100 Nbdl. — 8 Nbdl.) eller 300 Nbdl. — 100 Nbdl. + 8 Nbdl.

§ 6. Dersom Parenthesen indeholder fleerleddede Størrelser af en anden Form, end de ovenfor betragtede, behøver man fun ligesom der at overveie, hvilken Indflydelse hver enkelt Størrelse i Parenthesen har paa dens Værdie betragtet for sig, og paa den hele Størrelsens Værdie, og man vil da stedse finde, at de samme Størrelser, der forsøge Parenthesens Værdie, ogsaa forsøge hele Størrelsens, undtagen naar den har Hensyn til et forangaaende Minus, og deraf vil da fremgaae, at de samme Regler, som indeholdes i Oversigten § 5, ere gjældende, hvilke fleerleddede Størrelser Parenthesen end indeholder.

$$a + (m - n - p + q) = a + m - n - p + q$$

$$p - (q + r - s - t) = p - q - r + s + t. \quad *$$

§ 7. Har samme Parenthes Hensyn til to Fortegn, baade et forangaaende og et efterfølgende, da anstille man Betragtninger for hvert især. I Størrelsen $p + (a + b - c) + q$ kan Parenthesen udelades baade med Hensyn til det forangaaende og efterfølgende Plus. I $(a - b - c) - (p + q) - (m - n)$ have Parentheserne om $p + q$ og $m - n$ Hensyn til forangaaende Minustegn, og de kunne derfor kun udelades tilligemed deres

Tegn, naar Tegnene forandres i begge Parentheser; men at Parenthesen om $p+q$ ogsaa har Hensyn til det efterfølgende Minus, gjør ingen Forandring i Størrelsens Værdie. Man har da

$$(a-b-c)-(p+q)-(m-n) = a-b-c-p-q-m+n.$$

§ 8. Naar a opledes i Talræffen og dertil tælles b, udkommer det samme, som naar b opledes i Talræffen og dertil tælles a, altsaa er $a+b = b+a$. En lignende Betragtning lader sig anstille over flere Addender. Men har jeg Størrelsen $a-b+c$, da finder jeg ogsaa der, at det er ligemeget, om jeg først tæller b tilbage i Talræffen fra a, og derpaa c frem, eller først c fremad, og derpaa b tilbage. Altsaa er

$$a-b+c = a+e-b = c+a-b,$$

og i Almindelighed vil man funne omfattet en fleerleddet Størrelses Ved paa en hvilkensomhelst Maade, naar fun hvert beholder sit Fortegn, da dog saaledes de Størrelser, der skulle forsøge, komme til at forsøge, og de, der skulle formindsk, komme til at formindsk. Ja man kan selv skrive $a-b+c$ som $-b+a+c$, eller $a-b$ som $-b+a$, skjondt det da ikke er nogen naturlig Betegnelsesmaade, at skrive det, der skal drages fra, førend man skriver det, hvorfra der skal drages.

$$a-(b-c) = a-(-c+b) = a+c-b.$$

Heraf fremgaaer den almindelige Regel, at i en fleerleddet Størrelse er Leddenes Orden vilkaarlig.

§ 9. Det er af Vigtighed at funne gjenkende en Størrelse i de forskellige Skiftelser, hvori den kan lade sig fremstille ved de mathematiske Betegnelser, og dorför, naar den er given i een Form, at funne slutte sig til de øvrige, hvori dens Værdie lader sig udtrykke. Vi have ovenfor vist, hvorledes en ved en Parenthes angiven særegen Beregningsmaade kan føres tilbage til den almindelige, som følger af Leddenes Orden;

men det kan ogsaa være af Vigtighed, at funne angive en anden Sammentælling end den, som følger af hün, hvorved da de af Leddene, med hvilke Afsigelsen skal skee, maae indesluttes i Parenthes. Her blive de samme Hensyn at tage som ovenfor. Man kan uden nogen videre Forandring sætte en Parenthes om Størrelser, naar den kun faaer Hensyn til et efterfølgende Plus eller Minus.

$a - b + c - d$ kan skrives $(a - b) + c - d$ eller $(a - b + c) - d$; thi derved tillængetegnes kun udtrykkeligt, hvad der staaer alligevel.

Vil man sætte den tilliggemed et forangaaende Tegn, da kan dette skee uden videre Forandring, naar Tegnet er Plus. Saaledes er

$$a - b + c - d = a + (-b + c - d) = a - b + (+c - d),$$

hvilket sidste med Udeladelse af Plus foran c kan skrives

$$a - b + (c - d).$$

Men sættes der et Minus foran, da maae alle Tegn forandres ved de Led, der komme i Parenthesen.

$$\begin{aligned} a - b + c - d &= a - (b - c + d) \\ &= a - b - (-c + d) \\ a - p - q - r &= a - (p + q + r). \end{aligned}$$

II.

Negative Størrelser.

Efterfølgende Fremstilling af de negative Størrelser troer jeg at have den Fordeel, at den nære flutter sig til det tidlige Disciplen Besjendte, at den er simpel, og at der er Enhed i den. Den vil kun afgive fra den almindelige indtil Divisionen, hvorfor den ikke er fortsat længere.

§ 1. Af Additionsligningen $a + b = c$ have vi udledt den nye Regningsart Subtraction, der angives ved Ligningen $a = c - b$. Idet man nu her maa tælle b Enheder fra c for at komme til a, gaaer en Enhed af c bort for hver Enhed, b indeholder; og tænker man sig derfor, at c og b samtidigt forsøges een eller flere Enheder, da vil derved a forblive uforandret; thi de Enheder, hvormed c forsøges, gaae ud imod dem, hvormed b forsøges. Men forsøges c alene, da vil a forsøges ligesaameget, og forsøges b alene, da vil a formindses ligesaameget. Efter det Forhold, hvori c og b saaledes ere stillede til hinanden, at den enes Enheder ophæve den andens, at den enes Forsøgelse har den modsatte Indflydelse af den, den andens medfører, faldes de modsatte Størrelser.

§ 2. I en Different, saadan som den fremkommer af Additionsligningen, vil Minuenden stedse være større end Subtrahenden, og Resten derfor stedse være af eens Beskaffenhed; men tænker jeg mig Differentsens Størrelser at være hvilkesomhelst, da vil Modscætningen ogsaa kunne komme tilsynে i Resten. Untage vi da først i Differensen $c - b$, at c er større

end b, og lig $b + p$, saa have vi ved at lade Genhederne af b gaae ud imod de tilsvarende i c

$$1) \quad c - b = p - 0;$$

antages c lig b, have vi paa samme Maade

$$2) \quad c - b = 0 - 0;$$

og endelig b større end c, og lig $c + p$, da vil, naar c Genheder i begge Led gaae ud imod hverandre, udkomme

$$3) \quad c - b = 0 - p.$$

§ 3. Da Resultatet af 2) er 0, vil derom Intet videre være at tale, og det bliver da $p - 0$ og $0 - p$, hvorpaa vi skulle henvende Æpmærksomheden.

I $p - 0$ maa aabenbart p være af samme Bestaffenhed som c, der svarer til Summen ved Additionen, og derfor er af samme Bestaffenhed som Addenderne; men i $0 - p$ maa p være af samme Bestaffenhed som Subtrahenden og derfor modsat $p - 0$. For at angive Modsatningen, falder man $p - 0$ en positiv Størrelse og betegner den ved Additionstegnet som $+p$, hvorimod $0 - p$ faldes en negativ Størrelse og betegnes ved $-p$. Dog udelades Plus her under samme Betegnelse som Additionstegnet, nemlig hvor det skulle begynde en fleerleddet Størrelse, og figer man blot p i en Forbindelse, hvor der kan være Tale om Modsatning, da menes $+p$.

§ 4. Under Modsatningen mellem Minuend og Subtrahend henhøre alle virkelig forekommende (concrete) Størrelser, der sammenlignede hæve hinanden, og vi kunne derfor i disse føge Exemplar paa det Udviklede. Saaledes Formue og Gjeld. Naar jeg opgjor mit Regnskab, vil jeg sætte min Formue som Minuend, min Gjeld som Subtrahend, og det kan da saavel hænde sig, at Resultatet kommer til at svare til $-p$, som til $+p$. Da imidlertid den Mand, med hvem jeg har Mellemregning, naar han opgjor sit Regnskab, maa ombytte

Subtrahend og Minuend, og saaledes komme til et Resultat, der med Hensyn til Fortegn er mit modsat, saa indsees det, at samme Størrelse forskelligt betragtet maa betegnes suart med Plus, snart med Minus; ligesom det da ogsaa er i og for sig ligegyldigt, hvilket Tegn man anvender, da det kun er Modsetningen, der skal angives. Men man har vedtaget at betegne det virkeligt for mig Tilstedeværende, det som angiver, hvad der stemmer overeens med mit Ønske, min Fordeel o. s. v., med Plus, og det Modsatte med Minus. Seer man ved et Resultat kun hen til den blotte Talværdie, betragter man det absolut. Saaledes maa det Resultat, hvortil To, der opgjøre deres Mellemregning, komme, absolut betragtet være det samme. Hvor ingen Modsetning er tilstede, maa Betragtningen altid blive absolut.

§ 5. I Geometrien ville vi møde et Exempel ved Talangivelser paa Linier, der fra et Punkt gaae ud i modsat Retning. Antage vi, at en vis Retning, f. Ex. den til Høire, er den positive, da maa enhver Talangivelse af Fremstridt mod Venstre være negativ, det være sig nu, at disse Fremstridt begynde fra det ovennevnte Punkt, eller et andet Sted i Linien; men kun med udtrykkelig Hensyn til Fremstridt ad den modsatte Bei er den sidste Retning negativ. Uden saadan Forbindelse er Liniens Længde et absolut Tal. Tallenes positive og negative Værdier ere derfor deres relative Værdier. Ved en horizontal Linie kan Modsetningen stundom udtrykkes ved Frem og Tilbage, ved en vertical Linie ved Op og Ned.

§ 6. Tænke vi os Talræffen begyndende med en uendelig stor Størrelse og derpaa aftagende, have vi tidligere anset den for endt ved Nul; men dens Aftagen maa nu fortsættes ogsaa ud over denne Grænse gennem Ræffen af de negative Tal til $-\infty$. Denne Talræffens Aftagen fra 0 til $-\infty$ er en

Voren i absolut Forstand. De to i § 5 omtalte Linier, der fra et Punkt (Nulpunktet) strække sig i modsat Retning, give udmaalte ved en Enhed et Billede af den udvidede Talrække.

§ 7. Neglerne for Addition og Subtraction ere tidligere kun udviklede for absolute Tal, hvorfor det er nødvendigt at overveie, hvilke nærmere Bestemmelser der maae gjøres med Hensyn til relative Størrelser. Disse ville let erholdes, naar man kun stadigt tager Hensyn til, at saavel den positive som den negative Størrelse ere Resultaterne af en med forskelligt Udfald hævet Modsatning, eller at $+p$ er lig $p - 0$, og $-p$ er lig $0 - p$.

Saa længe vi kun betragtede Tallene absolut, betegnede vi stedse $p - 0$ kun ved p , hvorfra man allerede kan indsee, at Neglerne for de absolute Tal uden videre lade sig overføre paa de positive. Vi gjennemgaae de forskjellige Tilfælde af Addition og Subtraction, og udelade Parentheserne, hvor disse skulle have Hensyn til et efterfølgende eller foranstaende Plus, eller et efterfølgende Minus. Den positive Størrelse a betegne vi ved $(+a)$, den negative ved $(-a)$, for ikke at forvirre Tegnene.

§ 8. Addition.

- 1) $(+a) + (+b) = a - 0 + b - 0$, der, da 0 som Addend og Subtrahend ikke skrives, er lig $a + b$.
- 2) $(+a) + (-b) = a + 0 + 0 - b = a - b$
- 3) $(-a) + (+b) = 0 - a + b - 0 = -a + b = b - a$
- 4) $(-a) + (-b) = 0 - a + 0 - b = -a - b = -(a + b)$.

Subtraction.

- 5) $(+a) - (+b) = a - 0 - (b - 0) = a - 0 - b + 0 = a - b$

- 6) $(+a) - (-b) = a - 0 - (0 - b) = a - 0 - 0 + b$
 $= a + b$
- 7) $(-a) - (+b) = 0 - a - (b - 0) = 0 - a - b + 0$
 $= -a - b = -(a + b)$
- 8) $(-a) - (-b) = 0 - a - (0 - b) = 0 - a - 0 + b$
 $= -a + b = b - a.$

Det kan ingen Twivl være underført, at Resultatet af 1) og 6), nemlig $a + b$, er en positiv Størrelse, eller at Resultatet af 4) og 7), nemlig $-(a + b)$, er en negativ Størrelse; men om Resultatet af 2) og 5) $a - b$, og af 3) og 8) $b - a$ er positivt eller negativt, maa beroe paa Forholdet imellem a og b.

$$\begin{aligned} (+5) - (+8) &= 5 - 8 = -3 \\ (-5) + (+8) &= -5 + 8 = +3 \\ (-8) - (-5) &= -8 + 5 = -3 \\ (+8) - (-5) &= 8 + 5 = +13. \end{aligned}$$

Man lægge Mærke til, at det at addere en positiv og at subtrahere en negativ Størrelse er eensbetydende, og ligeledes det at addere en negativ og at subtrahere en positiv Størrelse.

$$\begin{aligned} a + (+b) &= a - (-b) \\ a + (-b) &= a - (+b). \end{aligned}$$

§ 9. Multiplication. Neglerne udledes ved i et Product af to Differenter at antage visse Størrelser lig 0. Man har

$$(a - b) (c - d) = ac - bc - ad + bd.$$

Antages her $b = d = 0$, haves

- 1) $(a - 0) (c - 0) = (+a) (+c) = ac - 0 - 0 + 0$
 $= ac - 0 = +ac.$

Antages $b = c = 0$, haves

- 2) $(a - 0) (0 - d) = (+a) (-d) = 0 - 0 - ad + 0$
 $= 0 - ad = -ad.$

Antages $a = d = 0$, haves

$$\begin{aligned} 3) \quad (0 - b)(c - 0) &= (-b)(+c) = 0 - bc - 0 + 0 \\ &= 0 - bc = -bc. \end{aligned}$$

Antages endelig $a = c = 0$, haves

$$\begin{aligned} 4) \quad (0 - b)(0 - d) &= (-b)(-d) = 0 - 0 - 0 + bd \\ &= +bd. \end{aligned}$$

Man seer altsaa, at samme Fortegn give et positivt Product, forskellige et negativt.

III.

Forholds lær e.

Bed Udviklingen af Proportionslæren gif man tidligere ud fra et Forhold, hvilket man fremstillede som noget ganske nyt, der dog lejlighedsvis sløges sammen med en Brøk; nu gør man en Proportion færdig, uden at tale et Ord om et Forhold, blot som en Lighed af to Brøker, og henfaster da i Udviklingens Løb paa et eller andet Sted den Bemærkning, at en Brøk ogsaa kaldes et Forhold, og i en Anmærkning tales da lidt mere herom. Jeg vil ikke tale om det Skjæve heri, men om det Uhensigtsmæssige har sikkert enhver Lærer overtydet sig, allerede ved den Anwendung af Proportionslæren, som Geometrien indeholder; da det snart viser sig, at Disciplinen fejer sig fremmed, naar han skal undersøge Forholdenes Størhed, og af ligestore Forholde danne en Proportion. Physisken vil yderligere godtgjøre Manglen; men ikke engang den praktiske

Regning kan lade sig begrunde uden en Forholdsstørrelse. Efterfølgende vil jeg bede betragtet som et Forslag til en saadan.

§ 1. Sammenligner man to Størrelser, for at erfare, hvormange Gange den ene er større end den anden, da siges man at betragte Forholdet imellem dem. Men det, hvormange Gange den ene er større end den anden, hvorofste den ene er indeholdt i den anden, maa bestemmes ved Division. Forholdet imellem de to Størrelser a og b maa derfor udtrykkes ved $a:b$ eller $\frac{a}{b}$, og man vil indsee, at det er den selv samme Sag, man undersøger, naar man taler om Forholdet mellem a og b , det er, hvorofste b er indeholdt i a , og naar man taler om Brøken $\frac{a}{b}$; sun Betragtningsmaaden er forskellig. Svaret paa det Spørgsmaal, som Forholdet indeholder, gives i Brøken $\frac{a}{b}$, der er Resultatet af Sammenligningen, eller Angivelsen af Forholdets Størrelse, og kaldes dersor dets Exponent.

Et Forhold underfaestes alle Regningsarter paa samme Maade som en Brøk.

§ 2. De Størrelser, der sammenlignes, funne være enten begge ubenævnte, eller begge af samme Navn. Exponenten, Forholdets Størrelse, bliver i begge Tilfælde at udtrykke som et ubenævnt Tal. En Sammenligning derimod imellem et abstract og et concret Tal, eller to forskelligt benævnte, er ikke mulig.

Betegner b et benævnt, u et ubenævnt Tal, da har Brøken $\frac{b}{u}$ Mening, men ikke Forholdet. Hverken Brøken eller Forholdet $\frac{u}{b}$ har Mening.

Naar en Brok altsaa indeholder den Opgave, at dele en Størrelse i et vist Aantal ligestore Dele, har den Intet tilfælles med et Forhold.

§ 3. Ogsaa to allerede dannede Forholde, som $\frac{a}{b}$ og $\frac{c}{d}$, funne gjøres til Gjenstand for en Sammenligning, naar man nemlig ønsker at vide, om det er det samme eller et andet Forhold, der finder Sted imellem a og b, c og d. Dette udfindes ved at undersøge de i begge Forholde sammenlignede Gjenstandes Afhængighed af hverandre, eller ved at sammenholde Forholdenes Exponenter; viser det sig, at disse ere ligestore, maae Forholdene ogsaa være det, og funne altsaa forbindes ved Lighedstegnet. Denne Forbindelse kaldes en Proportion, og betyder, at ligesaa mange Gange som b er større eller mindre end a, er ogsaa d større eller mindre end c; eller med andre Ord, samtidigt og paa samme Maade, som a kan tænkes at være voxet (eller aftaget) for at blive til b, maa ogsaa c voxere (eller aftage) for at blive til d. To saadanne Forholde kalde vi overensstemmende.

Sammenligner jeg Forholdene imellem en forstjellig Mængde Arbeidere og den Daglon, der skal gives disse, da finder jeg, at samtidigt og paa samme Maade, som Arbeidernes Aantal forsøges eller formindskes, maa ogsaa Arbeidslønnen forsøges eller formindskes: saamange Gange flere Arbeidere, saamange Gange større Daglon; og heraf slutter jeg da, at Forholdet mellem Arbeidernes Aantal maa danne en Proportion med Forholdet mellem de Summer, der skulle gives dem som Daglon.

Fire Linier funne danne en Proportion, naar man, ved at undersøge deres indbyrdes Deleslighed to og to, har fundet, at de forholde sig som de samme ubenævnte Tal. Er Enheden indeholdt 6 Gange i Linien p, 7 Gange i q, da vil Ex-

ponenten i Forholdet $\frac{p}{q}$ være Brøken $\frac{6}{7}$; men betragtes $\frac{6}{7}$ som et Forhold, da danner $\frac{p}{q}$ en Proportion med det, $\frac{p}{q} = \frac{6}{7}$, hvor da det sidste Forhold indeholder Bestemmelser af det første. Skal Forholdet mellem Linierne m og n danne en Proportion med det mellem p og q, da maa samme eller en anden Linieenhed være indeholdt 6 Gange i m, 7 Gange i n.

§ 4. Det vil indsees af den foregaaende Paragraph, at alle Læddene i en Proportion funne være bencævnte, men at sun Læddene i samme Forhold behøve at være censbencævnte; ligeledes funne det ene Forholds Led være bencævnte, det andets ubencævnte, endelig alle Led ubencævnte. Men ere alle Led bencævnte i Proportionen $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, da kan det, at $ad = bc$, sun være at forstaae om deres Talværdier abstract betragtede, og det samme maa fastholdes, hvis man ombytter Læddene i en Proportion saaledes, at ueensartede Størrelser komme i samme Forhold; hvorimod det, at $a = \frac{bc}{d}$, kan ret overvejet i alle Tilfælde have Mening.

§ 5. Det er naturligvis ingenlunde altid Tilfældet, at man ved at sammenligne to Forholde kominer til det i § 3 omtalte Resultat. Men vi maae indfrænke os til at betragte de mærkelige Tilfælde, som funne forekomme, og vælge først det, der giver et Resultat modsat det nyscævnte.

Sammensigner jeg altsaa to Forholde $\frac{a}{b}$ og $\frac{m}{n}$, og finder derved, at samtidigt og paa samme Maade, som a kan tænktes at være voxet eller aftaget for at blive til b, er m respective aftaget eller voxet for at blive til n, da maae Exponenterne i disse Forholde være at udtrykke ved to Brøker, der ere hinandens

omvendte, og Forholdene selv faldes derfor ogsaa omvendte Forholde.

Exempel. Reise to Personer det samme Stykke Bei med forskellig Hastighed, og jeg sammenligner Forholdet mellem disse Hastigheder med Forholdet mellem de til Reisen anvendte Tider, da finder jeg, at samtidigt med at Hastigheden forsøges, formindskes den Tid, der medgaaer til Reisen, og at denne Formindskelse dernæst steer paa samme Maade som Hastighedens Forsøgelse: med dobbelt saa stor Hastighed, kun den halve Tid. Ved Reiser med forskellig Hastighed ere derfor Hastighedernes og Tidernes Forholde hinandens omvendte (hvilket ikke her udtrykkes saaledes, at Hastigheden og Tiden ere i omvendt Forhold).

Hør at to Forholde af denne Beskaffenhed skulle danne en Proportion, maa det ene inverteres.

§ 6. Fordi to Forholde samtidigt af= eller tilstage, er det ikke sagt, at dette steer paa samme Maade. Det kan saaledes hænde sig, at Exponenten i et Forhold er lig Productet af flere andre Forholdes Exponenter, og hønt Forhold siges derfor at være sammensat af disse. Ved et sammensat Forhold forstaaes altsaa et saadant, der bestemmes ved Productet af flere andre Forholde. At Forholdet $\frac{a}{b}$ er sammensat af Forholdene $\frac{m}{n}$, $\frac{o}{p}$, $\frac{q}{r}$ betegnes paa een af følgende Maader:

$$a:b = \begin{cases} m:n \\ o:p \text{ eller } \frac{a}{b} = \frac{m}{n} \cdot \frac{o}{p} \cdot \frac{q}{r} = \frac{moq}{npr} \\ q:r, \end{cases}$$

Dersom de enkelte Forholde, der danne det sammensatte, ere ligestore, saa at man har $m:n = o:p = q:r$, da funne

de indsættes istedetfor hverandre, og man faaer da $a:b = \begin{cases} m:n \\ m:n \\ m:n \end{cases}$

eller $a:b = m^3:n^3$.

Man siger da, at to Størrelser forholde sig som Quaderne eller Kuberne af to andre. Betegner A og a Arealerne af to Cirkler, hvis Radier ere R og r, da haves

$$A = R^2\pi$$

$$a = r^2\pi$$

$$\frac{A}{a} = \frac{R^2\pi}{r^2\pi} = \frac{R^2}{r^2},$$

hvoraf igjen følger $\frac{R}{r} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{a}}$.

Ligeledes har man, at to Kuglers Volumina forholde sig som Radiernes Kuber. Ere Kuglerne G og g, har man

$$\frac{G}{g} = \frac{R^3}{r^3}, \text{ altsaa } \frac{R}{r} = \frac{\sqrt[3]{G}}{\sqrt[3]{g}}.$$

Anm. At $A = R^2\pi$, er et Resultat, der er erholdt ved Propor-
tionslæren; ligelæs at $G = \frac{4}{3}R^3\pi$. Disse Resultater have vi ovenfor
benyttet, ved Division dannet Broker, og da læst disse som Forholde.

§ 7. I et Forhold funne alle Størrelser sammenlignes,
der lade sig henføre til Begrebet Tal, og Sammenligningen
sker da ved en nsiagtig Overveielse af Gjenstandenes Bestem-
melser, hvilke derefter udtryffes i Forholdene.

Sammenlignes to Flader, hvis Bestemmelser ere Længde
og Brede, da maa man søge at udtrykke i Tal Forholdene
mellem deres Længder og Breder, og Forholdet mellem Fladerne
vil da være sammensat af disse to. Denne Undersøgelse bliver
simplest ved Rectanglet, hvor Bestemmelserne haves ligefrem i
to høsliggende Sider; i andre Figurer maae de først udfindes.
I Trianglen findes de at være Høden og den halve Grund-

linie (Grundl. og den h. Hølde), og ved Hjælp af den maae de fleste retlinede Figurer sammenlignes. Quadratet er bestemt ved Sidelinien, hvorfor begge Bestemmelsernes Forholde blive ligestore, og to Quadrater forholde sig derfor som deres Sideliners Quadrater.

En Cirkel er fuldkommen bestemt ved dens Radius, Diameter eller Peripherie, og man indseer deraf, at to Cirkler maae forholde sig som disse Liniers Quadrater.

Før Legemet, der har tre Bestemmelser, seer Sammenligningen ganske i Analogie med det før Bladerne Fremsatte.

§ 8. Til lettere Oversigt lader man gjerne de sammenligneide Gjenstande blive Lædene i første Forhold, hvorved andet Forhold kommer til at indeholde Sammenligningens Resultat; derhos sætter man gjerne den ene Gjenstand for Sammenligningen lig Enheden i sit Slags, hvorved ligeledes Oversigtenlettes og Undersøgelsen gjøres simpelere. Erexpler herpaa giver Geometrien ved Bladers og Stereometrien ved Legemers Udmaaling. Vi tilfoie endnu et Par andre.

a) Gjennem to ligestore Nor udstrømme to Vandmasser med forskellig Hastighed; der skal undersøges, hvilket Forhold der er imellem de Virkninger, som disse to Stromme udøve paa et fast Legeme. Vi finde da, at Virkningerne maae beroe deels paa den Hurtighed, hvormed Bandet udstrømmer, deels paa den Masse, der bevirker Trykket. Deraf følger, at Forholdet imellem Virkningerne, som vi ville falde V og V¹, bestemmes af to andre Forholde: det mellem Vandstrømmenes Hastigheder og det mellem deres Masser, og bliver altsaa sammenfat af disse. For nu at gjøre Undersøgelsen simpelere, sætte vi den ene Stroms Hurtighed og Masse hver lig En; er den andens Hurtighed nu lig n, da bliver ogsaa dens Masse lig n, og man har altsaa Forholdet mellem Hastig-

hederne $1:n$, mellem Maſſerne $1:n$ og derfor

$$V:V^1 = \begin{cases} 1:n \\ 1:n \end{cases} = 1:n^2.$$

Er det bæſſendt af Erfaring, hvormeget V udretter, da vil V^1 være bestemt ved $n^2 V$.

Bare Hastighederne for V og V^1 p og q, haves som det almindelige Udtryk, idet Maſſerne rette sig efter Hastighederne og derfor forholde sig som disse, $V:V^1 = p^2:q^2$.

b) De Straaler, der udsendes i Rummet af et fritsværende lysende Legeme, spredes stedse mere ad, jo længere de fjerne sig fra Legemet. Vi ville undersøge, hvilket Forhold der er imellem denne Afspredelse i forskellige Afstande fra Legemet, og dernæst hvilket Forhold der er imellem Lysets Styrke i disse Afstande. Tænke vi os om det lysende Legeme, der bequeminst sættes lig et Punkt, i Afstande R og r to Kugler construerede, da ville deres Overflader angive, hvorvidt Straalerne her ere spredte, og da nu disse Overflader, der ere lig $4R^2\pi$ og $4r^2\pi$, forholde sig som $\frac{R^2}{r^2}$, saa maa ogsaa Afspredelsen forholde sig som $\frac{R^2}{r^2}$. Betegnes Afspredelsen ved Λ og a , har man $\frac{\Lambda}{a} = \frac{R^2}{r^2}$.

Men netop i samme Forhold, som Afspredelsen tiltager, aftager Straalernes Tæthed, hvorpaa Lysstyrken beroer, og deraf folger da, at Forholdet mellem Lysstyrken er det omvendte af det mellem den tilsvarende Afspredelse, og altsaa ogsaa det omvendte af Afstandenes Forhold quadreret. Er Lysstyrken L for Radius R og 1 for r , haves $\frac{L}{1} = \frac{r^2}{R^2}$.

Jorden er omtrent 20 Mill. Mile fjernet fra Solen, Uranus omtrent 400. Antages Lysets Styrke her paa Jorden

som Enhed, har man $\frac{1}{x} = \frac{400^2}{20^2} = \frac{20^2}{1}$, hvilket giver $x = \frac{1}{400}$ af den antagne Enhed.

Venus har en Afstand fra Solen af omrent 15 Mill. Mile, og er derfor 17 Gange stærkere belyst end Jorden.

§ 9. Alle Gjenstande, der lade sig henføre til Talset, kunne sammenlignes i et Forhold; men ogsaa omvendt, enhver Talangivelse af Storhed er Resultatet af en Sammenligning, og derfor relativ, givet med Hensyn til noget Andre. At et Baand er 7 Alen langt, er Resultatet af den Proportion, at Baandets Længde forholder sig til Længden 1 Al. som 7 til 1. Længdebestemmelserne er her given i Relation til 1 Alen, der forudsættes bestjendt; men den er det kun gjennem en Sammenligning med noget Andre, og saa fremdeles.

Det er muligt, at A's Die seer Alting ti Gange saa stort som mit; men fordi det seer Alting saaledes, ere vi dog enige om Tingenes Størhed. Betegner α en Alen saa stor som jeg seer den, da seer A den som 10α , og de 7 Alen som $7 \cdot 10\alpha$; men man har da

$$\frac{7 \cdot 10\alpha}{10\alpha} = \frac{7\alpha}{\alpha} = \frac{7}{1}$$

ø: Forholdet bliver uforandret, og vi ere enige om Størheden.

IV.

Proportionslæreens praktiske Anwendunge.

Den umiddelbare Nutte, som de Fleste, der gjennemgaae
de lærde Skoler, funne vente at have af Mathematikunderviis-
ningen i disse, lader sig omtrent indbefatte derunder, at de
stulle funne regne godt, naar derved forstaes, at bevæge sig
med nogen Lethed i saadaune Opgaver, som funne forekomme
for dem i det daglige Liv. Imidlertid vil man vel indrømme,
at Mange ikke have denne Fordeel, og Grunden antager jeg
maa tildeels søges deri, at ved Regneunderviisningen Theorie
ikke paa en passende Maade understøtter Praxis. Vel tales
der sjænligt om, at man ikke maa lade en Discipel begynde
paa noget, som han ikke forstaer; men naar denne Forstaen
stal have noget at betyde, da veed enhver Lærer, at man
lover eller fordrer en Umulighed. Den første Regneunder-
viisning maa næsten alene stottes til Hukommelsen; senere giver
man Regler for hver Regningsart, som Disciplens Skjonsomhed
maa anvende, og det er altsaa ogsaa her Hukommelsen, der
maa bevare Grundlaget. Den Iffe-Studerende maa hjælpe sig
hermed. Den Studerende lærer ved Mathematikunderviisningen
at forstaae de fire Regningsarter og Brøk; men saa kommer
Theorien ikke længere Praxis til Hjælp paa en tilbørlig Maade,
førend Nentesregning læres ved Hjælp af Logarithmer og
Næller. Det derved opstaade Hul er det efterfølgende Udvil-
lings Bestemmelse at udfylde. Jeg har kun givet saa
Exempler, fordi jeg tænker mig den brugt ved Siden af Ursins
Regnebog, der viðinof anvendes i alle Skoler.

Hvorledes nu Andre, hvis de ville benytte Efterstaende, ville gaae frem, maa jeg overlade til dem; jeg selv agter at gaae frem efter følgende Plan. Den første Regneundervisning, der her i Skolen gives Disciplen, beregner jeg paa at skulle forstaffe ham den mekaniske Hærdighed, der er den nødvendige Betingelse for, at han kan blive en dygtig Regner, og lader ham derfor først gjennemgaae Reguladetri og Brof paa en saa simpel Maade som muligt, uanseet at den naturligvis ofte bliver temmelig vidtloftig; derpaa efter den fortteste Methode, og kun naar han kan dette godt, lader jeg ham gaae videre. Ved hver ny Regningsart giver jeg Reglerne og oplyser dem ved et Exempel, samt veileder hans Skjønsomhed ved de i Regnebogen forekommende Exempler, hvor det er strengt nødvent, ellers ikke. Hver regner for sig, efter den Fremgang, han har gjort. Ved Udgangen af anden*) Klasse have de Fleste regnet hele Ursins Regnebog med Anhang flere Gange igjennem; i tredie Klasse, hvor Proportioneløren læses, haves endnu een ugentlig Time. Denne tænker jeg at benytte til at lære Disciplen at forstaae det tidlige praktisk Verte, og saavidt muligt repetere det.

Reguladetri.

§ 1. Proportionsløren viser, at man kan finde det manglende Led i en Proportion, naar de tre ere givne, og at navnlig fjerde Led er lig Productet af Mellemledene divideret med første Led. Den praktiske Anvendelse heraf falder man Reguladetri (regula de tribus datis), der benyttes saa ofte man har at finde en Størrelse, der forholder sig til en anden som to givne Størrelser.

*) Læseren maa erindre, at vi i Slagelse endnu ere ved det Gamle: fire toaarige Klasser.

Da man i Praxis fun har med concrete Størrelser at gjøre, blive alle Led bencønnte; men ved Opsætningen af Regnestykket følger man ikke den samme Orden som ved en Proportion, idet man, for lettere at faae Spørgesætningen ud, ombytter Mellemleddene. Ex. Naar 2 \tilde{x} koste 7 Nbd., hvad koste da 5 \tilde{x} ?

Det første Forhold mellem Priserne $\frac{7 \text{ Nbd.}}{x \text{ Nbd.}}$ maa være det samme som det mellem de givne Vægtbestemmelser, altsaa $\frac{2 \tilde{x}}{5 \tilde{x}} = \frac{7 \text{ Nbd.}}{x \text{ Nbd.}}$, hvilket opfattes

naar 2 \tilde{x} koste 7 Nbd., hvad da 5 \tilde{x} ?

Man seer nu heraf, at første og tredie Led maae være af samme Navn i Reguladetri-Stykket, og da $\frac{2 \tilde{x}}{5 \tilde{x}} = \frac{2}{5}$, at de funne betragtes som ubenævnte; at Facit bliver af samme Navn som mellemste Led, og, da $x \text{ Nbd.} = \frac{5 \cdot 7 \text{ Nbd.}}{2}$, at Beregningens udføres ved at multiplicere andet og tredie Led sammen, og dividere med første. Det indsees fremdeles af Reglerne for en Proportions Behandling, at første og andet, samt første og tredie Led funne samtidigt multipliceres eller divideres med samme Tal, hvorved da Broder funne bortskaffes af alle tre Led, og Forfortninger udføres, ved hvilke første Led stedse maa være med.

§ 2. Bestaae Leddene i et Reguladetri-Stykke af complexe Tal, funne de almindelige Regler ved den Multiplication og Division, Beregningen udfører, uforandret folges, naar første og tredie Led gjøres til det mindste Navn (Brof iberegnet), der findes i noget af dem. Men i Almindelighed giver det lettere Beregning, naar begge fun gjøres til det mindste Navn, der findes i forreste Led, og hvis tredie Led

har mindre Navn eller Brøk, da for dettes Vedkommende at udføre Multiplicationen med andet Led ved Hjælp af Parttagning.

Parttagning.

§ 3. Enhver Brøk, hvis Tæller ikke er 1, lader sig op løse i en Sum af eensbencævnte Brøker, derved at man deler dens Tæller. Foretages denne Deling saaledes, at første Deel eller Part gaaer op i Nævneren, den anden enten er den samme som den første, eller gaaer op i denne o. s. f., da vil man faae den givne Brøk oplost i en Række af andre, der alle ved Forfortning funne gives Tælleren 1, og som have den Egenstab, at enhver følgende Nævner enten er den samme som den foregaaende, eller et Multiplum deraf.

$$\text{f. Ex. } \frac{15}{8} = \frac{8}{8} + \frac{4}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$$

$$\frac{8}{9} = \frac{3}{9} + \frac{3}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9}.$$

Men dette lader sig ogsaa udtrykke saaledes:

$$\frac{15}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2}.$$

Skal nu et Tal m multipliceres med $\frac{15}{8}$, da kan det skee ved først at beregne $\frac{1}{2}m$, dernæst Halvparten af det Udkomne, saa Halvparten deraf igjen, og efter Halvparten af det sidst Udkomne; Summen af disse Quotienter er lig Productet, og det kan øste være lettere at foretage Multiplicationen ved en saadan succesiv Division med smaa Tal, end ved Multiplication med Tælleren og Division med Nævneren.

Parttagningen anordnes nu paa den bestendte Maade, f. Ex. for $\frac{15}{32}$ saaledes:

$\frac{15}{32}$	hvilket betyder, at $\frac{15}{32}$ er lig $\frac{8}{32} + \frac{4}{32} + \frac{2}{32} + \frac{1}{32}$
$\frac{8}{32}$	$= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} : 2 + (\frac{1}{4} : 2) : 2$
$\frac{4}{32}$	$+ (\frac{1}{4} : 2) : 2.$
$\frac{2}{32}$	
$\frac{1}{32}$	

Anm. 1. Den omtalte Deling lader sig saameget lettere udføre, jo mindre de Primtal ere, i hvilke Navneren lader sig op løse; altsaa lettest, naar den kun indeholder Potenter af 2, dernæst naar den kun indeholder $2^n \cdot 3^m$ o. s. v. Er Navneren et Primtal, kan naturligvis intet Tal findes, der gaaer op teri, og man maa da enten op løse Tællerne i $1+1+1\dots$ eller (Broen være $\frac{a}{b}$) i $1+a-1$, og Parterne blive da $\frac{1}{b} + \frac{1}{b}(a-1)$, i hvilket Tilfælde Intet vindes. Om man visste, funde man her lade Tællerne voxne, f. Ex.

$$\begin{array}{c} 15 \\ \hline 17 \\ \left(\begin{array}{c} 1 \frac{1}{7} \\ 2 \frac{2}{7}g \\ 2 \frac{1}{7}g \\ 10 \frac{5}{7}g \end{array} \right) \end{array} \quad \text{eller} \quad \begin{array}{c} 15 \\ \hline 17 \\ \left(\begin{array}{c} 1 \frac{1}{7} \\ 3 \frac{3}{7}g \\ 3 \frac{1}{7}g \\ 6 \frac{2}{7}g \\ 2 \frac{1}{7} \end{array} \right) \end{array}.$$

Anm. 2. Er Multiplikator et blandet Tal, f. Ex. $m\left(n + \frac{a}{b}\right) = mn + m\frac{a}{b}$, da kan Multiplicationen $m \frac{a}{b}$ stee ved Parttagning; kun bemærkes det, at Parterne tages ud af m , ikke af mn .

Anm. 3. Da Division med Brok udføres ved Multiplication med den omvendte Divisor, kan ogsaa derved anvendes Parttagning, efterat man om fornødent har gjort til blandet Tal.

§ 4. Ved Enhederne for Maal, Vægt, Mynt og Ligende ere Underafdelingerne (den særegne Maade, hvorpaa flere Enheder sammenfattes til en højere, kan man betragte som en uheldig Afsigelse fra det decadiske Talsystem) fun en vis særegen Maade, hvorpaa man har vedtaget for lettere Oversigts Skyld at forme Broerne. Hvad der saaledes ikke lader sig udtrykke som hele Abdl., giver man først Form af Sjettedele; lader Broen sig ikke udtrykke noigagtigt saaledes, dannes Sætendedele af disse, og først derefter Brok efter Omstændighederne. $6 \text{ Abdl. } 3 \frac{2}{3} \frac{1}{3} \beta$ er lig $(6 + \frac{2}{3} + \frac{1}{3})$ af $\frac{1}{6}$ + $\frac{2}{7}$ af $\frac{1}{56}$ Abdl. Antage vi dette at udgjøre tredie Led i et Reguladetriflykke, hvor det altsaa maa betragtes som ubenævnt, og man dermed vil multiplicere andet Led, kan man reducere

Mark og Skilling til Brøk Rbd., hvilket første Led også er Rbd.
 Da dets mindste Navn bekvemmeligt tages som Enhed), og man har da $6 \text{ Rbd. } 3 \frac{3}{4} \beta$ lig $6\frac{2}{3}\frac{1}{6} \text{ Rbd.}$ Multiplikationen med Brøken kan da udføres ved Paritagning saaledes:

211

336

$$\left| \begin{array}{l} 168 \frac{1}{2} \\ 42 \frac{1}{4} \\ 1 \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

, eller også kan man uden at reducere sige,
 $3 \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \text{ Rbd.}, 12 \beta = \frac{1}{4} \text{ af } 3 \frac{3}{4}, \frac{2}{7} = \frac{1}{4} \frac{1}{2}$
 $(\frac{2}{7} : 12)$ af 12β , og da anordne det saaledes:

$$\begin{array}{r} 6 \text{ Rbd. } 3 \frac{3}{4} \beta \\ \hline (\frac{1}{2}) (\frac{1}{4}) (\frac{1}{4} \frac{1}{2}) \end{array}$$

Her er 42 et temmelig stort Tal, og man kan derfor op løse det i 6×7 , og dividere først med 6 (men ikke medregne Quotienten), og derpaa med 7 .

Undertiden giver dog Reductionen den letteste Beregning, f. Ex. $4 \frac{3}{4} \beta = \frac{1}{5} \text{ Rbd.}, 13\frac{5}{7} \beta = \frac{1}{7} \text{ Rbd. v. s. v.}$

§ 5. Vil man betragte andet Led som Multiplikator, da tænke man sig det ubencvnte tredie Led først multipliceret med andet Leds benævnte Enhed, derpaa med dets Tal, hvorved da Paritagning kan bruges. Ex.:

$$5 \tilde{\alpha} - 3 \text{ Rbd. } 5 \frac{3}{4} \beta - 12738 \tilde{\alpha}.$$

Har man Brøk eller hvad dertil svarer baade i Mellemledet og i tredie Led, efterat dette er bragt til samme Navn som første Leds mindste, da kan man med andet Led multiplikere tredie Leds Hele, og derved anvende Paritagning; derpaa ligeledes ved Paritagning andet Led med tredie Leds Brøk. Men denne dobbelte Paritagning er sjeldent til Fordeel, og maa ligesom Paritagning overhovedet anvendes med en vis Skønsomhed.

Omvendt Neguladetri.

§ 6. Har man at bestemme en Størrelse, hvis Forhold til en given er det omvendte af det, hvori to andre Størrelser staae til hinanden, da skeer denne Bestemmelse ved omvendt Neguladetri.

Man veed, at 8 Mand kunne udføre et Arbeide i 24 Dage, hvor lang Tid behøve da 6 Mand dertil?

Her er Forholdet imellem Arbeiderne $\frac{8 \text{ Mand}}{6 \text{ Mand}}$, og det imellem Dagenes $\frac{24 \text{ Dage}}{x \text{ Dage}}$; men da Dagenes Antal maa formindskes eller forøges, efter som Arbeidernes forøges eller formindskes, maa et af Forholdene inverteres, forend de funne danne en Proportion, og man har da, naar det behændste Forhold inverteres:

$$\frac{6 \text{ Mand}}{8 \text{ Mand}} = \frac{24 \text{ Dage}}{x \text{ Dage}}, \text{ og da } \frac{6 \text{ Mand}}{8 \text{ Mand}} = \frac{6}{8},$$

$$x \text{ Dage} = \frac{8 \cdot 24 \text{ Dage}}{6}.$$

Men i Almindelighed opstætter man Neguladetristykket, uden at bekymre sig om, enten det er omvendt Neguladetri eller ikke:

8 Mand — (behøve) 24 Dage — (hvad da) 6 Mand,
og for at undersøge, om man har med simpel Neguladetri (hvor Forholdene ere overensstemmende) at gjøre eller med omvendt, spørger man med tredie Leds Navn, og svarer med andets, idet man foran hūnt sætter jo flere, jo mere, jo større, jo længere, eller deslige efter Omstændighederne, og undersøger, om der efter de givne Betingelser maa svares: desto flere, desto mere o. s. v., eller desto færre, mindre o. s. v. I første Tilfælde har man simpel Neguladetri, i sidste omvendt, og

inden man begynder Beregningen, ombyttes da første og tredie Led.

Altsaa 6 Mand — 24 Dage — 8 Mand.

Anm. 1. Det indsees let, at man ogsaa kan spørge med andet Led, og svare med tredie, eller at man kan spørge med jo mindre, jo færre o. s. v., da der kun maa undersøges, om der skal gives et overensstemmende eller modsat Svar.

Anm. 2. I Exempler som ovenstaende kan man ofte faae Brok i Facit, hvorved da maa overveies, at det ikke er Personerne, men deres Arbeidskraft, hvorover vi anstille Beregning, saa at til Ex. $3\frac{1}{2}$ Mand i 7 Dage betyder $3\frac{1}{2}$ Gange 1 Mands Arbeidskraft i 7 Dage, eller der behoves 3 Mand i alle 7 Dage, og derhos endnu een Mand i $\frac{1}{3} \cdot 7$ Dage eller $2\frac{1}{3}$ Dag. $3\frac{1}{2}$ Mand i 7 Dage siger det samme som 7 Mand i $3\frac{1}{2}$ Dag, eller 1 Mand i $23\frac{1}{2}$ Dag.

Sammensat Reguladetri.

§ 7. Skal man bestemme det ene Led i et Forhold, der er ligt et andet af flere givne sammensat, da seer Bestemmelser ved sammensat Reguladetri.

Ex. Naar 3 Heste ugentligt fortære 2 Tdr. Havre, hvormange Tonder behove da 5 Heste i 9 Uger?

Forholdet mellem Tondernes Antal $\frac{2 \text{ Tdr}}{x \text{ Tdr.}}$ er her afhængigt saavel af det mellem Hestenes som af det mellem Ugernes Antal, altsaa af

$$\left. \begin{array}{l} 3 \text{ Heste : } 5 \text{ Heste} \\ 1 \text{ Uge : } 9 \text{ Uger} \end{array} \right\} \text{ eller } \left\{ \begin{array}{l} 3 : 5 \\ 1 : 9 \end{array} \right\},$$

saa at man har

$$\left. \begin{array}{l} 3 \text{ Heste : } 5 \text{ Heste} \\ 1 \text{ Uge : } 9 \text{ Uger} \end{array} \right\} = 2 \text{ Tdr. : } x \text{ Tdr.}$$

Man opstætter dette som Reguladetriflykke i Analogie med simpel Reguladetri saaledes, at det sammensatte Forholds Forled (Der naturligvis ligesom Esterleddene ere at multiplicere sammen) danne første Led; Proportionens tredie Led, der har sine Be-

stæmmelser i første Led, bliver andet Led, og Efterleddene tredie Led. Altsaa

$$\begin{array}{c} \left. \begin{array}{l} 3 \text{ Heste} \\ i 1 \text{ Uge} \end{array} \right\} \text{ fortære } 2 \text{ Tdr., hvad da} \quad \left. \begin{array}{l} 5 \text{ Heste} \\ i 9 \text{ Uger} \end{array} \right\} \\ \hline 1 \qquad \qquad \qquad 2 \text{ Tdr.} \qquad \qquad \qquad 15. \end{array}$$

Hvis de censartede Størresser ikke ere givne af samme Navn (den ene til Ex. i Uger, den anden i Dage), da gjøres de dertil, og som i Exemplet forsøge man Forkortning, inden man multiplicerer.

Omvendt sammensat Reguladetri.

§ 8. Men ligesom man ved det enkelte Reguladetri-Stykke maa undersøge, om det henhører under simpel eller omvendt Reguladetri, saaledes maa man ogsaa her være opmærksom paa, at et eller flere af de Forholde, der danne det sammensatte, kunne af eller tilstage, naar det sogte Forhold til- eller aflager. Man undersøger dette ved Spørgsmaal; saaledes ovenfor: jo flere Heste der skulle fodres, desto flere Tønder, og jo flere Uger de skulle fodres, desto flere Tønder; begge Forholde ere altsaa overensstemmende med det sogte. Men er Opgaven denne; tre Heste kunne fodres med to Tdr. Havre i een Uge; hvorlænge kunne da fem Heste fodres med tredive Tønder? bliver Opsætningen:

$$\begin{array}{ccc} \left. \begin{array}{l} 3 \text{ Heste} \\ 2 \text{ Tdr.} \end{array} \right\} & 1 \text{ Uge} & \left. \begin{array}{l} 5 \text{ Heste} \\ 30 \text{ Tdr.} \end{array} \right\} \end{array}$$

og man finder da, at jo flere Heste der skulle fodres med den givne Havre, desto fortære Tid kunne de fodres; men at jo flere Tønder der ere tilstede, desto længere Tid kunne de fodres. Forholdet mellem Hestenes Antal maa deraf inverteres:

$$\begin{array}{ccc} \left. \begin{array}{l} 5 \text{ Heste} \\ 2 \text{ Tdr.} \end{array} \right\} & 1 \text{ Uge} & \left. \begin{array}{l} 3 \text{ Heste} \\ 30 \text{ Tdr.} \end{array} \right\} \\ \hline 1 \qquad \qquad \qquad 4 \text{ Uge} \qquad \qquad \qquad 9 \end{array}$$

I følgende Forandring af det samme Exempel maa Forholdet mellem Ulgernes Antal inverteres: 3 Heste kunne fodres med 2 Tdr. Havre i een Uge, hvormange kunne da fodres med 30 Tdr. i 9 Uger?

Et andet Exempel. Naar 2 Vogne, der beskæftiges 9 Timer dagligt, kunne i 3 Dage bortføre en Jordbunkse, der er 3 Alen høj, 6 Alen lang og 4 Alen bred, hvormeget kunne da under øvrigt lignende Omstændigheder 3 Vogne, der beskæftiges 10 Timer dagligt, i 4 Dage bortføre af en Bunkse, der er 4 Alen høj, 8 Alen bred og 20 Alen lang? Man begynder fra den ene Ende.

Dersom her et Led i et af Forholdene mellem Længde-, Brede- og Høide-Bestemmelserne antages at være ubekjendt, blive de to andre at invertere, de øvrige ikke; antages derimod et Led i et af Forholdene mellem Vognenes, Dagenes eller Timernes Antal at være ubekjendt, blive de to andre af disse at invertere, de øvrige ikke.

Den Reesiske Regel.

§ 9. Man finder det undertiden bekvæmt, at opsette de til sammenfæst Neguladetri henhørende Stykker paa en anden Maade, hvorved man siges at følge den Reesiske (Hollænderen Rees) Regel.

Man drager en vertical Linie; paa dens venstre Side sættes overst Proportionens fjerde Led x ; derunder det sammensatte Forholds Forled; overfor x Proportionens tredie (Neguladetri-Stykkets andet) Led, og derunder Efterleddene af det sammensatte Forhold. Man seer da, at de Talstørrelser, der skulle multipliceres sammen, komme til at staac under hverandre, og at Facit udkommer ved at dividere høire Sides Product med den ved Multiplicationen fremkomne Coefficient til x .

Det maa naturligvis undersøges, om noget af Forholdene skal inverteres, - og det indsees, at ved samtidig Multiplication af begge Sider kunne Broker bortskaffes, ved Division foretages Forkortninger.

Det andet Exempel § 8 bliver da at opsette saaledes:

x	6 Al. lang	x	6 Al. lang
2 Vogne	3 Vogne	2	3
3 Dage	4 Dage	3	4
9 Timer	10 Timer	9	10
3 Al. høi	4 Al. høi	4	3
4 Al. bred	8 Al. bred	8	4
		x =	5 Al.

Procent-Regning.

§ 10. Der gives en stor Mængde Forholde mellem Tal, af hvilke det ene kan tænkes fremkommet af det andet, kan tænkes som en Deel af det andet eller deslige, om hvis Beskaffenhed man lettest gør sig en Forestilling ved at sammenligne et saadant Forhold med et andet, i hvilket 100 svarer til det Tal, hvoraf det andet er fremkommet.

Som Exemplar nævne vi alle Tilfælde, hvor der er Talen om en vis Gevinst eller et Tab paa en i Handel anbragt Capital; hvor man sammenligner forskellig Mynt, Vægt og Maal; ved Coursangivelser, Angivelser af en Befolknings Til- eller Aftagen o. s. v. Man opgiver her, hvor stor Gevinst eller Tab, Til- eller Aftagen o. s. v. er for hundrede af den omhandlede Art eller pro cento.

Betyder a en Capital, b dens Tilvært, og p den tilsvarende Tilvært for 100, saa har man Proportionen:

$$\frac{a}{100} = \frac{b}{p}.$$

Tænkes her p at være den ubekjendte, bliver Spørgsmålet: naar paa en Capital a er tjent b, hvormeget er da tjent pro cento? Denne Beregning falder man undertiden omvendt Procentregning.

Ex. Danmark har 1,200000 Indvaanere; af disse ere 35000 Mand dragne i Krig, hvormange er det p. c.?

$$1,200000 - 35000 = 100$$

$$\text{Fc. } 2\frac{1}{2}.$$

Anm. 1. Udtrykkes Forskjellen mellem Vægt og Maal pro cento, da mærke man, at det er vedtaget at lade Tallangivelsen af den tungere Vægt og det større Maal være lige Hundrede, saa at altsaa Tallene for den lettere Vægt og det mindre Maal blive over Hundrede. Ved Beregningen kommer denne til at udgjøre Regulatetriflykets Mellemled.

Naar 37 svenske Tød ere lig 35 danske, hvorledes er da Forholdet p. c.?

$$35 \text{ danske } \text{f.} - 37 \text{ svenske } \text{f.} = 100 \text{ danske } \text{f.}$$

$$\text{Fc. } 105\frac{1}{2} \text{ sv. } \text{f.}$$

Hundrede danske Tød er da lig $105\frac{1}{2}$ svenske, hvilket man udtrykker baade saaledes, at den danske Tød er $5\frac{1}{2}$ p. c. stærre end den svenske, og at den svenske er $5\frac{1}{2}$ p. c. mindre end hin.

Anm. 2. Ved Courssangivelselader man ogsaa Tallet paa den Mynt, der i Almindelighed har den høieste Handelsværdie, enten dette nu er 100 eller et andet Tal, blive uforandret, og det constante Tal udelades i Angivelsen. Ved Coursen paa Hamborg, som noteres i Kjøbenhavn, underforstaaes: for 100 Thl. Be., ved Coursen paa London: for 1 L. St. At Courant er 25 p. c. stærre end Banco, betyder, at 125 Courant-Mark er lig hundrede Banco-Mark.

§ 11. Dersom vi i Proportionen $\frac{a}{100} = \frac{b}{p}$ antage b

for at være ubekjendt, bliver Spørgsmålet, naar 100 giver p, hvormeget giver da a, hvilket man har faldet directe Procentregning.

Ex. Naar Dødeligheden antages aarligt at være 3 p. c., hvormange kunne da antages at ville døe aarligt i et Sogn med 1230 Indvaanere? Fc. 36,9 o: af 10 Aar vil i de 9 døe 37, i det ene 36.

§ 12. Ved Addition af den givne Proportions Ved erholder man

$$\frac{a+b}{100+p} = \frac{b}{p},$$

hvilken Proportion kommer til Anvendelse, naar der er givet en Capital, sammenlagt til eet Tal med sin Gevinst ($a+b$); man veed, hvormange Procent der er tjent, og ønsker at hænde Capital og Gevinst hver for sig.

Ex. For en Hest har jeg faaet 125 Rbd. ($a+b$), og derved fortjent 10 p. c. (p.), hvormeget har jeg da givet, og hvor stor er min Fordeel?

$$110 \text{ Rbd.} - 10 \text{ Rbd.} = 125 \text{ Rbd.}$$

$$\text{Fc. } 11\frac{4}{11} \text{ Rbd. Fordeel, } a = (125 - 11\frac{4}{11}) \text{ Rbd.}$$

Man kan ogsaa umiddelbart indse Rigigheden ved at overveie, at for hvert 100, jeg havde givet, maa der i de 125 være indeholdt 110, og der er altsaa for hver 110, jeg har faaet, tjent 10.

§ 13. Ved Subtraction af Veddene vil fremkomme en Proportion

$$\frac{a-b}{100-p} = \frac{b}{p},$$

der kommer til Anvendelse, naar man fjender p, og har $a-b$ givet som eet Tal; eller naar man har givet en Sum, der er indkommen, efterat der er tabt visse p. c. paa den, og man ønsker at hænde den oprindelige Capital og Tabet.

Ex. For en Hest har jeg faaet 125 Rbd., og ved denne Handel tabt 10 p. c. Hvor stort er Tabet?

$$90 \text{ Rbd.} - 10 \text{ Rbd.} = 125 \text{ Rbd.}$$

$$\text{Fc. } 13\frac{8}{9} \text{ Rbd., } a = (125 + 13\frac{8}{9}) \text{ Rbd.}$$

Man kan ogsaa indse dette umiddelbart saaledes: naar for hvert 100, der er givet, er tabt 10, har man fun faaet

90. Der er altsaa tabt 10 for hver 90, der er indeholdt i de 125.

Anm. 1. Det kan ofte tjene til Lettelse ved Procent-Beregninger at erindre, at $33\frac{1}{3} = \frac{100}{3}$, $16\frac{2}{3} = \frac{100}{6}$, $12\frac{1}{2} = \frac{100}{8}$, $8\frac{1}{3} = \frac{100}{12}$, $6\frac{1}{4} = \frac{100}{16}$ o. s. v.

Anm. 2. Proportionen $\frac{a}{100} = \frac{b}{p}$ giver endnu

$$1) \quad \frac{a}{100} = \frac{a+b}{100+p} \quad \text{og} \quad 2) \quad \frac{a}{100} = \frac{a-b}{100-p}.$$

Den første af disse kommer til Anvendelse, hvor man skal beregne visse Procent af en Talsorrelse, og derpaa addere dem til denne, og vil foretage Beregningen paa een Gang. Hvormeget udgjør 312 forøget med 4 p. c.?

$$100 - 104 - 312, \quad \frac{104 \cdot 312}{100} = 324,48.$$

Den anden under samme Betingelser, kan at de givne Procent skulle fradrages. Nogen Hamp af Vægt 312 Ær blevet fugtig, hvorfor der tilstaaes Kjøberen 4 p. c. Rabat; hvormeget skal han betale?

$$100 - 96 - 312. \quad \text{Jc. } 299,52.$$

Bed i §§ 12 og 13 at indsætte Forholdet $\frac{a}{100}$ for $\frac{b}{p}$ erholdes analoge Forandringer.

Rentes-Agning.

§ 14. Da Penge ere Midler til at virke med, maae de ansees for i en bestemt Tid at kunne bringe en vis Fordeel, enten jeg selv virker med dem, eller laaner dem ud til Andre. Den Fordeel, en Capital herefter maa regnes at bringe i en vis Tid, kaldes Rente, der næsten altid beregnes pro cento, men forskelligt med Hensyn til Tiden, dog oftest i Halvs- eller Heelaars-Terminder. Den almindelige Rente (Rentefoden) er i Danmark 4 p. c. pro anno, der betragtes som lige med 2 p. c. om Halvaaret, sjøndt dette i Virkeligheden er noget mere. Ved en almindelig Betragtning er det bekvemmet blot at tale om Terminer, og da i forekommende Tilfælde at bestemme deres Længde.

Renten afhænger saavel af Tidens Længde som af Capitalens Størrelse, hvorfor Forholdet mellem Renten af to

Capitaler maa være sammensat af Forholdene mellem Tiderne og Capitalerne. Betegner c Nbd. Capitalen, r Nbd. Renten i een Termin (p. t.), n Terminernes Antal, og R Nbd. den Rente, c Nbd. under disse Omstændigheder giver, da har man:

$$\left. \begin{array}{l} 100 : c \\ 1 : n \end{array} \right\} = r : R,$$

hvoraf det sammensatte Reguladetri-Stykke

$$\left. \begin{array}{l} 100 \text{ Nbd.} \\ 1 \text{ Term.} \end{array} \right\} r \text{ Nbd.} \quad \left. \begin{array}{l} c \text{ Nbd.} \\ n \text{ Term.} \end{array} \right\}$$

Derefter bestemmes Renten af en vis Capital i et givet Antal Terminer med en vis Rente p. c. p. t. Man falder under tiden dette directe Rentes-Regning.

Er derimod r den ubekendte Størrelse, har man

$$\left. \begin{array}{l} c \text{ Nbd.} \\ n \text{ Term.} \end{array} \right\} R \quad \left. \begin{array}{l} 100 \text{ Nbd.} \\ 1 \text{ Term.} \end{array} \right\}$$

hvorved bestemmes, hvor stor Renten har været p. c. p. t., naar Renten af c i n Terminer har været R . Man har her omvendt Rentes-Regning.

Renters Rente.

§ 15. Lader man en Capital henstaae i flere Terminer, uden ved Udgangen af hver at hæve de forfaldne Renter, men lader disse henlægge til Capitalen, da bør der ved Udgangen af den anden Termin beregnes Renter foruden af Capitalen ogsaa af de ved første Termins Udløb forfaldne Renter. Beregningen heraf maa da ske i et Reguladetri-Stykke for hver Termin, og foretages efter § 11.

Har man en Capital forsøgt med Renter og Renters-Rente, og ønsker at fjende den oprindelige Capital, da maa Beregningen ske paa samme Maade, men efter § 12.

Lader Tiden sig ikke udmaale i et heelt Antal Terminer, da beregner man gjerne Renten for Brolet-Terminen efter Tidens-

forholdet, sjældt dette ikke er ganske noigagtigt. Er Terminen til Ex. et Aar, Renten $3\frac{1}{2}$ p. c., og Tiden 9 Aar $5\frac{1}{2}$ Maaned, da maa Beregningen for de 9 Aar ske i 9 Stykker, og Renten for de $5\frac{1}{2}$ Maaned ansættes efter Reguladetrifystket

12 Maaneder — $3\frac{1}{2}$ p. c. — $5\frac{1}{2}$ Maaned
til $1\frac{2}{8}\frac{3}{8}$ p. c., og man figer nu i første Tilfælde: naar 100 giver $1\frac{2}{8}\frac{3}{8}$, hvad da Capital forsøgt med Renter og Renters-Rente for de 9 Aar; og i andet: $101\frac{2}{8}\frac{3}{8}$ giver $1\frac{2}{8}\frac{3}{8}$, hvad da Capitalen, hvorfra er draget Renter og Renters-Rente for de 9 Aar.

§ 16. I Almindelighed mærke man, at en Capital C, der først er tilstede et Antal Terminer frem i Tiden, nu fun kan ansættes til en Værdie c, der efter en antagen Rente p. c. p. t. i det givne Antal Terminer med Renter og Renters-Rente giver C. Dens Værdie for Diebliffset (c) beregnes efter § 12. Men en Capital, der alt var tilstede for visse Terminer siden, maa indgaae i Beregningen forsøgt med Renter og Renters-Rente for disse Terminer. Dens Værdie for Diebliffset beregnes efter § 11.

Antages Renten 4 p. c. p. t., da kan Creditor ikke forslange, at jeg skal betale ham de 2 p. c. midt i Terminen; thi jeg er da fun skyldig en Sum, der med Rente 4 p. c. p. t. efter Forløbet af en halv Termin giver en Sum lig 2 p. c. af den laante Capital.

A solgte et Partie Byg for 15000 Nbd. at levere om 6 Maaneder; Kjøberen tillader ham strax at træffe en Verrel for Beløbet. Hvormeget faaer han da i Virkeligheden, Renten for 6 Maaneder regnet til 3 p. c.? Efter § 11 faaer han 15450 Nbd.

B sælger paa 6 Maaneders Credit et Partie Byg for

15450 Nbd., hvormeget faaer han i Virkeligheden? Renten som ovenfor. Efter § 12 kun 15000 Nbd.

Anm. Beregninger af Renters-Rente eller sammensat Rentesregning kan kun fuldstændigt udvikles under Forudsætning af Kundstab til Logarithmer, ved hvil Hjælp ogsaa Annuitets-Beregninger, Terminers Reduction m. m. maae foretages. Tabeller til Brug ved Renteberegninger maae selv anvise deres Indretning og Anwendung.

Selbstabs-Negning.

§ 17. Denne er den praktiske Anwendung af den Op-gave, at dele en Størrelse i Dele, der forholde sig til den, som Delene af en anden Størrelse til denne.

Erl Størrelsen $a = p + q + r \dots$, skal b deles i lige-saamange Dele x, y, z ..., saa at

$$\begin{aligned} a : p &= b : x \\ a : q &= b : y \\ a : r &= b : z \text{ o. f. v.} \end{aligned}$$

Beregningen skeer ved Reguladetri.

Selbstabs-Negningen har Anwendung, hvor en Capital skal deles i Forhold til de Summer, Flere have sammenfødt; hvor et Bo med Underbalance skal betale Creditorerne o. f. v.

Kjædereglen.

§ 18. Staae flere Reguladetri-Stykker i en saadan For-bindelse med hverandre indbyrdes, at hvad der er Facit i det foregaaende bestandigt bliver Efterled i det følgende, og altsaa i dette skal underkastes ny Beregning, da funne disse forskjellige Beregninger ofte til stor Lettelse foretages paa eengang.

Lad a, b, c, ... betegne Leddene i Reguladetri-Stykkerne, saa at man har:

$$\begin{array}{rcl} a & - & b - c \\ & & \text{Facit } z; \\ d & - & e - z \\ & & \text{Facit } y; \\ f & - & g - y \\ & & \text{Facit } x; \end{array}$$

da er $x = \frac{gy}{f}$, $y = \frac{ez}{d}$, $z = \frac{bc}{a}$, og indsættes efterhaanden Værdierne for z og y , haves

$$x = \frac{g \cdot e \cdot b \cdot c}{f \cdot d \cdot a},$$

hvorfaf sees, at Facit er ligt Productet af alle Mellemleddene og det første Efterled, divideret med Productet af alle Forleddene. Af Reguladetri-Stykkerne seer man, at det er af samme Navn som g , det sidste Mellemled, hvilket ogsaa kan haves ved at betragte Udtrykket for x , der lader sig skrive

$$\frac{e}{f} \cdot \frac{b}{d} \cdot \frac{c}{a} \cdot g,$$

hvor c og a , b og d , e og f ere eensbenævnte Størrelser, og altsaa deres Quotient ubenævnt.

For at opsette et Stykke efter Kædereglen, drager man en vertical Linie som ved den Neesiske Regel, og sætter overst paa venstre Side x , deroverfor sidste Led af det første Reguladetri-Stykke, der er den Størrelse, som skal beregnes; under x sættes Reguladetri-Stykkernes Forled, og under c deres Mellemled. Som ved den Neesiske Regel hørskaffer man Broker, forforter, og beregner x .

Altsaa saaledes:

$$\begin{array}{c|c} x & c \\ a & b \\ d & e \\ f & g \\ \hline f.d.a.x & = g.e.b.c \\ x & = \frac{g.e.b.c}{f.d.a}. \end{array}$$

Man mørke endnu vel, at enhver paa høire Side staende Størrelse og den nærmest nedenfor staende til Venstre (som c og a, b og d) ere af samme Navn, og de ligeudfor hinanden staende Størrelser ligestore, eller maae for Beregningens ansees som ligestore ($1 \ddot{\text{A}} = 4 \text{ Rbd.}$).

§ 19. Anvendelser af Kjædereglen vil man især mode, naar et Lands Mynt, Vægt eller Maal sammenlignes med et andet Lands, og de givne Bestemmelser først gjennem et eller flere Mellemled føre til Maaledes naar Mynter sammenlignes efter deres Lædighed og Forhold til en Mark Kølnuff fin, eller ved Hjælp af Courser, som ikke ere noterede directe mellem de to Steder. Ogsaa kan, hvor Gjenstande byttes mod hverandre, forskellige Ting komme til Sammenligning gjennem et Stykke.

Exempel. Et Stykke Klæde, der holder 30 Brabandter Alen, er i Hamborg indført til 330 Courant Mark. Hvor meget vil en dansk Alen, hvoraf 11 funne regnes lig 10 Brabandter Alen, koste foruden Told og andre Omkostninger, naar Courant er 25 p. c. slettere end Banco, og Coursen paa Hamborg er pari?

Her ere Reguladetri-Styfferne:

$$11 \text{ danske Al.} - 10 \text{ Brabandter Al.} - 1 \text{ dansk Al.}$$

$$\text{Facit } \frac{10}{11} \text{ Brb. Al.}$$

$$30 \text{ Brb. Al.} - 330 \text{ Courant Mark} - \frac{10}{25} \text{ Brb. Al.}$$

$$\text{Facit } 10 \text{ Courant Mf.}$$

$$125 \text{ Courant Mf.} - 100 \text{ Banco Mf.} - 10 \text{ Courant Mf.}$$

$$\text{Facit } 8 \text{ Banco Mf.}$$

$$300 \text{ Banco Mark} - 200 \text{ Rbd. Sedler} - 8 \text{ Banco Mark}$$

$$\text{Facit } 5 \text{ Rbd. } 2 \frac{1}{2} \text{ Sedler.}$$

Man opstetter nu efter Kjædereglen

x	1 dansk Al.
11 danske Al.	10 Brb. Al.
30 Brb. Al.	330 Cour. Mf.
125 Cour. Mf.	100 Beo. Mf.
300 Beo. Mf.	200 Nbd. Sedler.
3 x	= 16 Nbd. Sedler.
x	= 5 Nbd. 2 1/2.

Man kan læse dette saaledes: Hvormeget kostet 1 dansk Alen, naar 11 danske Al. er lig 10 Brb. Al., naar 30 Brb. Al. er lig 330 Cour. Mf., naar 125 Cour. Mf. er lig 100 Beo. Mf., og naar 300 Beo. Mf. er lig 200 Nbd.? Og som ovenfor anmærket agte man vel paa, at ethvert Led paa højre Side af Linien bliver eensartet med det nærmest nedenfor staaende til Venstre, og at de oversor hinanden staaende blive ligestore. (I første Henseende vogte man sig for at forverle eensartede Størrelser, f. Ex. Rigsbankdaler, Mark, Skilling, med eensbenævnte).

Anm. 1. Det kan oftere hænde, at man ved Multiplicationen faaer meget store Tal ud; disse kan man da dividere efter Reglerne for forkortet Division med Decimalbrøker, og i Quotienten bestemme 3 Decimaler, hvis det er Rigsdalere, man faaer ud i Facit. De som Decimalbrøk udtrykte Nbd. gjøres let til Skilling, naar erindres, at 0,50 Nbd. er 48 1/2; 0,25 Nbd. er 24 1/2; 0,125 Nbd. = 12 1/2.

Anm. 2. Man vil let indsee, at efter Kjædereglen ogsaa kunne beregnes de til sammensat Rentesregning henhørende Stykker, naar disse tænkes opsatte paa den § 13 Anm. 2 antydede Maade.

Exempel. Hvormeget udgør Capital, Renter og Renters-Rente af 3000 Nbd. 4 p. c. p. a. i 3 Aar?

x	3000
100	104
100	104
100	104 Nbd.
1000 x	= 3374592 Nbd.
x	= 3374,592 Nbd.
	= 3374 Nbd. 3 1/2 9 1/2.

Skal en allerede tillagt Rente igjen fradrages, kan det skee paa samme Maade, kun at 100 og 104 bytte Plads.

Anm. 3. Skulle i Exemplar, som det til denne Paragraph givne, visse Procent tillægges, kan det skee i samme Styke. Beregnede man hif Told og andre Dinkostninger til 10 p. c. af Beløbet, da vilde de være medregnede, naar paa venstre Side tilføiedes 100, paa høire 110. Høyde 10 p. c. af en eller anden Grund (kun ikke som forud tillagte) været at fraregne, vilde dette være flest ved paa samme Maade at tilføie 100 og 90 (ikke 110 og 100). Skulde af det samme Beløb have været beregnet baade 3 og 7 p. c., da vilde de have været at sammenlægge til 10 p. c. Men tillægges først 3 p. c. og til det derved blomme 7 p. c., da maa siges 100 — 103 og 100 — 107, eller 100 — 107 og 100 — 103.

§ 20. Foruden de her udviklede Regningsarter vil man i Regnebøgerne finde ansørt undertiden endog et stort Antal af andre, der dog alle ere at henføre til een af disse, idet Navnene kun ere hentede fra de Gjenstande, Beregningen angaaer, ikke fra nogen Ejendommelighed i denne.

Skoleesterretninger

for

1848—1849.

Flere foregaaende Programmer har jeg været nødsaget til at bemærke, at der endnu ikke var taget nogen afgjørende Beslutning om denne Skoles forestaaende Udvigelse. At denne Sag, saavidt mig bekendt, heller ikke i Aar er bragt videre, finder imidlertid sin tilstrækkelige Forklaring i Tidsomstændighederne, og det er derfor kun for Huldstændigheds Skyld, at jeg her paany bringer den paa Bane. Derimod troer jeg her at burde omtale en anden Sag, der vel ikke angaaer denne Skole særligt, men er saa vigtig for alle de ved de lærde Skoler ansatte Lærere, at den fortjener at bringes til almindelig Kundskab. Det har nemlig paa allerunderdanigst Forestilling af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet behaget H. M. Kongen under 10de Marts d. A. allernaadigst at bestemme følgende Gagereglement for Adjunterne ved de lærde Skoler til fra 1ste Januar d. A. at regne at træde i Kraft, nemlig:

for de 12 ældste Adjunter en Gage af 800 Rbd. aarlig
- - 14 næste — - - - 700 — —
- - 16 — - - - 600 — —
- - 20 — - - - 500 — —
- - alle de øvrige — - - - 400 — —.

Bed samme allerhøieste Resolution har det endvidere behaget Hans Majestet allernaadigst at tillijendegive, at fra samme Tidspunkt, da hin Normering af Adjunct-Gagerne træder i

Kraft, skulle de aarlige Indstillinger om temporaire Understøttelser til Adjuncterne bortfalde, hvoraf det er en Selvfolge, at Adjuncterne ved de lærde Skoler fremtidigen aldeles ikke kunne vente sig saadanne temporaire Understøttelser bevilgede, som efter Indstilling, tidligere af den forrige Direction for Universitetet og de lærde Skoler og senest af Ministeriet, hidtil have været flere af disse Embedsmænd allernaadigst forundte i det Diemed derved tilnærmelsesvis at supplere Adjunctgagerne i det Hele til de nu for disse bestemte Normalbeløb, og vil derfor for Eftertiden intetomhøst Andragende fra Adjuncterne om denne Art Understøttelser af Ministeriet blive taget i Betragtning*).

Hvad nu Slagelse Skole særligen angaaer, har ingen Forandring fundet Sted i Lærerpersonalet; men de constituerede Lærere Cand. Theol. Carl Christian Wilhelm Silfverberg og Cand. Theol. Frederik Julius Christian Munch ere, den førstnævnte under 27de Januar d. A. og den sidstnævnte under 15de December s. A., allernaadigst befiskede til Adjuncter ved Skolen.

Med Hensyn til Fordelingen af Undervisningsgjenstandene imellem Skolens Lærere, Rector, Overlærer Wiehe, Adjuncterne Monster, Fischer, Silfverberg og Munch, Musiklærer Schwarz og Tegnelærer Hansen, er ingen Forandring skeet. Jeg henviser derfor til forrige Aars Program S. 20.

*) Hvorvidt et saadant Gagereglement og den deraf følgende Opbævelse af temporaire Understøttelser ogsaa bestaaer for de ved de lærde Skoler ansatte Rectorer og Overlærere, skal jeg ikke kunne sige med Visshed, da Intet derom officielt er blevet Skolen meddeelt. Dog er det muligt, at et saadant Normalreglement findes i Selmers Aarbog for Kjøbenhavns Universitet o. s. v. for 1847 S. 200, hvor det angives, at fra 1ste Januar 1848 havde 2 Rectorer hver 2200 Rbd. aarlig, 2 hver 2000 Rbd., 3 hver 1800 Rbd., 4 hver 1600 Rbd. og 3 hver 1400 Rbd. Af Overlærerne havde 5 hver 1400 Rbd., 5 hver 1200 Rbd., 6 hver 1000 Rbd. og 3 hver 800 Rbd.

Skolens Dimittender i Aaret 1848.

Dimittendernes Navne.	Ii Udarbeideelse i Uebersmaaet.	Latin.	Latin & S. lit.	Graeff.	Schrift.	Religion.	Geographie.	Historie.	Skriftskeft.	Geometrie.	Zypff.	Fraaff.	Hoved- Charakter.
1. E. J. D. Werner	Laud.	H. ill.	N. et.	H. ill.	H. ill.	Laud.	H. ill.	Laud.	Laud.	H. ill.	Laud.	H. ill.	Haud illaud.
2. E. P. C. Engberg	Laud.	H. ill.	H. ill.	H. ill.	H. ill.	H. ill.	H. ill.	H. ill.	H. ill.	Laud.	Laud.	Laud.	Haud illaud.

Antallet af Skolens Disciple beløb sig efter sidste Program til 32. Af disse blev 2 dimitterede med det Udfald, som den paa foregaaende Side aftrykte Liste udviser. Endvidere blev Georg Carl Theodor Schäffer udmeldt den 30te Decbr. f. A. for at vælge en anden Bestemmelse. Derimod optoges fra 1ste Sept. f. A. 6 nye Disciple og fra 1ste Octbr. f. A. een. Skolen har saaledes for Dieblifket 36 Disciple, der paa følgende Maade ere fordelede i Classerne:

Fjerde Classe.

1. Carl Viggo Gøgsche, Son af Pastor H. C. Gøgsche, Sognepræst til Hjørring ved Slagelse.
2. Johannes Magnus Waldemar Nellemann, Son af afdøde Cancellieraad, Hospitalsforstander M. G. Nellemann i Slagelse.
3. Jens Holger Assenius Bach, Son af Pastor J. A. Bach, Sognepræst til Gyderup og Holmstrup.
4. Johan Wilhelm Beck, Son af Probst J. P. H. Beck, Sognepræst i Udby.
5. Niels Benzon, Son af Pastor C. H. B. Benzon, Sognepræst for St. Peters Menighed og ved Hospitaliet i Slagelse.

Tredie Classe.

1. Christian Mørk Jungersten, Son af Pastor J. H. A. Jungersten, Sognepræst til Bregninge og Bjergsted.
2. Hans Henrik Hansen, Son af afdøde Møller H. H. D. Hansen i Ågerup Mølle.
3. Theodor Valentin Schou, Son af Kjøbmand H. H. Schou i Slagelse.
4. Anton Frederik Schondel, Son af Apotheker W. A. S. Schondel i Middelfart.

5. Rasmus Peter Fog, Son af Procurator S. L. Fog i Slagelse.
6. Henrik Jørgen Greensteen, Son af afdøde Godsforvalter A. Greensteen paa Rygaard.
7. Carl August Elberling, Son af Skolens Rector.
8. Ditlev Ludvig Rogert Gøgsche, Son af Pastor H. F. Gøgsche, Sognepræst til Gjerslev.
9. Rudolph Emil Elberling, Broder til Nr. 7.
10. Ludvig Peter Fenger, Son af Pastor P. A. Fenger, Sognepræst til Slotsbjergby og Sludstrup.
11. Christian Carl Gøgsche, Broder til Nr. 8.
12. Frederik Conrad Petersen, Son af afdøde Spindeste-
mester J. Petersen i Slagelse.
13. Harald Salicatti, Son af afdøde Provst G. G. Sa-
licatti, Sognepræst til Stillinge.

Auden Classe.

1. Andreas Greensteen, Broder til Nr. 6 i 3die Classe.
2. Hans Wilhelm Lund, Son af Kjøbmand J. G. Lund i Slagelse.
3. Peder Nielsen, Son af Gaardmand Niels Pedersen i Forsinge pr. Kallundborg.
4. Jørgen Balthasar Møller, Son af Secretair, Told-
fæsserer P. Møller i Skjelstør.

Første Classe.

1. Sophus Mads Jørgensen, Son af Skreddermester J. Jørgensen i Slagelse.
2. Ludvig Beethoven Jessen, Son af Beipiqueur G. Jessen i Slagelse.
3. Peter Evald Koenig, Son af Klokker og Lærer W. E. F. Koenig i Slagelse.

4. Theodor Vilhelm Laurentius Hansen, Son af Sadelmagermester F. M. Hansen i Slagelse.
 5. Poul Pierre Ferdinand Mourier, Son af Proprietair W. C. Mourier paa Lille-Antvorskov ved Slagelse.
 6. Carl Emil Ludvig Hoffmann, Son af Farver C. E. Hoffmann i Slagelse.
 7. Jørgen Theodor Jørgensen, Son af afdøde Kjebemand H. Jørgensen i Slagelse.
 8. Hans Peter Christian Freisleben, Son af Districtslæge H. C. Freisleben i Skjelskør.
 9. Philip Julius Schou, Broder til Nr. 3 i 3die Classe.
 10. Ludolph Emil Fog, Broder til Nr. 5 i 3die Classe.
 11. Albrecht Rudolph Embrianus Holck, Son af Consumtions-Inspecteur C. E. Holck i Slagelse.
 12. Rasmus Peter Frederik Rasmussen, Son af Jernstøber H. Rasmussen i Slagelse.
 13. Jens Martin Stampe, Son af Brændevinsbrænder A. Stampe i Slagelse.
 14. Carl Georg Schleppegrell, Son af afdøde Student A. Schleppegrell.
-

De i indeværende Skoleaar i de forskjellige Classer gjen-nemgaaede Pensa ere følgende:

Sjerde Classe: Livii Hist. lib. III et IV; Ciceronis Disputatt. Tuscul. lib. I et V; Eiusd. Oratio pro Archia poeta; Horatii Epistolae; Virgilii Aeneid. lib. II et IV; Madvigs Latiniske Sproglære. — Herodoti Hist. lib. IV; Platonis Crito; Luciani Cataplus sive Tyrannus et Deorum Dialogi; Homeri Iliad. lib. XV—XVII; Langes Græske Grammatik, især Syntaren. — I Hebraisk have de ældre Disciple læst de befalede 40 Capitler af Genesis; den yngre

Cap. 1—30; Whittes Hebraiske Sproglære. — En Oversigt over den Danske Litteratur efter Thortsens historiske Udsigt over samme fra § 1—12 (Frederik den Femtes Dage). Af de vigtigste Forfattere ere Prøver enten læste af Disciplene eller forelæste for dem. Af den nyere Litteratur er desuden læst Schleenschlegers „Haken Karl“, Stykker af hans „Digtekunst“ samt Heibergs Afhandling „om Vaudevillen.“ Hver Uge er streven en Dansk Stiil, blandt hvilke maanedlig een Religionsopgave, opgiven og bedømt af Religionslæreren. — Krog Meyers Lærebog i den christelige Religion; Herslebs Bibelhistorie; Lucae Evangelium. — Af den gamle Historie fra Begyndelsen indtil Macedonien efter Kosods gamle Historie ved Langberg; desuden repeteret fra Macedoniens Historie til de Romerske Keisere. Hele den nyere Tids Historie efter Kosods Udtog af Verdenshistorien. — Efter Ingerslevs Lærebog i Geographien læst Europa og repeteret de andre Verdensdele. — Det befalede Cursus af Arithmetiken efter Bergs Lærebog, og af Tillæget til samme Logarithmer, Kjødebros, Rækker og Rentesregning. — I Geometrien Bergs Lærebog med Tillæg; den mathematiske Geographie efter Steen. — Hjorts Tydiske Lærebog (2den Udg.) S. 532—579; Schillers „die Piccolomini“ 2ter—5ter Aufzug; „Wallensteins Tod“ 1ster, 2ter u. 3ter Aufz. Hjorts Tydiske Grammatik. — Bjerrings Lectures Françaises (2den Udg.) S. 1—72; Borrings Franske Grammatik; Ingerslevs Materialier til at indøve den Franske Formlære S. 32—47, 1—19. Cursorisk er læst Borrings Études littéraires Tome 1 Notices littéraires.

Tredie Classe: Caesaris Comm. de Bello Gall. lib. IV—VI; Ciceronis Oratio pro S. Roscio Amerino; af Ovidii Metamorph. efter Felsbausch's Udgave følgende Stykker: Skabelsen (I vs. 5—88), Deucalion (I vs. 260—415), Europa (II vs. 835—875), Cadmus i Theben (III vs. 1—130), Ino

og Athanas (IV vs. 416—542), Dædalus (VIII vs. 155—261), Cyparissus (X vs. 106—142), Hyacinthus (X vs. 162—219). Af Madvigs Latiniske Sproglære er læst Beiningslæren samt det Vigtigste af Orddannelseslæren; af Syntaxen de to første Absnit samt Adskilligt af tredie Tillæg om Pronominernes Brug. To Stile om Ugen, deels efter dicterede Opgaver, deels efter Ingerslevs Materialier. — Herodoti Hist. lib. III cap. 61—127; Homeris Iliad. lib. XXIII vs. 93—XXIV vs. 246; af Langes Græske Grammatik Formlæren. — Af Genesis de ældre Disciple Cap. 3—7 og det Vigtigste af Formlæren, undtagen Nominallæren, Talordene og de uregelmæssige Verber efter Whittes Hebræiske Sproglære. De yngre Disciple af Genesis Cap. 1—3 Vs. 11; af Whittes Sproglære Cap. 1, 2, 3, 5, 8, 9 til § 73 og 11. — Uudvalgte Stykker af H. P. Holsts prosaistiske og poetiske Danske Lærebog samt Dehlsens schlægers „Nordens Guder.“ Hver Uge en Dansk Stil, hvoriblandt to maanedlige Versioner. — Af Krog Meyers Lærebog i den christelige Religion §§ 59—115; af Herslebs Bibelhistorie 1ste og 2den Afdeling; Jensens historisk-geographiske Beskrivelse af Palæstina. — Af den gamle Historie: Romas Historie til Åar 69 efter C. J.; af den nyere Historie: Norges, Sverrigs, Ruslands, Preussens, Polens, Ungarns, Tyrkiets, det Græske Keiserdømmes, Arabernes, Persernes, Mongolernes og Chinesernes Historie. — Af Geographien: Danmark, Holland, Belgien, det Britiske Rige, Frankrig, Spanien, Portugal, Schweiz, Italien, det Tyrkiske Rige og Grækenland. — Arithmetik: Bergs Lærebog Cap. 6—13. — Geometrie: af Bergs Lærebog anden Hovedafdeling. — Hjorts Tydske Lærebog (2den Udg.) S. 146—164; 194—234; Sammes Grammatik S. 146—172 og S. 1—64. — Borringhs Études littéraires Tome I (3die Udg.) S. 335—377; 1—10; af

Abrahams's Franske Grammatik S. 132—194; Ingerslevs Materialier S. 23—37.

Anden Classe: Det ældre Partie: Cornelii Nepotis Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus, Conon, Dion; Phaedri Fabular. lib. I et II, 1—4; Stiil er ffreven to Gange ugentlig efter Ingerslevs Stiiløvelser, Version een Gang om Ugen. Det yngre Partie: af Borgens Latiniske Lærebog fra 3die Afsnit § 30 til Slutningen af 4de Afsnit; Cornelii Nep. Cimon et Lysander; Stiil er ffreven 3 Gange om Ugen efter Trojels Stiiløvelser, i Slutningen af Aaret nogle Versioner. Af Madvigs Sproglære har hele Classen læst Lydlæren, Boeiningslæren, Ordfoiningslæren, af hvis andet og tredie Afsnit dog det Meste er forbigaet. — Græsk: det ældre Partie: Langes Materialier (3die Udg.) S. 23—39, 63—67, 71—81, 92—96, 116—127; af sammes Grammatik Formlæren. Det yngre Partie: Langes Materialier S. 3—28; af sammes Grammatik det Vigtigste af Formlæren. — Molbechs Danske Lærebog S. 19—76; Mallings Store og gode Handlinger (2den Udg.) S. 333—356, 1—44; Oppermanns Indledning til den Danske Sproglære; Holts Interpunctionsregler. En Stiil om Ugen, deels ffreven hjemme, deels paa Skolen. — Balles Lærebog i den christelige Religion Cap. 5—8; Herslebs Bibelhistorie forfra til det Israelske Niges Deling. — Af den gamle Historie Noms Historie fra Decemvirenne til Vespaian; af den nyere Historie: Danmark fra 1702; Norge, Sverrig, Rusland, Preussen, Polen og Ungarn. — Geographie: Tyskland fra Würtemberg, Østrig, Danmark, Holland, Belgien, England, Franfrig, Spanien og Portugal. — Arithmetik: Bergs Lærebog Cap. 1—6. — Geometrie: Bergs Lærebog Cap. 1—6. — Hjorts Tyskse Lærebog (2den Udg.) S. 21—73; Sammes Gram-

matis S. 1—78. — *Franſſ*: Borrings Manuel de langue Française (4de Udg.) S. 101—142, 156—165; Abrahams's Grammatik S. 44—118; Retroverteren til Franſſ.

Sørſte Classe: Af Borgens Latinſke Læſebog har øverſte Partie læſt §§ 30—50, nederſte Partie §§ 1—26; hele Classen har læſt Madvigs fortære Bearbeidelse af den Latinſke Formlære indtil Orddannelseslæren. I Slutningen af Året har øverſte Partie ſkrevet nogle Stile efter Trojels Stilſøvler. — Hjorts Danskē Borneven S. 364—499; Bojesens fortſattede Danskē Sprøglære; Dictat to Gange om Ugen og i det ſidſte Halvår een Stil om Ugen ſtreven hjemme. — Valles Værebog i den christelige Religion Cap. 1—5; af Valſlevs Bibelhistorie det nye Testament. — Af Roseds fragmentariske Historie er læſt hele Middelalderens vigtigſte Begivenheder og af den nyere Historie indtil 1815. — I Geographien er læſt efter Thriges Lær:bog det 3de Afsnit om Jordſlodens Bjerger og Floder; det 4de om Klima og Producter i Almindelighed, og af det 5te Afsnit om Jordſlodens Beboere i Almindelighed og Europas i Sædeleshed samt en Oversigt over Europas politiske Inddeling i Stater, diſses Omfang, Størrelſe, Folkemængde, forskellige Regeringsformer, Religioner og Næringsveie til den mere ſpecielle Statistik af de enkelte Stater i Europa. — Rüſes Tydſke Læſebog S. 72—125, Chorlæſning, Oversættelſe, grammaticalſt Analyſe; S. 58—64 ere lært udenad.

Bed Tegneunderviſſningen i de to nederſte Classer øves Disciplene afverlende i geometriſt Tegning og Frihaands-tegning.

Idet jeg her meddeler et Udtog af Skolens Regnskab for Året 1848, vil jeg tilføje den Bemærkning, at i dette for første Gang forekommer en Indtægtspost, der vil gientage sig i de følgende Regnskaber, nemlig Tilskud fra den almindelige Skolefond. Dette Tilskud har den Besydnning, at de Præmier, Skolens gifte Lærere have at erlægge til Livrente- og Førsorgelses-Anstalten af 1842, her indbetales i Skolens Kasse for derefter at udbetales af den almindelige Skolefond.

	Rbd.	St.
Samtlige Indtægter have belebet sig til	19109	33 $\frac{3}{4}$
Udgifterne	16969	54 $\frac{1}{2}$
	<hr/>	<hr/>
Beholdning	2139	75 $\frac{1}{4}$
Indtægterne have været følgende:		
1. Beholdning efter Regnskabet for 1847	2467	53 $\frac{1}{4}$
2. Renter af Skolens Capital (828 $\frac{1}{2}$ Rbd.) og af det Ørslevske Legat fra Korsør (50 Rbd.).	33	64
3. Heininge Sogns Kongetiende (113 Tdr. 4 $\frac{1}{2}$ Skp. Byg)	306	37
4. Afgiften af Skolegaardens Grundtaxtlod (7 $\frac{1}{2}$ Tdr. Land)	45	39
5. Degnepensioner	223	80
6. Af Byens Kirker 3 Tdr. Byg	8	78
7. Samtlige Skolecontingenter (Skolepenge, Lyse- og Brændepenge, Indstrivnings- penge, et Testimonium, Refusion for Cha- rakteerbøger)	850	14
8. Indtægter af Slagelse Hospital	13782	8 $\frac{1}{2}$
9. Overstud af Kallundborg nedlagte Latin- skoles Indtægter for Året 1847.	264	86
	<hr/>	<hr/>
Lateris	17982	75 $\frac{3}{4}$

	Transport	Rbd.	St.
	17982	17982	$75\frac{3}{4}$
10. Bidrag af Byens Kirker til Skolebygningens Bedligeholdelse	100	"	
11. Forskjellige og extraordinaire Indtægter	425	42	
12. Tilbagebetalte Gageforuskud	576	48	
13. Tilskud fra den almindelige Skolefond	23	50	
14. Indtægt ifølge Decision til Regnskabet for 1847	1	10	
	Tilsammen	19109	$33\frac{3}{4}$

Udgifterne have været følgende:

1. Gager til Skolens faste og constituerede Lærere	4509	59
2. For Tidneundervisning (derunder Betaling til Skolens Ganglærer, Gymnastiklærer og Tegnelærer)	300	"
3. Pension til en afdød enslediget Lærers Enke.	100	"
4. Udgifter til Bibliotekets Forsyning	133	17
5. Udgifter i Anledning af Bygningernes Bedligeholdelse	236	8
6. Udgifter til Inventariets Bedligeholdelse og Forsegelse	13	24
7. Udgifter til de gymnastiske Apparaters Bedligeholdelse og Forsegelse samt til Badetoure for Disciplene	58	52
8. Brændselsforsyninger	173	32
9. Belysningsudgifter	44	20
10. Skatter af Skolegaarden, dens Jorder og Heininge Tiende, med Fradrag af Lateris	5568	20

	Transport	Nbd.	St.
		5568	20
den Deel, som refunderes af Brugerne af Skolens Jorder (deraf Krigsskat 22 Nbd. $71\frac{1}{2}$ St.)		130	$18\frac{1}{2}$
11. Regnskabsførerens Procenter for 1848 og Portoudgifter i Anledning af Regn- skabet		212	19
12. For Skoleopvarming og Budløn		34	"
13. Reengjøringssudgifter		52	15
14. Expeditionsgebyr		12	"
15. Udgifter i Anledning af Programmet for 1848		50	73
16. Forskjellige Udgifter		39	43
17. Udgift ifølge Decision til Regnskabet for 1847		1	21
18. Udestaaende Restancer for Året 1848 .		192	85
19. Bevigede Gageforskud		576	48
20. Afgivet Overskud til den almindelige Skolefond		10100	"
	Tilsammen	16969	$54\frac{1}{2}$

Stipendiefondens rentebærende Capital, som
efter forrige Åars Program udgjorde 8975 Nbd., er i Løbet
af 1849 forbleven uforandret og udgjør saaledes 8975 Nbd.
foruden 200 Nbd., som ere indsatte i Sparekassen for Ring-
sted og Omegn. — Skolebeneficierne for Skoleåret
1848—49 ere ved Resolution af Ministeriet for Kirke- og
Undervisningsvæsenet af 27de October 1848 fordelede saaledes:

1. Høieste Stipendium, 50 Nbd. (af hvilke 20 Nbd.
udbetales og 30 Nbd. opplægges): J. M. W. Nellemani,
C. B. Götzsche og J. H. A. Baché.

2. Mellemste Stipendium, 35 Nbd. (af hvilke 15 Nbd. udbetales og 20 Nbd. oplægges): C. A. Elberling og H. J. Greensteen.

3. Laveste Stipendium, 20 Nbd. (af hvilke 10 Nbd. udbetales og 10 Nbd. oplægges): N. Benzon, N. E. Elberling, N. P. Fog, A. J. Schondel, F. C. Petersen og A. Greensteen.

4. Fri Underviisning (foruden Stipendiærerne): J. W. Beck, C. M. Jungersen, J. B. Møller, H. W. Lund og P. E. Koenig.

Disciplenes Morskabsbibliothek har i Aarene fra 1ste Juli 1847 til 1ste Juli 1849 hørt følgende Tivært:

H. C. Andersen, De to Baronesser, 3 Dele.

Vagge sen, Danske Værker, 11te og 12te Bd.

Buchwald, Grindringer.

Bulwer, Paul Clifford, 2 Dele.

Caroline Mathilde, 2 Dele.

Holberg, Comoedier ved Boye.

Howard, Jack Ashore, 2 Dele.

James, Herren af den gamle Skole, 2 Dele.

Laurent, Livet i Felten.

Lever, Tom Burke, 3 Dele.

Læssøe, Anmærkninger til „den slesvigste Krig 1848“.

Marryat, Den fattige Jack, 2 Dele.

— Violets Reiser, 2 Dele.

— Jacob Erlig, 2 Dele.

— Snarleyjaw, 2 Dele.

— Dødsseileren, 2 Dele.

— Joseph Rushbrook, 2 Dele.

— Midshipman Easy, 2 Dele.

— Drøgscapitainen.

- Morath, Nordisk Penningmagazin 1847 og 1848.
 Novelletidende 1849, 1—6.
 P. P., P. Tordenskjold, 4 Døle.
 — N. Juel, 4 Døle.
 Riise, Archiv for Hist. og Geogr. 1824.
 W. Scott, Ivanhoe, 2 Døle.
 — Quentin Durward, 3 Døle.
 Den slesvigiske Krig 1848. Ved en Officer i Armeen.
 H. Smidt, Den hollandske Admiral, 4 Døle.
 E. Sue, Søtaarnet, 2 Døle.
 Ussing, Reisbilleder fra Syden, anden Deel.
 I Løbet af indeværende Åar er forfattet en alphabetisk
 Katalog over Bøgerne, hvorfra hver Classe har fået et
 Exemplar.
-

Udsigt over Discipelbibliotekets Regnskab fra 1ste Juli
 1847 til 30te Juni 1849.

Indtægt.

- | | | | | |
|--|----|------|----|-----|
| 1. Contingent i Året 1847—1848 | 32 | Rbd. | 48 | Sf. |
| 2. Contingent i Året 1848—1849 | 33 | — | “ | — |
-

Tilsammen 65 Rbd. 48 Sf.

Udgift.

- | | | | | |
|---|----|------|----|-----|
| 1. Underbalance efter Regnskabet for 1847 | 13 | Rbd. | 44 | Sf. |
| 2. For indkøbte Bøger | 29 | — | 32 | — |
| 3. Bogbinderarbeide m. m. | 13 | — | 48 | — |
-

Tilsammen 56 Rbd. 28 Sf.

Beholdning 9 Rbd. 20 Sf.

- Skolebibliotheket selv er siden sidste Programs Udgivelse blevet forøget med følgende Bøger:
- P. Adler, Efterretninger om Byen Ribe. 11te Samling. Ribe 1848. 8. (Pr.)
- Annaler for Nordisk Oldkyndighed. 1848. Kbhvn. 8.
- Antiquarisk Tidsskrift, udg. af det Kgl. Nordiske Oldskrift-Selskab. 1846—48. Iste Hefte. Kbhvn. 1847. 8.
- Antislesvig holsteenske Fragmente r. 5—8. og 10. Hefte. Kbhvn. 1848. 8.
- Aristophanis Comoediae et perditarum fragmenta, ex nova recensione G. Dindorf. Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatoria. Graece et Latine. Parisiis 1846. 8.
- Arriani Alexandri Anabasis. Edidit C. G. Krueger. Vol. II. Berolini 1848. 8.
- Balthasari Castilionei Aulici liber tertius, secundum veterem versionem editus notisque instructus a N. C. L. Abrahams. Hauniæ 1848. 4. (Pr.)
- C. A. Becker, Historisk Museum eller Tidsskrift for utrykte historiske Kildeskrifter. I, 1. Kbhvn. 1849. 8.
- W. A. Becker, Gallus. Zweite Ausg. von W. Rein. I—III. Leipzig 1849. 8.
- C. F. W. Bendz, Bidrag til Horsens lærde Skoles Historie. 1ste Hefte. Horsens 1848. 8. (Pr.)
- Tredie Beretning om Odense Realskole. Odense 1848. 8.
- A. F. Bergsøe, Den danske Stats Statistik. III, 4 og IV, 1. Kbhvn. 1848. 8.
- Biblia, det er den ganske Hellige Skrifts Bøger, 19de Oplag. Kbhvn. 1842. 8.
- Bionis et Moschi Carmina. Recensuit G. Hermannus. Lipsiae 1849. 8.
- J. C. C. Birch, Bemærkninger om Sprogundervisningen i de lærde Skoler. Kbhvn. 1848. 8. (Pr.)
- H. H. Blache, Efterretninger om Aarhus Cathedralskole i Skoleaaret 1847—48. Aarhus. 8. (Pr.)
- G. N. J. Bloch, Indbydelsesførschrift til den offentlige Examen i Roskilde Kathedralskole i Juli 1848. Roskilde. 8.

- H. G. Boehr, Efterretninger om det von Westenste Institut
for Skoleaaret 1847—48. Kbhvn. 1848. 8. (Pr.)
- E. F. Bojesen, Om den philosophiske Betydning af Ordet
ἀρχή (Princip) hos Aristoteles. Kbhvn. 1848.
8. (Pr.)
- C. A. Borries, E. Flemmer, S. y M. Schwartz, Ta-
bulae chronologicae et synopticae litterarum Ro-
manarum. Hauniae 1848. Fol.
- P. Bramsen og S. Dreser, Kortfattet Lærebog i Zoologie
og Botanik. 3de Udg. Kbhvn. 1849. 8.
- L. Brandes, de rheumatismo gonorrhoco disquisitio. Hau-
niae 1848. 8.
- K. Christian den 7. Jærdes egenhændige Breve o. s. v. I, 2.
Kbhvn. 1848. 8.
- H. N. Clausen, Catholicismens og Protestantismens Kirke-
forsættning, Være og Ritus. Kbhvn. 1825. 8.
- , Fortolkning af de tre første Evangelier. 3de
Heste. Kbhvn. 1847. 8.
- A. Crone, Valdemar Knudsen, Bislop i Slesvig og Erfe-
bislop i Bremen. Odense 1848. 8. (Pr.)
- J. A. W. Diesterweg, Lehrbuch der mathematischen Geo-
graphie und populären Himmelsfunde. 3te Auflage.
Berlin 1848. 8.
- Edda Snorra Sturlusonar, eða Gylfaginníng, Skáldskapar-
mal og Háttatal. Utgesin af S. Egilssyni. Reykja-
vik 1848. 8.
- J. S. Ersch und J. G. Gruber, Allgemeine Encyclopädie.
1ste Sect. 47 u. 48 Th.; 3te Sect. 24 Th. Leip-
zig 1848. 4.
- Th. H. Erstew, Almindeligt Forsatter-Lexicon. 11te Hestc.
Kbhvn. 1848. 8.
- G. Fistaine, Principia nomina neo-latina formandi decli-
nandique. Hafniae 1848. 4.
- H. M. Flemmer, Annales Ciceroniani. Kbhvn. 1848.
8. (Pr.)
- Før Literatur og Kritik. VI, 2—4. Odense 1848. 8.

- F. T. Friedemann, Varånesen für studirende Jünglinge.
1ster Bd. 3te Aufl. Braunschweig 1848. 8.
- Gaii Institutionum Commentarii IV. Ex recensione et cum
commentariis I. F. L. Goeschenii, absolvit C.
Lachmannus. Bonnae 1841. 8.
- Geschichte der europäischen Staaten, herausgegeben von A. H.
C. Heeren und F. A. Uffert. 23ste Lieferung.
Hamburg 1848. 8.
- M. Hammerich, Kort Udsigt over det høiere Skolevæsen
i Sverrig. Kbhvn. 1848. 8. (Pr.)
- M. Mørk Hansen, Populær Fremstilling af Kirfens His-
torie. Kbhvn. 1848. 8.
- F. I. Heise, De natura et mutua ratione sonorum voca-
lium linguae Hebraeorum. Hauniae 1849. 8.
- H. Hertz, Tyrslig. Kbhvn. 1849. 8.
- Járn sida eðr Hákonarbók. Codex juris Islandorum anti-
quus, qui nominatur Jarnsida seu Liber Haonis.
Ex manuscr. pergamento legati Arnæ-Magnæani
editus. Hauniæ 1847. 4.
- Index scholarum et exercitationum, quae in Universitate
regia Haun. per aestatem et per hiemem a.
1848 itemque per aestatem a. 1849 habebuntur.
Hauniæ. 4. — Samme paa Dansk.
- Íslenzkur Annálar sive Annales Islandici ab anno Chr.
803 ad annum 1430. Hafniæ 1847. 4.
- J. Junge, Den nordjyællandske Landalmues Charakteer. 2de
Oppl. Kbhvn. 1844. 8.
- Karta öfver Sverige och Norrige, utgivsen af Sällskapet
för Vexelundervisningens befrämjande. Stock-
holm 1844.
- J. Rehrein, Überblick der Deutschen Mythologie. Göttingen
1848. 8.
- R. Kloß, Handwörterbuch der lateinischen Sprache. 3te und
4te Liefer. Braunschweig 1848—49. 8.
- N. Krossing, Opgaver til Øvelse i dansk Styl. 2den Udg.
Kbhvn. 1844. 8.
- C. G. Krüger, Genealogiske Tabeller til de Europæiske

Staters Historie fra disses Stiftelse indtil vor
Tid. Kbhvn. 1848. Tverfol.

C. C. A. Lange, Norsk Tidsskrift. II, 3—6; III, 1—2.
Christiania 1848—49. 8.

J. P. Laurent, Livet i Fælten. Kbhvn. 1849. 8.

J. Levin, Dansk Lydlære og Dansk Kjønslære. Kbhvn. 1844. 8.

Lister over Examen artium i Aaret 1848. Kbhvn. Fol.

Liste over Anden Examen i Aaret 1848. Kbhvn. Fol.

G F. G. Lund, De emendandis Ciceronis libris de officiis
observatt. criticae. Nyhobing 1848. 8. (Pr.)

J. Læssøe, Anmærkninger til den slesvigfiske Krig i 1848.
Kbhvn. 1849. 8.

I. N. Madvig, Bemerkungen über einige Puncte der griechischen Wortfügungslehre. Göttingen 1848. 8.

I. H. Mansa, Nørrejylland. Pl. 9 og Følgeblad. Landk.
Minning Kristjáns Konúngs Attunda. Reykjavik 1848. 8.

C. Molbech, Et Reise-Brev om Skole-Undervisning i Mordersmalet m. m. Kbhvn. 1848. 8.

I. P. Mynster, Disquisitio psychologica de Memoria et
Reminiscentia. (Om Hukommelsen.) Hauniæ 1849.
4. (Pr.)

— , Grundruds af den almindelige Psychologie. Kbhvn.
1830. 8.

J. B. Neergaard, Beskrivelse over Østerflakkebjerg Herred.
Kbhvn. 1830. 8.

— , Napoleon Bonaparte. I—II. Kbhvn. 1848. 8.

R. C. Nielsen, Indbydelsesstift til den offentlige Eramen i
den videnskabelige Realskole i Århus i Juli 1848.
Århus. 8.

R. Nielsen, Evangelietroen og den moderne Bevidsthed. Fore-
læsninger over Jesu Liv. I. Kbhvn. 1849. 8.

M. Niessen, Norsk Bog-Fortegnelse. 1814—1847. Christiania
1848. 8.

Nyt historisk Tidsskrift. II, 2. Kbhvn. 1848. 8.

Olafs Saga hins Helga. Udgivet af R. Keyser og C. R.
Unger. Christiania 1849. 8.

- F. C. Dílsen, *Efterretninger om Viborg Kathedralskole i Stoleaaret 1847—1848.* Viborg 1848. 8. (Pr.)
- Oratores Attici, edd. I. G. Baiterius et H. Sauppius. Fasc. VIII. Turici 1848. 4.
- W. Pape, *Handwörterbuch der Griechischen Sprache.* 4ter Bd. Braunschweig 1845. 8.
- A. Pauly, *Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft.* 99—103 Liefer. Stuttgart 1848—49. 8.
- N. M. Petersen, *Nordisk Mythologie.* 1—3 Heste. Kbhvn. 1849. 8.
- Poetarum tragicorum Graecorum Fragmenta exceptis Aeschyli, Sophoclis, Euripidis reliquiis collegit F. G. Wagner.* Vratislaviae 1848. 8.
- S. L. Povelsen, *Om Lydighedens Betydning for Opdragelsen.* Aalborg 1848. 8. (Pr.)
- Recueil d'anecdotes sur les personnages les plus remarquables de la Révolution Française. Paris 1798. 8.
- Reineke Føs. Oversat af Chr. Winther. Kbhvn. 1849. 8.
- C. Ritter, *Die Erdkunde von Asien.* Bd. VIII, 2te Abth., 1ster Abschnitt. Berlin 1848. 8.
- L. Sagen, *Dansk Stilebog eller Stof til skriftlige Forstandss og Sprog-Ovelser.* 3die Oplag. Bergen 1833. 8.
- A. Schjøth, *Geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge.* Christiania 1849. 8.
- H. Schmith, *Kosmogenie og Theogonie.* Kbhvn. 1848. 8. (Pr.)
- J. F. Schouw, *Dansk Tidsskrift.* Nr. 9—14. Kbhvn. 1848—49. 8.
- H. P. Selmer, *Aarbog for Kjøbenhavns Universitet for 1847.* Kbhvn. 1848. 8.
— , *Supplement til Kjøbenhavns Universitets Aarbøger.* Nr. 1 for 1848. Kbhvn. 1849. 8.
- F. C. Sibbern, *Bidrag til at oplyse nogle ontologiske Udtryk i Aristoteles's Metaphysik.* Kbhvn. 1848. 4. (Pr.)
— , *Om Forholdet imellem Sjæl og Legeme.* Kbhvn. 1849. 8.

- F. C. Sibbern, Psychologie, indledet ved almindelig Biologie. Den nye Udarbeidelses 2den Udg. Kbhvn. 1849. 8.
- Den slesvigiske Krig i 1848. Ved en Officer af Armeen. 1—2. Kbhvn. 1849. 8.
- Speculum Regale. Konge-Speilet. Udgivet efter Foranstaltung af det akademiske Collegium ved det kgl. norske Frederiks - Universitet. Christiania 1848. 8.
- Statistisk Tabelværk. VII—XV. Kbhvn. 1844—47. Fol. og Tverfol.
- Statistisches Tabellen-Werk, herausgegeben von der allerhöchst ernannten Commission. I—V. Kopenhagen 1842—47. Fol. og Tverfol.
- G. Steenberg, Om Synspunktet for Opfattelsen af Philos Gudserkendelse. Kbhvn. 1849. 8.
- H. Stephani Thesaurus Graecae linguae. Vol. VII fasc. 2 et 3 (Nr. 44—45). Parisiis 1849. Fol.
- D. F. Strauss, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. I—II. Tübingen 1835—36. 8.
- C. Corn. Taciti Opera quae supersunt, recensuit atque interpretatus est I. C. Orellius. Vol. I. Turici 1846. 8.
- A. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire. Livr. 36—40. Bruxelles 1847. 8.
- C. A. Thortsen, Efterretn. om Randers Lærde Skole for Skoleaaret 1847—48. Randers 1848. 8. (Pr.)
- Thorvaldsens Museum. Tredie Afdeling. Oldsager. Beskrevne af L. Müller. 1—3. Kbhvn. 1847. 8.
- (P. H. Tregder), Indbydelsesskrift til Höjtideligheden paa Aalborg Kathedralskole den 14. April 1848. Aalborg 1848. 8.
- N. Treschow, Elementer til Historiens Philosophie. Kbhvn. 1811. 8.
- , Moral for Folk og Stat. Kbhvn. 1811. 8.
- , Om den menneskelige Natur. Kbhvn. 1812. 8.

- R. Unger, de C. Valgii Russi Poematis commentatio. Halis 1848. 8.
- M. Valerii Probi in Vergilii Bucolica et Georgica commentarius. Edidit H. Keil. Halis 1848. 8.
- E. C. Werlauff, De hellige tre Kongers Kapel i Roskilde Domkirke. Kbhvn. 1849. 4.
- , Historiske Efterretninger om det store Kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn. 2den Udgave. Kbhvn. 1844. 8.
- W. M. L. de Wetts, Lærebog i den christelige Sædelære. Oversat af C. E. Scharling. Kbhvn. 1835. 8.
- H. K. Whittie, Emendatio collationis codd. II. Hauniensium G. I. Caesaris librr. de b. g. Röane 1848. 8. (Pr.)
- F. W. Wiehe, Om Principet for Accentuationen i Græst. Kbhvn. 1848. 8. (Pr.)
- G. B. Winer, Biblisches Realwörterbuch. 3te Auflage. I—II. Leipzig 1847—48. 8.
- F. Wyse, Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, für Deutsche bearbeitet von E. Amthor. I—III. Leipzig 1846. 8.
- H. C. Ørsted, Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger i 1848. Nr. 1—8 og i 1849 Nr. 1—4. Kbhvn. 8.
-

Den offentlige Examen

i

Slagelse Lærde Skole

for Året 1849

foretages i følgende Orden:

Tirsdagen den 17de Juli.

- 9—1. De 3 øverste Classer: Latinſt Stiil og Oversættelse.
- 9—1. I Cl.: Danſt Stiil.
- 3—6. De 3 øverste Classer: Danſt Stiil.
- 3—6. I Cl.: Latinſt Stiil.

Torsdagen den 19de Juli.

- 9—11½. IV Cl.: Latin.
- 11½—1. II Cl.: Danſt.
- 3—6. III Cl.: Tysk og Fransk.

Fredagen den 20de Juli.

- 9—11½. III Cl.: Græſt.
- 11½—1. I Cl.: Tysk.
- 3—6. IV Cl.: Arithmetik og Geometrie.

Lørdagen den 21de Juli.

- 9—10½. II Cl.: Latin.
- 10½—1. I Cl.: Danſt.
- 3—6. III Cl.: Arithmetik og Geometrie.
- 3—6. II Cl.: Regneprſve.

Mandagen den 23de Juli.

- 9—11. IV Cl.: Græſt.
- 11—12. IV Cl.: Danſt.

- 12—1. IV og III Cl.: Gymnastik.
 3—6. I Cl.: Historie og Geographie.
 3—6. III Cl.: Negneprøve.

Tirsdagen den 24de Juli.

- 9—12. III Cl.: Latin.
 12—1. II Cl.: Græsk.
 3—6. IV Cl.: Dydsk og Fransk.

Onsdagen den 25de Juli.

- 9—11½. I Cl.: Latin.
 9—11. II Cl.: Tegning.
 11½—1. III Cl.: Hebraisk.
 3—6. II Cl.: Religion og bibelsk Historie.
 3—6. I Cl.: Negneprøve.

Torsdagen den 26de Juli.

- 9—10. IV Cl.: Hebraisk.
 10—12. IV Cl.: Religion og bibelsk Historie.
 9—11. I Cl.: Tegning.
 12—1. II og I Cl.: Gymnastik.
 3—6. II Cl.: Arithmetik og Geometrie.

Fredagen den 27de Juli.

- 9—1. III Cl.: Historie og Geographie.
 3—6. I Cl.: Religion og bibelsk Historie.

Lørdagen den 28de Juli.

- 9—11. III Cl.: Dansk.
 11—1. II Cl.: Dydsk og Fransk.
 3—6. IV Cl.: Historie og Geographie.

Mandagen den 30te Juli.

- 9—12. III Cl.: Religion og bibelsk Historie.
 3—5. II Cl.: Historie og Geographie.

Mandagen den 30te Juli Eftermiddag Kl. 5 afholdes Censuren.

Tirsdagen den 31te Juli Formiddag Kl. 11 foretages Translocationen, efter hvilken Sommerferien tager sin Begyndelse.

Fredagen den 31te August Formiddag Kl. 9 bestemmes til Prøve for de Disciple, som ere anmeldte til Optagelse i Skolen.

Løverdagen den 1ste September tager Undervisningen for det nye Skoleaar sin Begyndelse.

Disciplenes Fædre og Foresatte samt andre Skolens og Videnskabernes Belyndere indbydes herved til at bære denne Examens mundtlige Deel med deres Nærværelse.

Slagelse den 1ste Juli 1849.

C. W. Elberling.



