



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

30

H a a n d b o g

ved

botaniske Excursioner

i Egnen om Sorø.

Andet Hæfte.

Indbydelseskraft

til Examen Artium ved Sorø Akademie og Skolens Hovedexamen

den 16^{de} Juli 1835 og følgende Dage.

af

S. H. Bredsdorff,

Lector i Mineralogie og Botanik ved Akademiet.

Kjøbenhavn.

Trykt hos Andreas Seidelin,

Hof- og Universitets-Bogtrykker.

Nyngöbing Cathedralskole.

Rosaceæ. Rosenartede.

Bæg. sædvanlig frit, undertiden voret omkring Frugtknuden, sædvanlig 5klovet. Kronbl. sædvanl. ligedannede; undertiden 0. Støvdr. sædvanl. af ubestemt Tal. Støvknapperne 2rummede, opspringende paa langs. 1 Griffel paa hver Frugtknude, sædvanlig paa Siden af den. Hviden 0. Embryonet lige. Bl. afvejlende. 2 Arelbl.

1 Affnit.

Amygdalææ. Steensfrugttrær.

Bæg. frit, affaldende, 5klovet, bærer 5 Kronbl. og 20—30 frie, omtr. ligestore Støvdr. Frugtknuden sædvanl. enkelt. Griff. traadsformig, næsten paa Enden af Frugtknuden. Frøegjemmet en Steensfrugt; Stenen 1—2kjetnet. Kjernen hængende ved en lang Frøestreg, som begynder ved Stenens Nederende. Frøehuden lidt opsvulmet indvendig. Træer eller Buske. Bl. stillede, udeelte, nedentil hjertelede. Arelbl. frie. (Blst. hvide eller røde).

1 Slægt. **Prunus. Kræge.**

Steenfrugten kjødet, glat, overtrukken med blaaligt Støv. Stenen sammentrykt, mere ell. mindre spids ved begge Ender, ved Randene lidt furet. De unge Bl. indrullede. * Bl. næsten ægformige, østest rundtakkede. (Blst. hvide).

1 *P. spinosa.* Slaaen Kræge.

Bæg. kloffeformigt; Bligene butte, længere end Røret. Frugten kugleformig. Grenene torneede. Bl. elliptiske, næsten omvendt ægformige, takkede. Blstst. eenlige. En stærk-grenet Busk. 3—5 F. h. Apr. S Kratskove. Ved Sorøe. F. D. T. 926.

2 *P. insititia.* Almindelig Kræge.

Frugten næsten kugleformig. Stenen oval, temmelig but ved Enderne. Grenene endes med en Torn. Bl. ægformige, duunhaarede paa Underfladen. Blstst. parrede. Træe. 15—20 F. h. Maj. Ved Gårder. F. D. T.

3 *P. domestica.* Blomme Kræge.

Stenen lancetformig, but ved Enderne. Bl. omvendt ægformige ell. lancetformig-ægformige. Træe. 15—20 F. h. Maj. Ved Gårder og i Skove. F. D. T.

2 Slægt. Kirsebærtræe.

Steenfrugten kjødet, meget glat, uden blaaligt Støv. Stenen næsten kugleformig, jevn. De unge Blade sammenlagte paa langs. * Bl. næsten ægformige, oftest glatte. Træer.

A. Vist i Skjerme. Smaaaffikene 1blomstrede og komme fra Djnene. Bl. ægformig-lancetformige, tilspidsede, ulige takkede. Barken glat.

1 N. C. avium *Mönch.* *Prunus avium Linn.* Fuglebær = Kræge.

Bl. paa Underfladen duunhaarede, (temmelig langstilkede). Skjermene fiddende. 30—40 F. h. Maj. 3 Stove. F. D. T. 1647.

2 N. C. Caproniana *De Cand.* *Prunus Cerasus Linn.* Kirsebær = Kræge.

Bl. overalt glatte (kortstilkede). Skjermene næsten fiddende. Frugterne kugleformige, nedtrykte. 15—20 F. h. Maj. Ved Byer. F. D. T.

B. Vist i Klaser, som udspringe fra Grenene.

3 N. C. Padus *De Cand.* *Prunus Padus Linn.* Hægebær = Kræge.

Frugten rund. Klaserne lange, blade. Bl. æg-lancetformige, lidt tilspidsede, tynde, savtaktede. 15—30 F. h. Maj, Jun. 3 Kræststove. F. D. T. 205.

2 Affnit.

Spiræaceæ. Mjødurtartede.

Væg. frit. Kapsl. flere, i en Kreds, aabnende sig ved den indvendige Søm. Frøene 1—6 i hver Kapsl. Buske ell. Urter.

1 Slægt. Spiræa. Mjødurt.

Væg. vedvarende. Kapsl. kort tilspidsede. Frøene 2—6; Rodspidsen opadvendt. * Griff. Hølleformig, tilbagebøjet. 2 Frøe i hver Kapsl. Urter. Stgl. opret, glat. Bl. mellembrudt fannede. Smaaabl. savtaktede. Arelbl. tilrundede, tandede. Vist i en kvastagtig Top (hvide).

1 N. Sp. Ulmaria. Hvidblomstret Mjødurt.

Kapsl. snoede. Roden ikke knolbet. Endesbladene klappede. Bl. paa Underfladen lidt stted. 2—3 F. N. Jun., Jul. Paa fide Enge mellem Buske. Ved Sorøe. F. D. T. 547.

2 U. Sp. *Filipendula*. Rødblomstret Njødurt.

Kapst. rette. Røden hængende = knoldet. Smaaabl. eensformige, paa begge Sider glatte. (Blomsterknopperne røde. Bl. og Løppen mindre, men Blst. større, end hos den foregaaende). 1½ F. 4. Jul., Aug. Paa Bakker. Ved Borød. F. D. T. 635.

3 Uffnit.

Dryadeæ. Jordbæragtige.

Bæg. 4—Sklovet, før Blomstringen med sammenstødende Rande, sædvanl. udvendig besat med ligesaa mange mindre Flige. Stødr. 5 ell. mange. Flere Frøe ell. Ifræde Bær sidende paa en ophøjet Frugtbund. Urter eller Busse. Bl. sædvanlig sammensatte og Krelbl. vorede til Bladst.

1 Slægt. *Geum*. Nellikeroed.

Bægerets nedre Deel huult; Kraven Sklovet, med 5 mindre Flige udentil. Kronen 5bladet. Stødr. mange. Frøene tørre, med Hale, samlede i et Hoved, opstigende. * Frøene med en knæet Hale, i et kugleformigt Hoved. Haarede Urter. Stgl. opret. Rødbl. finneede; Endebladene de største, rundagtige. Stglbl. Skoblede.

1 U. *G. urbanum*. Feber = Nellikeroed.

Bægerfligene tilbagebøjede. Kronbl. omvendt ægformige, af Bægerets Længde. Stgl. grenet. Røbladene Smaaabl. 5, rundtakkede. Krelbl. næsten kredsrunde. Blst. oprette (gule). 1—2 F. 4. Jun.—Aug. Paa fuggesfulde Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 672.

2 U. *G. rivale*. Eng = Nellikeroed.

Bægerfligene oprette. Kronbl. omvendt hjerteformige, næsten spadeformige, af Bægerets Længde. Stgl. næsten enkelt, 1—4blomstret. Bl. dobbelt savtakkede. Blst. sædvanl. hængende (hvidrøde ell. hvide. Bæg. bruunt). 1—1½ F. 4. Jun., Jul. Paa sive Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 722.

β) *intermedium*. Mindre haaret, med smalle Smaaabl. *G. intermedium*. F. D. T. 1874.

γ) *luxurians*. Bægerets Flige halvfinneede. Kronen mangebladet. *G. rivale hybridum Horn*. F. D. T.

2 Slægt. *Rubus*. Klynger.

Bægerets nedre Deel næsten flad. Bæg. Sklovet uden ydre Flige. Kronbl. 5. Stødr. mange. Mange eenfræde Bær paa en ophøjet Frugtbund. Frøet hængende. * Blst. sædvanl. hvide.

A. Bl. finneede.

1 *U. R. Idæus.* Hindbær = Klynger.

Bægerfligene filtede, lidt oddede. Kronbl. ubeelte, sammenfædende. Smaaabærrerne mange, filtede, flike sig samlede fra Frugtbunden. Laaden. Stgl. trind, ikke enkelt, med tilbagebøjede Barktorne. De gølge Grenes Bl. finne; de frugtbare's trefoblede. Smaaabl. stærkt ægformige, indstaarne, savtakfede, nedenunder filtede. Arelbl. børsteformige. Blstf. næsten halvskjermformige. (Blst. hvide. Bærrerne sædvanl. røde). 3—4 *F. h.* (Stammen varer kun 2 Aar). Jun. 3 Skove. Ved Sorø. *F. D. T.* 788.

B. Buske. Bl. 3= ell. 5foblede. Arelbl. ligebrede, paa Blstff.

2 *U. R. cæsius.* Korbær = Klynger.

Bægerfligene ægformige, langt tilspidsede. Smaaabærrerne faa (5—10) ikke sammenhængende, med blaaligt Overtræk. Stammen krybende, trind, med tynde, lidt tilbagebøjede Pigg. Bl. 3= eller 5foblede. Smaaabl. ægformige, dobbelt savtakfede ell. rundtakfede. Blst. i en saadlomstret Top. 1 *F. h.* Jun., Jul. 3 Krat og ved Gårder. Ved Sorø. *F. D. T.* 1213.

3 *U. R. fruticosus.* Brambær = Klynger.

Bægerfligene tilbagebøjede, næsten uden Pigg. Stammen opret, sædvanlig skantet, tildeels filtet. Piggene tilbagebøjede. Bl. 3= ell. 5foblede. Smaaabl. filtede, ægformig = aflange, spidse, glatte, paa Underfladen lidt filtede. Toppen sammensat, smal, rank. 2—3 *F. h.* Jun., Jul. Ved Gårder. Ved Sorø. *F. D. T.* 1163.

1 Afart: *R. fruticosus corylifolius.* Stgl. trind. Sidebl. fiddende. *F. D. T.*

2 Afart: *R. fruticosus Sprengelii.* *R. Sprengelii Weihe.* Rødblomstret Klynger, Duunhaaret. Bl. 3foblede, de øverste enkelte. *F. D. T.* 1697.

C. Urter. Bl. 3= ell. 5foblede. Arelbl. ægformige.

4 *U. R. saxatilis.* Fruebær = Klynger.

Bægerfligene æg = lancetformige, sædvanl. filtede, nedbøjede, af Kronens Længde. Smaaabærrerne faa, kugleformige, store (røde). Stgl. stumpantet, barktornet. Bl. 3foblede, eensfarvede, temmelig glatte; Smaaabl. ægformig = rhombiske, rundtakfede = savtakfede; Sidebl. fiddende. Arelbl. temmelig brede. Blst. kortstilkede, næsten i en Halvskjerm ell. eenlige. 1—1½ *F. 4.* Jul. 3 Skove. 3 Gyrstinge Skov. *F. D. T.* 134.

D. Bl. enkelte.

5 *U. R. Chamæmorus.* Muldebær = Klynger.

Blst. eenboe eller tveboe. Bægerfligene lancetformige, næsten hele, længere end Kronen. Kronbl. omvendt ægformige, sædvanlig nedbøjede. Smaaabærrerne næsten kugleformige, store. Rod. krybende. Stgl. enkelt, 1blomstret, lidt duunhaaret, uden Barktorne. Bl. næsten nyreformige, smaatandede; Lapperne afrundede. Arelbl. ægformige, butte. ½—1 *F. 4.* Jun. Paa Lørbegrund. *F. D. T.* 1.

3 Slægt. *Fragaria*. Jordbær.

Bægerets nedre Deel hult; Kraven 5kløvet, med 5 mindre Flige identil. Kronbl. 5. Støvdr. mange. Mange Frøe siddende paa en Kjødet, saftig, affaldende Frugtbund. Bl. savtakketandede. * Urter med krybende Ranker. Stgl. opret. Bl. 3koblede. Smaaabl. næsten ægformige, folskede, paa Underfladen haarede. Arelbl. lancetformige, heelrandede, vorede til Blidst. Blst. næsten i en Halvstjerm, (hvide).

1 U. *F. vesca*. Almindelig Jordbær.

Bægerfligene efter Blomstringen tilbagebøjede. Blistilkens Haar tiltrykte. $\frac{1}{2}$ F. 2. Maj, Jun. Mellem Buske og ved Gjerder. Ved Sorøe. F. D. T.

2 U. *F. collina*. Bakke = Jordbær.

Bægerfligene efter Blomstringen oprette, Blistilkens Haar opstaaende. $\frac{1}{2}$ F. 2. Jun., Jul. Paa Bakker mellem Krat. F. D. T. 1389.

4 Slægt. *Potentilla*. Potentil.

Bægerets nedre Deel hult; Kraven 4—5kløvet, med 4—5 mindre Flige identil. Kronbl. 4—5. Støvdr. 16 ell. flere. Frøene 5 ell. flere, med Griff. paa Siden, paa en vedvarende, tør Frugtbund. Urter ell. Buske med sammensatte Bl. Arelbl. vorede til Blidst.

A. Bægerfligene sædvanlig lancetformige. Kronbl. butte ell. omvendt hjerteformige, gule, sædvanlig 5. Frøene mange. Frugtbunden fast (ikke svampagtig).

1 U. *P. norvegica*. Norsk Potentil.

Bægerfligene spidse. Kronbl. omvendt hjerteformige, kortere end Bæg. Frøene ægformige, rynkede paa langs. Stivhaaret. Stgl. opret, oventil tvædeelt. Bl. 3koblede; Smaaabl. lancetformige ell. omvendt ægformige, savtaktede. Arelbl. lancetformige. Blst. i en Halvstjerm ell. i Bladhjørnerne (hvidgule). $\frac{1}{2}$ F. 3. Jun.—Aug. S. Sumpe. F. D. T. 171.

2 U. *P. reptans*. Krybende Potentil.

Bægerfligene ægformige, brede, kortere end Kronen. Kronbl. omvendt hjerteformige. Frugtbunden haaret. Stgl. krybende. Bl. sædvanl. 5koblede, stilkede. Smaaabl. omvendt ægformige, dybt tandede, de paa Siderne sammenvorne. Arelbl. ligebrede, smaae ell. 0. Blstbl. 2—3lappede, ægformige. Blstst. i Bladhjørnerne, længere end Bl. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 2. Jul.—Aug. Paa hvilende Marker, ved Veje og Grøfter. Ved Sorøe. F. D. T. 1164.

3 *U. P. verna.* Vaar = Potentil.

Bøgerfligene lidt butte. Kronbl. omvendt ægformige, længere end Bæg. Stkohaaret. Stgl. nedliggende. De nederste Bl. 5koblede; Smaaabl. ægformig = kileformige, tandede; den sidste Tand den mindste. De nederste Arelbl. ligebrede, spidse, sædvanl. heelrandede. Blst. næsten i en Top. $\frac{1}{2}$ F. 4. Apr., Maj. Paa høje tørre Steder. F. D. T.

4 *U. P. opaca.* Mørkbladet Potentil.

Bøgerfligene næsten aflange. Kronbl. omvendt ægformige, længere end Bæg. Frøene jevne. Stærk haaret. Stgl. nedliggende, traadformige. De nederste Bl. 5—7koblede. Bl. omvendt ægformige, næsten aflange, dybt tandede; den sidste Tand mindst. Arelbl. lancetformige, sjelden heelrandede. Blst. næsten i en Halvsfjerm. Blstik. traadformige. $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj. Paa tørre Bakker. F. D. T. 1648.

5 *U. P. argentea.* Sølv Potentil.

Bøgerfligene kortere end Kronen. Frøene ægformige, fiint rynkede. Stgl. opstigende eller opret, filtet. Bl. 5koblede; Fligene omvendt ægformige, næsten kileformige, nedenunder filtede, ovenpaa sædvanl. glatte, indskaarne. Arelbl. ægformige, tilspidse, tildeels heelrandede. Blst. i en Halvsfjerm. $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul., Aug. Paa tørre Ager og ved Gårder. Ved Sorø. F. D. T. 865.

6 *U. P. hirta.* Haaret Potentil Br.

Bøgerfligene aarede, store. Kronbl. omvendt hjerteformige, lige lange med Bæg. ell. længere. Frøene stærkt rynkede, lidt vandede. Haaret. Stgl. opret ell. opstigende. Bl. 5= ell. 7koblede; Smaaabl. omvendt ægformige, tandede ell. halvfinnede. Arelbl. lancetformige, tandede. Blst. i en Top. 1—2 F. 4. Jul., Aug. F. D. T.

Art: *P. recta* Linn. Stgl. tyk, grenet, mangeblomstret. Smaaabl. store, brede, lidt spidst tandede. Arelbl. brede, læderagtige. F. D. T. 1820.

7 *U. P. multifida.* Fiinbladet Potentil.

Bøgerets ydre Flige aflange. Kronbl. ægformige, længere end Bæg. Frugtbunden haaret. Frøene fiint rynkede. Stgl. flere fra een Rod, udbredte, duunhaarede. Bl. dobbelt halvfinnede; Fligene aflang = ligebrede, tilbagerullede, ovenpaa glatte, nedenunder hvidgraa = filtede. Arelbl. lancetformige, heelrandede; de nederste brune, læderagtige. Blst. i en Halvsfjerm. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Maj. Paa Bakker. F. D. T.

8 *U. P. anserina.* Gaafe = Potentil.

Bøgerfligene heelrandede; de ydre Flige ofte 3—5lappede. Kronbl. omvendt ægformige, længere end Bæg. Frugtbunden haaret. Stgl. traadformig, krybende. Bl. mellembredt finne; Smaaabl. aflange, skarpt savtakke, ovenpaa glatte, nedenunder filtehaarede. Arelbl. mangeløvede. Blstik. eensblomstrede, af Bladenes Længde. 1—3 Lomm. 4. Jun.—Aug. Paa tørre Steder, ved Veje ic. Ved Sorø. F. D. T. 544.

B. Kronbl. omvendt hjerteformige, gule, sædvanl. 4. Frøene 5—8. Frugtbunden fast. *Tormentilla Linn.*

9 U. P. *Tormentilla Nestler. Tormentilla erecta Linn.* Opret Tormentil.

Bægerfligene af Kronens Længde. Frøene rynkede. Frugtbunden laaden. Roden tyk. Haaret. Stgl. sædvanl. opstigende. Bl. 3- ell. 5koblede. Smaaabl. omvendt ægformige, næsten kileformige, sædvanl. Stgl. sædvanl. stidende. Blstik. lange, 1blomstrede, i Bladhjørnerne. Blstbl. haandformige indskaarne. 2—3 Lørnm. 4. Jun., Jul. Paa Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 589.

Uart: r.emorals. *Tormentilla reptans Linn.* Krybende Tormentil. Stgl. nedliggende. Bl. stikede. Paa tørre Steder. F. D. T. 1217 og 1819.

C. Kronbl. tilspittede, røde. Frugtbunden svampagtig. Bl. finneede. *Comarum Linn.*

10 U. P. *Comarum Scopoli. Comarum palustre Linn.* Kjer = Kragefod.

Kronbl. kortere end Bæg. Frøene ægformige, sammentrykte, jevne. Bl. finneede. Smaaabl. sammen. Krelbl. brede, læderagtige. $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul., Aug. 3 Lørvoser. Ved Sorøe. F. D. 636.

Uam. Skjøndt Foreningen af Slægterne *Tormentilla* og *Comarum* med *Potentilla* nok kan forsvares, synes den dog ikke nødvendig.

D. Kronbl. butte ell. omvendt hjerteformige, hvide ell. røde. Frugtbunden fast.

11 U. P. *Fragaria Nestler. Fragaria sterilis Linn.* Jordbæragtig *Potentil.*

Bægerfligene lancetformige, de ydre aflange. Kronbl. omvendt hjerteformige (hvide), ikke kortere end Bæg. Frugtbunden lidt laaden. Frøene ikke rynkede. Duunhaaret; med Ranker. Stgl. nedliggende, 2blomstret. Bl. 3koblede; Smaaabl. ægformig = rundagtige, det mellemste indtrykt. Krelbl. brede, hindeagtige, lidt butte. 2—3 Lomm. 4. Apr., Maj. 3 Kratter. F. D. T. 1579.

5 Slægt. *Agrimonia.* Ugermaane.

Bæg. omgivet med Børster; Svælget sammenknebet. Kronen 5kløvet. Kronbl. 5. Stødr. 15. 2 Frøe, med Griffelen paa Enden, indsluttede i Bægerets forhævede Rør. Urter. Bl. finneede. Blst. i ærformige Klaser. Blstbl. 3kløvede.

1 U. A. *Eupatoria.* Almindelig Ugermaane.

Bægerets Rør næsten klokkeformigt, børstet, haaret. Kronbl. dobbelt saa lange som Bæg. (gule). Stivhaaret. Bl. mellebrudtfinneede. Smaaabl. aflang-ægformige, rundtakkethandede. $\frac{1}{2}$ —2 F. 4. Jul. Ved Veje og Gårder. Ved Sorøe. F. D. T. 588.

4 Uffnit.

Sanguisorbeæ. Dvæsurtagtige.

Bæg. 3—5kløvet; Bligene før Blomstringen sammenstøbende med Rauben; Kæret ovenfor sammenknebet. Kronen 0 ell. 4kløvet. 1—2 Frøe. Griff. næsten paa Siden. Urter ell. Halvbuske. Blst. smaae.

1 Slægt. Alchemilla. Løvefod.

Bæg. med Kær; Kraven med 4 store, og 4 mindre, undertiden næsten uskjendelige, Blige. Kronen 0. Støvdr. 1—4. Frøene med en traadformig Griff. paa Siden. Urter med noget rundagtige, lappede ell. fingrede, Blb.

A. Bæg. 8kløvet. Støvdr. 2—4. 4. Blb. nyreformige, sædvanl. flappede, savtakkede. Blst. paa Enden af Stgl.

1 U. A. vulgaris. Almindelig Løvefod.

Stgl. og Blstik. næsten glatte. Blst. i Halskjerme (næsten i Duffer). $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj, Jun. 3 Krat. Ved Sorøe. F. D. T. 693.

2 U. A. hybrida Hoffm. A. montana Willd. Laaden Løvefod.

Blb. nedenunder silkhaarede ligesom Stgl. og Blstik. Blst. nøgleformig sammenhobede, sidende. $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun. Paa høje Steder. F. D. T.

B. Bæg. 4—5kløvet, med meget smaae Tænder mell. Bligene. 1—2 Støvdr. ☉.

3 U. A. arvensis Scopoli. Aphanes arvensis Linn. Alchemilla Aphanes Leers. Siden Løvefod.

Blb. duunhaarede, stikkede, 3deelte, indstaarne. Blst. nøgleformig sammenhobede, i Blad-hjørnerne. 2 Somm. ☉. Maj, Jun. Paa hvilende Marker. F. D. T. 973.

2 Slægt. Sanguisorba. Dvæsur.

Bæg. 4kløvet, omgivet med 4 Skjæl ved Grunden. Kronen 0. Støvdr. 4. Griff. venselformig i Enden. 2 Frøe, indsluttede i Bagerets Kær. 4. Blb. ulige fannede. Blst. i tatte Ur.

1 U. S. officinalis. Almindelig Dvæsur.

Støvdr. af Bagerets Længde. Bæg., Blstbl. og Blb. glatte. Smaa-bl. ægformig-hjerteformige. (Blst. mørk purpurfarvede). 2 F. 4. Jul., Aug. Paa Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 97.

3 Slægt. *Poterium*. Bibernelle.

Blst. sædvanl. eenboe. Bæg. Afkøvet, omgivet med 4 Skjæl ved Grunden. Kronen 0. Støvdr. 20—30. Griff. traadformig, i Enden penselformig. 2 Frøe, indsluttede i det hærdede Bægers Rør. Blb. ulige fannede, savtakkede. Blst. i tætte Nr.

1 N. *P. Sanguisorba*. Blodstillende Bibernelle.

De nederste Blst. i Aene Hjulst., de øverste Hjulst. Bægerets Rør efter Blomstringen rynket. Stgl. urtagtig, kantet, glat. Smaaabl. ægformig = rundagtige. Aene næsten kugleformige, 2 F. 4. Jul. Paa Enge. F. D. T. 1939.

5 Uffnit.

Roseæ. Roser.

Bægerets Rør oventil sammenknebet; Kraven hbeelt. Kronblb. 5. Støvdr. mange. Frøene mange, indsluttede i Bægerets Rør, som ved Modenheden bliver bæragtigt (Hyben). Buske, sædvanl. med ulige fannede, savtakkede Blb. Arelblb. vorede til Blststf.

1 Slægt. *Rosa*. Rose.

A. Bægerblb. heelrandede, sjelden næsten halvannede, efter Blomstringen næsten sammenstødende. Griffene frie, sædvanlig indsluttede, sjeldnere fremragende. Barkornene ved Arelblb. sædvanlig parrede. Hybnerne næsten kugleformige.

1 N. *R. cinnamomea*. Maj = Rose.

Bægerstfigene oventil spadeformige, udstaaende. Hybnerne kugleformige ell. rundagtig = ægformige, jævne, opstigende, kronede med de sammenstødende Bægerstfige. Grenene ranke. Smaaabl. nedens under graagrønne, 5—7, ægformig = elliptiske, smaat savtakkede. Arelblb. brede, hule, meget nær ved Smaaabladens nederste Par. Barkornene ved Arelblb. parrede, seglformige. Blststf. korte. (Blst. temmelig mørkerøde). 2 F. (?) h. Jun., Jul. Paa Bakker. F. D. T. 1214.

2 N. *R. pimpinellifolia* Linn. *R. spinosissima* Retz. Tornefuld Rose.

Bægerstfigene udcelte, udbredte. De modne Hybener læderagtige, korte, kronede med de sammenstødende Bægerstfige. Stgl. i Ungdommen tæt besat med Barkorne, som ere ulige store, horizontale og tynde. Barkornene ved Arelblb. ofte større, sjelden 0. Smaaabl. 5—9, ægformig = rundagtige. Arelblb. smalle, i Spidsen bredere. (Blst. sædvanl. hvide). 1—2 F. h. Jul. 3 Sandjord. F. D. T. 398.

B. Vægerfligene halvfinnede, efter Blomstringen nedbøjede, ofte affaldende. Griflerne frie, indsluttede ell. fremragende. Hybenen ægformig ell. sjældnere kugleformig. Krelbld. affaldende med Bld. Barktornene adspredte.

3 *R. canina*. Almindelig Rose.

Bæg. glatte (sjældnere stivhaarede). Hybnerne ægformige (sjældnere næsten kugleformige), højrode, opstigende, læderagtige. Barktornene langt fra hinanden, fve, sammentrykte, æglformige. Smaaabl. spidse, undertiden dobbelt savtakfede, sædvanl. glatte. Krelbld. noget brede, spidse, smaat savtakfede. (Blst. lysrøde). 6—8 F. h. Jul. 3 Krat. Ved Sorøe. F. D. T. 1695.

Ufart: collina. *Rosa collina Jacquin*. Bakke-Rose. Blstf. uldhaarede. Bld. nedenunder fittede. 3 aabne Kratflove. F. D. T.

4 *R. rubiginosa*. Rind-Rose.

Hybenen elliptisk, kort, højrode, haard, stivhaaret. Smaaabl. 5—7, ægformige ell. rundagtige, savtakfede, især nedenunder ruffarvede, hjertede. Blstf. stivhaarede. Barktornene stærke, sammentrykte, tilbagebøjede, sjældnere rette. (Blst. stærkt rosenrøde. Bld. lugte syrlig). 4—5 F. h. Jul., Aug. Med Gjerder. Ved Sorøe, f. Ex. i Hjortenæs. F. D. T. 870.

5 *R. villosa*. Hyben-Rose.

Hybenen ægformig (rundagtig) stivhaaret, næsten pigget, kjødet, næsten nedhængende, mørkerød. Barktornene tynde, nedentil neppesammentrykte, rette. Smaaabl. ægformige, næsten dobbelt savtakfede, med rette Takker, paa begge Sider hjertlet duunhaarede (ikke ruffarvede). (Blst. rosenrøde). 4—6 F. h. Jul. Ved Gjerder. Ved Sorøe, f. Ex. nærved Syster Blums Huus. F. D. T. 1458.

Ufart: pomifera. Med store Hybener og længere Grene. Ved Gjerder. F. D. T.

6 *R. alba*. Hvid Rose. (?)

Hybenen ægformig, glat. Barktornene krumme. Smaaabl. ægformige, ovenpaa glatte, nedenunder og i Randen haarede. Blstf. hjertelhaarede. (Blst. hvide). 4—5 F. h. Jul. Ved Strandbredder. F. D. T. 1215.

6 *R. affinis*.

Pomaceæ. Æbleartede.

Vægerets Kær voxet omkring Frugtkunderne, ved Modenheden kjødet; Kraven slappet. Kronbld. 5, affaldende. Støvdr. mange. Griflerne 2—5. Frugten kjødet. h. Bld. sædvanl. enkelte, sjældnere finnede. Blst. i Klaser, Halvsfjerme eller Sfjerme. * Blstbld. sylformige, affaldende.

1 Slægt. *Cratægus*. Havtorn.

Bæg. krukkeformigt; Kraven 5kløvet. Kronbl. udbredte, kredsformige. 1—5 Grisl. Bærret fjødet. 1—5 Kjerner med beenagtig Skal. Dornede Buske. Bl. kantede, indstaarne ell. tandede. Blst. i Halvsfjerne paa Enderne af Grenene. * Bl. nedentil kileformige, fløftede, glatte. Blst. sædvanl. hvide.

1 N. *C. Oxyacantha* Linn. *C. Oxyacantha* var. *a obtusata* De Cand. *Mespilus Oxyacantha* Gærtner. Havtorn Mispel.

Bl. butte, utydelig tredeelte. Blstf. og Bæg. glatte. Sædvanl. 2 Grisl. (Blst. hvide). 4—10 F. H. Maj, Jun. 3 Krat. Ved Sørøe. F. D. T. 634.

2 N. *C. monogyna* Jacq. *C. Oxyacantha* var. *δ monostyla* De Cand. *Mespilus monogyna* Wallr. Enhunnet Mispel.

Bl. spidse, 3—5kløvede, med udspilede Flige. Blstf. og Bæg. duunhaarede. 1 Grisl. (Blst. hvide). 4—10 F. H. Maj, Jun. 3 Krat. F. D. T. 1162.

Ann. Den forekommer mig bestemt nok affondret fra den Forrige til, mod de Candolles Mening, at holdes for en særskilt Art.

2 Slægt. *Cotoneaster*. Abildbuff.

Med tvækjønne og Hanblst. Bæg. topformigt, but standet. Kronbl. korte, oprette, vedvarende. Grisl. 2—3, glatte, kortere end Stovdr. Frøegjemmerne 2—3, indsluttede i Bæg. og hæftede til dets Vægge, med 2 Kjerner i hvert. Buske. Bl. enkelte, heelrandede, nedenunder uldhaarede. Blst. paa Siderne af Grenene.

1 N. *C. vulgaris* Lindl. *Mespilus Cotoneaster* Linn. Smaaabladet Mispel.

Bl. ægformige, ved Grunden tilrandede. Bl. og Blstf. glatte. (Blst. rødlig hvide). 2—3 F. H. Jun., Jul. Paa Klippegrund. F. D. T. 112.

3 Slægt. *Pyrus*. Abild.

Bæg. krukkeformigt; Kraven 5lappet. Kronbl. rundagtige, (sædvanl. hvide). Grisl. 5, sjældnere 2—3. Frugten et Æble, med ligesaa mange Rum som Grisl. Kjernerne sædvanl. 2 i hvert Rum. Bl. enkelte ell. fannede. Qvasterne ell. Halvsfjermene paa Enden af Grenene.

A. *Pyrophorum*. Grisl. 5, frie. Blst. i Halvsfjerne med enkelte Smaaafstikke. Bl. enkelte, uden Kjertler. (Æblets Risd grynet).

1 *U. P. communis.* Pære = *Ubild.*

Bl. ægformige, savtakkede, paa begge Sider glatte. Et Træ. 30—50 *F.* *h.* Maj. 3 Skove. *F. D. T.*

B. Malus. Grisl. 5, nedentil lidt sammenvorne. *Blst.* i Halvsfjerne med enkelte Smaastilke. *Bl.* enkelte, uden Kjerter. (*Æblets* Kjød fast, trævlet).

2 *U. P. acerba. De Cand. P. Malus Linn.* (tildeels). *Æble = Ubild* (tildeels). Skov = *Ubild.*

Bøgerets Rør glat. *Bl.* ægformige, spidse, rundtakkede, i Ungdommen glatte. (*Blst.* lys-rosenrøde ell. hvide). Et Træ. 30—50 *F.* *h.* Maj. 3 Skove. Ved Sorø. *F. D. T.* 1101.

C. Aria. Grisl. sædvanl. 2—3. *Blst.* i Halvsfjerne med grenede Smaastilke. *Bl.* enkelte, uden Kjerter, nedenunder hvidfildede. (*Æblet* temmel. blødt, rødt).

3 *U. P. Aria Ehrh. Cratæus Aria Linn. Sorbus Aria Crantz.* Ældebær Røn.

Bl. omvendt ægformige, dobbelt savtakkede. 15—30 *F.* *h.* Maj—Jul. 3 Skove. *F. D. T.* 302.

4 *U. P. intermedia Ehrh. Cratæus Aria β Linn. Sorbus intermedia Hornem.*
Selle Røn.

Bl. ægformig = aflange, indfåaaren = lappede, tandede. 15—30 *F.* *h.* Maj—Jul. 3 Skove. *F. D. T.*

D. Torminaria. Bøgerstigen affaldende. Grisl. 2—5, sammenvorne, glatte. *Æblet* næsten uden Saft (rødt). *Blst.* i Halvsfjerne med grenede Smaastilke.

5 *U. P. torminalis Ehrh. Cratæus torminalis Linn.* Larmvrid *Ubild.*

Bl. hjerteformig = ægformige, halvfinnet = lappede, de yngre nedenunder duunhaarede, de ældre glatte; Lapperne savtakkede, tilspidse, de nederste udspilede. 15—30 *F.* *h.* Apr., Maj. Ved Gårder. *F. D. T.* 798.

E. Sorbus. Grisl. 2—5. *Bl.* ulige finneede ell. halvfinneede. *Blst.* i Halvsfjerne ell. Kvaster med grenede Smaastilke. (*Æblet* blødt, saftigt, rødt).

6 *U. P. pinnatifida Smith. Sorbus hybrida Linn.* Blandet Røn.

Bl. halvfinneede, nedenunder graastilte. *Blst.* og *Blstst.* graastilte. 15—30 *F.* *h.* Maj, Jun. 3 Bjergegne. *F. D. T.* 301.

7 *U. P. Aucuparia Gaertner. Sorbus Aucuparia Linn.* Almindelig Røn.

Bl. finnede, glatte, savtakkede. Dnene firkantede. Bløderne næsten fugleformige, 15—20 F. h. Maj, Jun. 3 Skove og ved Byer. Ved Sorø. F. D. T. 1034.

5 Orden.

Onagrariæ. Natlysbartede.

Bæg. ganske eller tildeels voret om Frugtknuden, forlænget ud over Samme, 2—5 (Sædvantl. 4 $\frac{1}{2}$) lappet. Lapperne før Blomstringen sammenstødende med Randene. Kronbl. saa mange som Fligene, sjeldnere 0. Støvdr. $\frac{1}{2}$, 1 ell. 2 Gange saa mange som Bægerfligene. Griff. 1, traadformig. Frøegjemmet en Kapsel, Bær ell. Steenfrugt, 2 $\frac{1}{2}$ ell. Arummet. Frøene befæstede ved Midten. Hviden 0. Embryonet lige. Urter ell. Buske. Bl. afværlende ell. modsatte, udeelte. Blst. i Bladhjørnerne ell. i Klaser ell. Nr paa Enden af Stgl.

1 Affnit.

Onagrea. Natlysbligende.

Bægerets Nr forlænget ud over Frugtknuden. Støvdr. dobbelt saa mange som Kronbl. En Kapsel med fleerfræede Num. Frøene ikke vingede. Urter.

1 Slægt. **Epilobium. Dueurt.**

Bæg. 4fløvet; Fligene efter Blomstringen affaldende. Kronbl. 4. Støvdr. 8. Kaps. prismatisk, but firkantet, Arummet, 4lappet. Frøene snokkede, hæftede til en Støtte. Blst. eenlige i Bladhjørnerne ell. i Klaser paa Enden.

A. Kronen uligebannet. Kronbl. ægformige. Støvdr. nedbøjede.

1 *U. E. spicatum Lamarck. E. angustifolium Linn.* Smalbladet Dueurt.

Bl. fræede, ligebred = lancetformige, heelrandede, bølgede. Blstbl. sidde ikke paa Blststik. (Blst. store, farnesirøde). 4—6 F. 4. Jul. Ved Gårder og i aabne Skove. Ved Sorø og Pedersborg. F. D. T. 289.

B. Kronen ligebannet. Kronbl. omvendt hjerteformige. Støvdr. oprette. De nederste Bl. modsatte, de øverste afværlende.

2 *U.* *E. montanum.* Glatbladet Dueurt.

Kronbl. længere end Bøgerfligene. Arret 4deelt. Stgl. bladet, trind, næsten glat. Bl. lancetformige ell. ægformige, uregelmæssig tandede, næsten fiddende. Blstf. korte. (Blst. blegrode). $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. 3 Skove. Ved Soroc. F. D. T. 922.

3 *U.* *E. nudum Schumacher.* *E. roseum Schreber.* Rosenbladet Dueurt.

Arret udeelt, hjelleformigt. Stgl. bladet, tvægget. Bl. bred = lancetformige, tandet = savtakkede, stilkede. (Blst. røde). 2 F. 4. Jun.—Aug. 3 Græster. Ved Philosophgangen, i Nærheden af Siffer Jappes Gaard. F. D. T. 1815.

Anm. Denne Art er formodentlig glemt af De Candolle.

4 *U.* *E. hirsutum.* Laaden Dueurt.

Bøgerbl. obdele. Arret 4deelt, udbredt, med tilbagebøjede Flige. Roden krybende. Stgl. meget grenet, stivhaaret. Bl. lancetformig = aflange, uregelmæssig savtakkede, omfattende, stivhaarede, især paa Aarerne. (Blst. store, rosenrøde, sjeldnere hvide). 3—4 F. 4. Jul. Ved Damme og Græster. Ved Soroc. F. D. T. 326.

5 *U.* *E. palustre.* Kjær Dueurt.

Arret udeelt. Kapsl. duunhaarede. Stgl. trind, grenet, næsten stivhaaret. Bl. fiddende, lancetformige, næsten savtakkede, glatte. (Blst. blegrode). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul. 3 Sørvemoser. F. D. T. 1574.

6 *U.* *E. parviflorum Smith.* *E. hirsutum* β *Linn.* *E. pubescens Roth.*

Smaablomstret Dueurt.

Arret 4deelt, udbredt. Roden trævlet. Stgl. enkelt, laaden. Blst. fiddende, lancetformig = aflange, duunhaarede, savtakkede. (Blst. rosenrøde). 1—2 F. 4. Jul., Aug. Paa side Steder. Ved Soroc. F. D. T. 347.

7 *U.* *E. tetragonum.* Firkantet Dueurt.

Arret udeelt. Stgl. firkantet, næsten glat. Bl. lancetformig = aflange, smaatandede. (Blst. røde). 1— $1\frac{1}{2}$ F. 4. Ved Græster. F. D. T. 1029.

Art: obscurum. Bl. nedløbende.

2 Slægt. *Oenothera.* Natlys.

Bæg. 4kløvet, med langt Hør. Kraven og en Deel af Høvet affaldende est. Blomstringen. Kronbl. 4. Støvdr. 8. Støvet bestaaer af 3kantede, klæbrige Korn. Arret 4kløvet ell. fugleformigt. Kapsl. Arummet, Afklappet, mangefrøet. Frøene hæftede til Støtten, uden Fnoek.

1 *U. O. biennis*. Toaarig Natlys.

Kronbl. ombendt hjerteformige (gule). Befrugtningsdelene oprette, ligelange, kortere end Kronen. Urret 4kløvet; Fligene ligebrede, noget tykke. Kapsl. aflange, lidt ophovne. Stgl. blodpigget, laaden. Bl. ægformig-lancetformige, flade. 3—4 F. *J.* Jul., Aug. Ved Byer (oprindelig fremmed). *F. D. T.* 446.

2 *Uffnit*.

Jussieæ. Jusfiæagtige.

Bøgerets Rør ikke forlænget ud over Frugtknuden. Frøegjemmet en Kapsl. med flere Frøe i Rummene.

1 Slægt. *Isnardia. Isnardiæ.*

Bøgerets Krave 4deelt, vedvarende. Kronbl. 4 ell. 0. Stødr. 4. Griff. traadformig. Kapsl. 4klappet, Arummet, mangefrøet. Bl. udeelte. Blst. i Bladhjørnerne, siddende.

1 *U. J. palustris*. Rør = *Isnardiæ*.

Kronbl. 0. Stgl. krybende, glat. Bl. modsatte, ægformige, spids. Blst. cenlige. $\frac{1}{2}$ F. *O.* Jul. *J.* Sumpe. *F. D. T.* 1745.

3 *Uffnit*.

Circææ. Steffensurtagtige.

Bøgerets Rør ikke forlænget ud over Frugtknuden. Bæg. 2deelt; Fligene affaldende. Frøegjemmet en Kapsel, rundagtig, med 1 Frøe i hvert Rum. Bl. modsatte, stillede, ægformige ell. hjerteformige. Blst. i Klaser.

1 Slægt. *Circæa. Steffensurt*.

Bæg. 2deelt. Kronbl. 2, ombendt hjerteformige. Urret udbrandet. Kapsl. ægformig, besat med haarede Børster, Drummet, 4klappet, 2frøet. Frøene oprette. Urter. Blst. afværlende, hvide.

1 *U. C. lutetiana*. Dunet Steffensurt.

Stgl. duunhaaret. Bl. ægformige, smaatandede. 1 F. *U.* Jul., Aug. *J.* Skove. Ved Søer, f. Kr. i Philosophgangen. *F. D. T.* 210.

2 *U. C. alpina*. Glat Steffensurt.

Stgl. sædvanl. glat. Bl. hjerteformige, tandede. 2—4 Somm. *U.* Aug. *J.* høje Skove. *F. D. T.* 1321.

Ufart: *intermedia*. Stgl. opret, lidt haaret. *F. D. T.* 256.

Halorageæ. Haloragisartede.

Vægerets Rør voret omkring Frugtknuden. Kraven deelt ell. 0. Kronbl. oversædige ell. 0. Griff. 0, sjældnere 2. Årrene vortede ell. penselformige. Frugten ikke opspringende. Frøene 1 i hvert Rum, hængende. Hviden fjædet. Embryonet lige. Kjæmrene undertiden adskilte. * Bl. modsatte ell. krandsformige. Blst. i Bladhjørnerne ell. i År paa Enden af Stgl. Smaa urtagtige Vandplanter med uanseelige Blst.

1 Affnit.

Cercodianæ. Tusendbladartede.

Vægerets Krave deelt. Støvdr. 1—2 Gange saa mange som Vægerfligene. Kronbl. og Frøegjemnets Rum sædvanl. ligesaa mange som Vægerfligene.

1 Slægt. **Myriophyllum.** Tusendblad.

Blst. eenbæ, sjældnere tvæksjennede. Hanblst.: Væg. 4deelt. Kronbl. 4, meget let affaldende. Støvdr. 4, 6 ell. 8. Hunblst.: Væg. voret omkring Frugtknuden, Alappet. Kronen 0. 4, lidt sammenvorne Frøegjemmer. Hviden næsten 0. Svømmende Uter. Blst. eenbæ; de øverste Hanblst., de nederste Hunblst. Støvdr. 8. Støvknapperne aflange. Bl. i Krands, halvfinnede, med haarformige Flige. Blst. i År paa Enden af Stgl.

1 *M. spicatum.* Årblomstret Tusendblad.

Bl. ved Blst. kortere end Blst., de nederste lidt savtakkede, de øverste heelrandede. (Kronbl. tværsede). 3—6 Lomm. over Vandfladen. 4. Jul. 3 Søer og Damme. Ved Sorø. F. D. T. 681.

2 *M. verticillatum.* Krandsblomstret Tusendblad.

Bl. ved Blst. alle halvfinnede, meget længere end Blst. (Kronbl. hvidagtige). 3—6 Lomm. over Vandfladen. 4. Jul. 3 Søer og Damme. Ved Sorø. F. D. T. 1046.

2 Affnit.

Callitrichinæ. Vandstjerneartede.

Vægerets Krave ukjendelig. Kronen 0. Støvdr. sidde ikke paa Frugtknuden, og betragtes maa skee rettest som hørende til en særskilt, aldeles nøgen Hanblst. Frugten Arummet, Åfreet.

1 Slægt. *Callitriche*. Vandstjerne.

Blst. tvækjønnede (?), eenboe ell. tveboe. 2 hindeagtige Blstbl. ved Grunden af Blst.
Sanblst.: Støvdr. 1, sjelden 2. Stiften traadformig, lang. Støvknappen nyreformig, 4rummet,
 opspringende ved en tværtliggende Søm. **Sunblst.:** Griff. 2. Kapsl. sammentrykt, 2furet, 4rummet.
 Blatte eenaarige Vandplanter. Bl. heelrandede, modsatte. Blst. eenlige, i Bladhjørnerne.
 * Frugterne siddende.

1 *U. C. verna*. Vaar = Vandstjerne.

Bl. trenervede, de øverste tæt samlede. Kapslernes Rande butte. 4 F. ☉. Apr.—Jun.
 3 Grøfter og Bække. F. D. T. 129. En Afart T. 1741.

Uim. Den er meget ustadig i Bladenes Form.

2 *U. C. autumnalis*. Høst = Vandstjerne.

Bl. eennervede, alle lige adskilte. Kapslernes Rande hindeagtig vingede. 4 F. ☉. Jul.—
 Sept. 3 Grøfter og Bække. F. D. T.

3 *Uffnit*.

Hippuridææ. Hesterumpeartede.

Vægerets Krave udeelt. Kronen 0. Støvdr. 1. Frægjemmet ikke opspringende,
 4rummet. Bl. og Blst. i Krands.

1 Slægt. *Hippuris*. Hesterumpe.

Vægerets Krave meget kert. Støvdr. hæftet til Vægerets Rand. Griff. traadformig.
 Nødden 1furet, kronet med Vægerets Krave. Hviden 0. Undertiden nogle Blst. Sunblst. eller
 fjønløse. Stgl. enkelt. Bl. ligebrede, spidse. Blst. i Bladhjørnerne, siddende.

1 *U. H. vulgaris*. Almindelig Hesterumpe.

Bl. 6—12 i hver Kred. 1—2 F. 4. Jun., Jul. 3 Aar og Bække. Ved Søse.
 F. D. T. 87.

7 Orden.

Ceratophylleææ. Hornbladartede.

Blst. eenboe. Væg. frit, mangedeelt, med ligestore Blige. Kronen 0. **Sanblst.:**
 Støvdr. 12—20 i Midten af Væg. Stifterne 0. **Sunblst.:** Griff. traadformig, skjæb.

Urret enkelt. Nødden Irummet, Ifrøet. Frøet hængende. Sviden 0. Embryonet lige. Sjernestykkerne 4, i Kredss, hverandet bredere. Urtagtige Vandplanter. Bl. i Krandsse, lidt stive, deelte i traadformige, undertiden savtakkede, spidse Flige.

1 Slægt. **Ceratophyllum.** Hornblad.

1 N. **C. demersum.** Tornfrøet Hornblad.

Nødden med 3 ulige store Tørne. 1—3 F. 2. Jul., Aug. 3 stillestaaende Bunde. F. D. T.

2 N. **C. submersum.** Tornløs Hornblad.

Nødden uden Tørne, med 3 smaae butte Borter. 1—3 F. 2. Jul., Aug. 3 stillestaaende Bunde. F. D. T. 510.

8 Orden.

Lythariæ. Kattehaleartede.

Bæg. frit, eenbladet, sædvanl. næsten klokkeformigt, 3—12 lappet, ofte med lige saa mange Tænder i Klefterne. Kronbl. i Bøgerets Rør, mell. Lapperne, undertiden 0. Støvdr. i Bøgerets Rør. 1 Griff. Kaps. hindeagtig, i Begyndelsen sædvanl. 2—4rummet, siden ofte eenrummet. Frøestolen i Midten. Sviden 0. Embryonet lige. * Urter. Bl. modsatte, enkelte, heelrandede. Kresbl. 0.

1 Slægt. **Peplis.** Vandkryber.

Bæg. klokkeformigt, med 6 brede og 6 smalle Flige. Kronbl. 6, let affaldende, undertiden 0. Støvdr. 6, indenfor Bøgerets bredere Flige. Urret næsten siddende, hovedformigt. Kaps. Drummet, mangefrøet. Blst. i Bladhjørnerne, siddende.

1 N. **P. Portula.** Viden Vandkryber.

Bl. modsatte, omvendt ægformige, næsten rundagtige, nedløbende i en Blst. Blst. eenlige. 2—4 Komm. 0. Jul., Aug. Ved Bredder af Moser og Kjær. F. D. T. 64.

2 Slægt. **Lythrum.** Kattehale.

Bæg. cylindrisk, med 8—12 Tænder, hvoraf de halve ere bredere, oprette, de halve smallere, udadbøjede. Kronbl. 4—6. Griffelen traadformig. Urret hovedformigt. Kapselen Drummet, mangefrøet. Frøestolene vorede til Skillevæggen. * Støvdr. dobbelt saa mange som Kronbl. Blst. danne et Ur ell. en Klase paa Enden af Stgl.

1 U. L. Salicaria. Pilsbladet Kattehale.

Bld. lancetformige, nedentil hjerteformige. Blst. næsten siddende, i Krands, som danne et Kr. Kronbld. sædvanlig 6 (karmesinrøde). 2—3 F. 4. Jul., Aug. I Moser og ved Grøfter. Ved Sorø. F. D. T. 671.

9 Orden.

Cucurbitaceæ. Agurkartede.

Blst. sædvanl. een- ell. tveboe. Bæg. voret omkring Frugtknuden, Skløvet. Kronen 5bladet ell. 1bladet og Skløvet ell. 5foldet. Støvdr. 5, frie ell. 1 fri og de øvrige parvis sammenvorne. Arrene 3—5, 2lappede. Frøegjemmet en Græskaarfrugt; Frøene hæftede til Sidevæggene. Hviden 0. Embryonet lige. Stgl. svag. Genlige Slyngetraade paa Siden af Stængelen. Blomsterbld. sædvanlig 0.

1 Slægt. Bryonia. Galdebær.

Bld. eenboe ell. tveboe. Kronbld. næsten ikke sammenvorne. Zanblst.: Bæg. 5standet. Støvdr. 2 og 2 sammenvorne, 1 fri. Støvknapperne bugtede. Gunblst.: Griffelen Skløvet. Frugten (bæragtig) ægformig ell. kugleformig, jevn, med saa Frøe. Frøene ægformige, næppe sammentrykte. * Frugten kugleformig, Stgl. klattrende. Bld. hjerteformige, 5lappede, ruc. Blst. i Klaser (gulagtig = hvide).

1 U. B. alba. Eenboe Galdebær.

Blst. eenboe. Bladene Endelig omtrent saa stor som Sidefigene. Frugten sort. 6—12 F. 4. Maj—Sept. Ved Gårder. F. D. T. 813.

2 U. B. dioica. Tveboe Galdebær.

Blst. tveboe. Bladene Endelig længere end Sidefigene. Frugten rød. 6—12 F. 4. Maj—Sept. Ved Gårder. F. D. T. 1830.

10 Orden.

Portulacææ. Portulakartede.

Bæg. frit ell. lidt voret til det Nederste af Frugtknuden, 2 sjældnere 3 ell. 5deelt. Kronen 0, 3—6bladet ell. eenbladet med meget kort Hær. Støvdr. imellem Bægerfligene, frie, ofte hæftede til Kronen, 2—20. 1 eenrummet, tørt Frøegjemme. Frøene i Midten. Hviden

melet, i Midten af Frøet. Embryonet ringsformigt, omgiver Hviden. Bl. afværlende, sjeldnere modsatte, udeelte, kjæbede.

1. Slægt. *Montia*. Montie.

Bæg. 2—3deelt. Kronen 1bladet, 5deelt med 2 større og 3 mindre Flige. Støvdr. hæftede til Kronen, 3, sjeldnere 4 ell. 5. Griffelen kort, 3deelt. Kapselen 1rummet, 3klappet, 3frøet. Blat. Bl. modsatte. Arelbl. 0. Blst. i Bladhjørnerne, stilkede.

1 *U. M. fontana*. Rilde Montie.

(Blst. hvide). 1—2 Komm. ☉. Maj—Jun. Paa vaade Eng og ved Rilder. F. D. T. 131. En Ufart T. 1926.

II Orden.

Paronychiæ. Knavelartede.

Bæg. sædvanlig 5deelt, 5kløvet ell. 5andet. Kronbl. 5 meget smaae ell. 0. Støvdr. frie, sædvanlig 1 indenfor hver Bægerflig, sjeldnere ligesaa mange til, imellem Bægerfligene. 1 eenrummet, tørt Frøegjemme. Frøene i Midten. Hviden melet. Embryonet krumt, ved Siden af Hviden, ell. ringsformigt, omgivende Hviden. Blst. siddende, udeelte. Arelbl. 0 ell. stivhinde.

1 *Uffnit*.

Telephicæ. Skoeremartede.

Bæg. 5deelt. Kronbl. og Støvdr. 5. Grifl. 3, frie ell. nedentil lidt sammenvorne. Bl. afværlende, med Arelbl.

1 Slægt. *Corrigiola*. Skoerem.

Bæg. vedvarende. Kronbl. 5. Griffelen kort. 3 Ar. Frøegjemmet 1frøet, ikke opspringende. Frøet ophængt ved en Traad, som kommer fra Frøegjemmets Grund. Nedliggende Urter. Blst. i Enden af Stgl., i halvstjermagtige Klaser.

1 *U. C. littoralis*. Sand Skoerem.

Bæg. hindeagtigt i Randen. Stgl. har Blade paa den Deel, som bærer Blomster. Bl. ligebred=lanceformige. 1 Komm. ☉. Jul., Aug. Paa sandige Geder. F. D. T. 334.

2 Affnit.

Illecebreæ. Bruffbægerartede.

Bæg. 5deelt. Kronbl. 5 ell. 0. Støvdr. 2—5. Griff. frie ell. lidt sammenvorne. Frøegjemmet ikke opspringende, 1frøet. Frøet ophængt ved en Traad, som kommer fra Frøegjemmets Grund. Urter, sjelden Halvbuske. Bl. tildeels modsatte, med Kresbl.

1 Slægt. *Herniaria*. Bvidurt.

Bæg. 5deelt. Kronbl. 5, traadformige, ell. 0. Støvdr. 5, undertiden 2—3. Griffene 2. * Nedliggende Urter. Bl. næsten ægformige, heelrandede. Blst. nøgleformig sammenhøbede i Bladhjørnerne. Blomsterbl. meget smaae.

1 *H. glabra*. Glat Bvidurt.

Glat. Blomsternøgterne mangelblomstrede. 1 Somm. 4. Jun.—Aug. Paa tørre Marker. Ved Sorø. F. D. T. 529.

2 *H. hirsuta*. Stivhaaret Bvidurt.

Stivhaaret. Blomsternøgterne siddende, faablomstrede. 1 Somm. 4. Jul. Paa Sandgrund. F. D. T.

2 Slægt. *Illecebrum*. Bruffbæger.

Bæg. 5deelt, Fligene næsten hætteformige, med Enden tykkere, endende sig i et Stak. Kronbl. sylformige ell. 0. Støvdr. 2—5, siddende paa Bægerfligene. Griff. meget kort. 2 Ar. Kapselen Slappet, 1frøet. Embryonet næsten lige, ved Siden af Hviden. Bl. modsatte. Blomsterbl. stivhinde.

1 *I. verticillatum*. Krandsblomstret Bruffbæger.

Bl. rundagtige. Blst. i Krands. 1 Somm. 4. Jul. Paa sandige Heber. F. D. T. 335.

3 Affnit.

Scleranthææ. Knavellignende.

Bæg. 4—5kløvet, med krukkeformigt Rør. Kronbl. 0. Støvdr. 1—10 i Bægerets Svælg. Griffene 2 ell. 1 i Spidsen udrandet. En eenfrøet Hindefrugt. Frøet ophængt ved en Traad, som kommer fra Frøegjemmets Grund. Bl. modsatte, ligebrede (næsten sylformige). Blst. i Grendeslingerne.

1 *U. S. perennis.* Fleeraarig Knavel.

Bøgerfligene butte, med en hvidhindet Rand, omkring Frugten luffe. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun.—Aug. Paa sandige Bakker. Ved Pedersborg mellem Barnebakken og Kongevejen. F. D. T. 563.

2 *U. S. annuus.* Aarig Knavel.

Bøgerfligene spibse, uden hindet Rand, omkring Frugten aaben. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 0. Maj, Jun. Paa tørre Marker. Ved Sorøe. F. D. T. 504.

12 Orden.

Crassulaceæ. Safrige.

Bæg. 3—20deelt. Kronbl. ligesaa mange som Bøgerfligene, afværlende med dem (sjældnere Kronen eenbladet). Støvdr. ligesaa mange eller dobbelt saa mange, frie. 1 Skjæl ved Grunden af hver Frugtknude. Kapslerne saa mange som Kronbl., opspringende sædvanlig ind ad. Frøene i 2 Rader ved Kapselens indvendige Søm. Hviden tynd, kjødet. Embryonet lige. Bl. enkelte, udeelte, kjedede. Blst. sædvanlig i Qvaster, hvori de midterste først aabne sig. * Kapslerne ikke sammenvorne. Bl. siddende. Kresbl. 0.

1 Slægt. *Bulliarda.* Bulliarde.

Bæg. 4, sjældnere 5deelt. Støvdr. 4, sjældnere 5. Skjællene ligebrede. Kapslerne mangefroede. Blatte, eenaarige Urter. Bl. modsatte. Blst. i Bladhjørnerne.

1 *U. B. aquatica De Cand.* *Tillæa aquatica Linn.* Vand Tillie.

Stgl. sædvanlig opret, næsten tvedeelt. Bl. ligebred=lancetformige. Blst. siddende ell. kortstilkede. $\frac{1}{2}$ —1 Tomm. 0. Jun.? Ved Vandbredder. F. D. T.

2 Slægt. *Sedum.* Steenurt.

Bæg. sædvanlig 5deelt, Fligene ægformige. Kronbl. sædvanlig udbredte. Støvdr. dobbelt saa mange som Bøgerfligene. Skjællene udeelte. Bl. sædvanlig afværlende, sjældnere modsatte. Blst. i Qvaster.

A. Bl. flade.

1 *U. S. Telephium.* St. Hans Steenurt.

Støvdr. ikke længere end Kronen. Bl. aflange og ovale, nedtil smalle, tandede, undertiden modsatte. Stgl. opret. Qvasten i Enden, halvstjermagtig. (Blst. grønagtige, sjældnere røde). 1— $\frac{1}{2}$ F. 4. Aug., Sept. Paa tørre Steder. Paa Barnebakken ved Pedersborg. F. D. T. En rød Afart T. 686.

B. Bld. næsten trinde. Blst. hvide.

2 U. S. album. Hvid Steenurt.

Kronbld. noget butte. Stgl. opstigende, urtagtig, nedentil halvbuskagtig, rødskydende. Bld. aflange, butte, noget trinde, siddende, glatte, paa de unge Stub udstaaende. Avasen i Enden grenet, lidt halvskjermagtig. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul.—Sept. Paa Steengjærder. F. D. T. 66.

C. Bld. næsten trinde. Blst. gule.

3 U. S. acre. Bitter Steenurt.

Kronbld. lancetformige, spidse. Stgl. nedentil ofte krybende. Bld. ægformige, tilvoretssiddende, pukkede, næsten oprette, afværende, glatte. Avasen 3deelt; Blomsterne langs Grenene, siddende. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun., Jul. Paa Steengjærder og tørre Marker. Ved Munkbjergby, Bromme, Susemp Mølle. F. D. T. 1457.

4 U. S. sexangulare. Sexkantet Steenurt.

Kronbld. lancetformige, spidse. Stgl. nedentil grenede, de blomsterbærende oprette. Bld. noget trinde, tilvoretssiddende, paa Sidefuddene 3 i hver Krands, teglagte, saa de danne 6 Rader. Avasen 3deelt. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. Paa tørre Steder. F. D. T. 1644.

5 U. S. reflexum. Ottkantet Steenurt.

Bagerbld. noget butte. Stgl. nedentil grenede, de blomsterbærende oprette. Bld. trind-sylformige, ved Grunden løse, grønne. Sidefuddene næsten cylindriske, udstaaende. Blst. i Avaser, med 5—7 Kronbld. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 1818.

6 U. S. saxatile Willd. S. annuum Linn. Eetaarig Steenurt.

Kronbld. aflange. Stgl. opret, grenet. Bld. stræde, noget adskilte fra hiaanden, stumpe, ved Grunden løse. Avasen bladet, aaben. Blst. langs Grenene, sædvanlig stilkede, $\frac{1}{4}$ F. 4. Jul. Paa sølaabne Steder. F. D. T. 59.

3 Slægt. Sempervivum. Semperviv.

Væg. 6—20deelt. Kronbld. aflange, spidse. Stovdr. dobbelt saa mange som Bægerfigene. Skjællene i Spidsen tandede ell. fligede.

1 Art. S. tectorum. Almindelig Semperviv.

Kronbld. 5—9, udbredte. Skjællene fileformige, med en Vorte. Bld. randhaarede. Sidefuddenes Bld. udstaaende. 1 F. 4. Jul. Paa Straatage. F. D. T. 601.

Grossulariæ. Ribsbartede.

Bægeret voret omkring Frugtknuden, forlænget ud over den, 4—5klovet. Kronen 4/2 ell. 5bladet, regelmæssig, befæstet paa Bægerets Svælg. Støvdr. 4—6, frie. Griff. 1, 2—4klovet. Frugten bæragtig, eenrummet. 2 Frøestole befæstede paa Sidevæggene. Frøene flere, med Frøehud. Embryonet ved Enden af Hviden. Buske. Bld. afværlende, klostede. Set Blomsterbld. ved Grunden af hver Smaastilk. * Bld. 3—5lappede. Bægerets frie Deel næsten klokkeformig.

1 Slægt. Ribes. Ribb.

A. Stammerne barktorne. Blstff. 1-, 2- ell. Blomstrende.

1 U. R. Uva crisa De Cand. R. Grossularia Horn. Plant. Stikkelsbær = Ribb.

Bæg. klokkeformigt. Bægerbld. tilbagebøjede, glatte. Kronbld. rundagtige. Svælget skjæget. Griff. barktorne. Bld. but 3—5lappede, lidt laadne. Blstff. 1—2blomstrende, sjelden 3blomstrende. 3—4 f. h. Apr., Maj. Ved Gjerder. Ved Soree i Gjæstgiver Soppes Mark. F. D. T. 546.

B. Stammerne uden Barktorne. Blst. i Klaser.

2 U. R. alpinum. Fjeld = Ribb.

Kronbld. meget smaae, undertiden forsvindende. Støvknapperne næsten siddende. Griff. sammentvorne. Bld. 3—5lappede, stumpe, nedenunder glindsende, ovenpaa haarede. Blomsterbld. lancetformige, bugede, sparsomt hjertede, ofte længere end Blst. 2—3 f. h. Maj. Paa Klipper. F. D. T. 968.

3 U. R. rubrum. Almindelig Ribb.

Bæg. fladt. Bægerfligene butte. Kronbld. næsten omvendt hjerteformige. Bld. but, 3—5lappede, nedenunder duunhaarede, ovenpaa glatte. Klaserne hangende. Blstbld. butte, kortere end Blstff. 2—5 f. h. Maj., Jun. I Skove. F. D. T. 967.

4 U. R. nigrum. Solbær = Ribb.

Bæg. klokkeformigt. Bægerbld. tilbagebøjede. Kronbld. aflange. Bld. nedenunder hjertletprykkede, 3—5lappede. Klaserne slappe. Blstbld. sylformige ell. butte, meget kortere end Blstff. 2—5 f. h. Maj., Jun. I Skove. I Søetoven. F. D. T. 556.

Saxifragaceæ. Steenbrækartede.

Bæg. 3—7klovet; Heret frit ell. voret omkring Frugtknuden, Kraven sædvanlig vedblivende. Kronbld. sædvanlig ligesaa mange som Bægerfligene, sjelden 0. Støvdr. ligesaa

mange ell. dobbelt saa mange som Kronbl. Grisl. sædvanlig 2, undertiden sammengroede, vedblivende. Frøegjemmet en Kapsel, med saa mange Klapper som Griflerne. Mange Frøe. Hviden kjedet. Embryonet lidet. * Urter. Støvdr. dobbelt saa mange som Bøgerfligene. Bl. sædvanlig afværlende og kjedebe, flade. Krelbl. 0.

1 Slægt. *Saxifraga*. Steenbræk.

Bæg. 3kløvet, frit ell. voxet omkring Frugtknuden. Kronbl. med korte Negle, udeelte. Støvdr. 10. Frøehinden ikke forlænget.

A. Bæg. voxet om Frugtknuden, vedblivende. Bl. afværlende, kløftede, ikke bruskagtige i Manden. Kjertlet klæbrige. Blst. hvide.

1 U. S. *Tridactylites*. Trekløftet Steenbræk.

Bøgerfligene aflange, butte, ved Modenheden kortere end Røret. Kronbl. ombendt hjertesformige, større end Bøgerfligene. Kapsl. lidt affumpede. Bl. dels 3-klappede, dels udeelte. 1—2 Komm. ☉. Maj, Jun. Paa sandig Jord. F. D. T. 1517.

2 U. S. *granulata*. Kornet Steenbræk.

Bøgerfligene aflang-ligebrede, butte, under Blomstringen meget længere end Røret, derefter omtrent af samme længde. Kronbl. ombendt ægformige, næsten aflange, meget længere end Bøgerfligene. Grisl. meget lange, spadeformige, næsten parallelle. Roden kornet. Stgl. eenlig, opret, stiv. Bl. nyreformige, rundklappede, de øverste 3kløvede. Blst. i en Top. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Maj, Jun. Paa høje Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 514.

B. Bæg. dybt deelt, frit. Frøene aflange, rynket-prykkede. Stgl. bladet, med Sidesud. Bl. afværlende, smalle, nervebe, udeelte.

3 U. S. *Hirculus*. Giltstilket Steenbræk.

Kronbl. ombendt ægformige, nervebe (gule). Frugtknuden ægformig. Nerene næsten sidende, spadeformige, først indbøjede, derpaa udspilede. Blststik. haarede. Bl. lancetformige, ikke randhaarede. $\frac{1}{4}$ F. 4. Aug., Sept. I Moser og paa Enge. F. D. T. 200.

2 Slægt. *Chrysosplenium*. Milturt.

Bagerets Rør voxet omkring Frugtknuden. Kraven 4-klappet, med butte Lapper. Kronen 0. Støvdr. 8—10. 2 Grifler. Kapsl. 2næbbet, 2klappet, 1rummet, mangefrøet. Frøene meget glatte, nær ved Vunden af Kapselen. * Bl. noget tykke, enkelte, stilkede, rundtakkede. Stgl. enkelt. Blst. i en bladet Qvast.

1 U. C. alternifolium. Almindelig Nilturt.

Bld. afvekslende, sædvanlig dobbelt rundtakkede, nyreformige. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 24? Apr., Maj. S
Skovmoser. Ved Soree. F. D. T. 366.

2 U. C. oppositifolium. Smaaabladet Nilturt.

Bld. modsatte, nyreformig-klæformige, heelrandede ell. rundtakkede. $\frac{1}{4}$ F. Maj, Jun. Paa
sugtige, skyggesfulde Steder. F. D. T. 365.

- * Nymphæa. See 1 Underklasse, 1 Afdeling, 3 Orden.
Larbrea. }
Adenarium. } See 1 Underklasse, 2 Afdeling, 6 Orden, 2 Affnit.
-

2 Afdeling.

Epigynæ. Oversædige.

Vægerets Aar voret omkring Frugtknuden. Kraven 0 ell. flcerdeelt. Kronen flcerbladet. Støvdr ligesaa mange som Kronbl. * Fræene med Hvide. Embryonets Rodspids opadvendt. Værelbl. 0. Blst. i Skjerme, Hoveder ell. Qvaster.

1 Orden.

Umbelliferæ. Skjerplanter.

Væg. voret omkring Frugtknuden; Kraven sædvanlig 0, undertiden 5deelt. Kronbl. 5, oversædige. Støvdr. 5, afverlende med Kronbl., frie, før Blomstringen tilbagehjæde. Støvknapperne 2rummede. Grisl. 2, enkelte. Frugten sædvanlig 10ribbet, bestaaende af 2 Fræe. Fræene hængende paa Spidsen af Støtten. Hviden stor, kjødet ell. næsten hornagtig. Embryonet lidet. Kjernestykkerne aflange, blive ved Spiringen til Fræebl. Urter ell. Halvbuske. Bl. sædvanlig afverlende, ofte flestede. Blstf. ofte omstebende. Blst. i Skjerme ell. Hoveder; Skjermene sædvanlig sammensatte.

1 Affnit.

Hydrocotyleæ. Vandnavleartede.

Kronbl. spidse, flade. Frugten sammentrykt. Fræene ophøjede. Hviden indvendig flad. Skjermen enkelt. * Stgl. krybende. Bl. skjoldformige. Støbet saabladet.

1 Slægt. Hydrocotyle. Vandnavle.

Kronbl. heelrandede. Fræene ægformig=rundagtige, skjoldformig=sammentrykte.

1 A. H. vulgaris. Almindelig Vandnavle.

Bl. kredsrunde, dobbelt rundstakke. Blstf. oventil haarede. Skjermene hovedformige, om trent 5blomstede. Blstf. kortere end Blstf. (Blst. hvide). 2—3 Komm. 2. Jun., Jul. Paa fugtige Steder. 3 Ellekrattet ved Skjolden. F. D. T. 90.

2 Affnit.

Saniculeæ. Sanikelartede.

Kronbl. med indbøjet Spids. Frugten næsten trind. Hviden indvendig flad. Ekjermene næsten hovedformige, enkelte ell. uregelmæssig sammensatte.

1 Slægt. *Sanicula*. Sanikel.

Bl. deels tvefjænnede, deels Han- og Hunblst. Bæg. Skløvet, vedvarende. Frugten næsten kugleformig, med hagede Pigge. Stgl. næsten nøgen. Straalerne i den fælles Ekjerm faa; dens Svøb faabladet. De særegne Ekjermes Svøb bestaaer af flere heelrandede Smaabl. * Den fælles Ekjermes Straaler ulige lange.

1 U. *S. europæa*. Skov = Sanikel.

Bægerets Flige smaat tandede. Rodbl. haandformig = lappede; Lapperne Skløvede, tandede. Alle Blst. fiddende (hvide). 1—2 F. 4. Jun., Jul. 3 Skove. Ved Sorø. F. D. T. 283.

2 Slægt. *Eryngium*. Mandstroe.

Bæg. Skløvet. Frugten omvendt ægformig, skjælet ell. vortet. Blst. i Hoveder. Blsttbl. (Aner) imellem Blst. Svøbet mangebladet. * Rodbl. med tydelig Blsttk.; Nerverne divergerende. Bl. læderagtige, piggede. Blsthovederne rundagtige, kortere end Svøtbl.

1 U. *E. campestre*. Bjerg = Mandstroe.

Rodbl. næsten Skløvede; Smaabl. halvfinnede, Fligene ægformige. Stgltbl. srede. Stgl. endes i en Top. Svøtbl. ligebred = lancetformige, næsten heelrandede. Anerne sylformige. (Blst. hvidagtige). 2 F. 4. Jul., Aug. Paa Bakker. F. D. T. 554.

2 U. *E. maritimum*. Strand = Mandstroe.

Bl. hvidagtig = graae; Rodbl. langstilkede, rundagtige, hjerteformige, pigget = tandede; de øverste Stgltbl. omfattende, haandformig lappede. Svøtbl. 5—7, ægformige, pigget = tandede. Anerne 3spidsede. (Blst. lyseblaae). 1—2 F. 4. Aug. Ved Strandbredder. F. D. T. 875.

3 Affnit.

Ammineæ. Ammiartede.

Frugten sammentrykt, sædvanl. med indtrykte Sider. Frøene med 5 traadformige, undertiden næsten vingeformige, ligestore Ribber, lidt ophøjede. Hviden indvendig flad. * Bægerets Krave 0 ell. meget kort. Urter.

1 Slægt. *Cicuta*. Gifftyde.

Bæg. Standet. Kronbld. omvendt hjerteformige med indbøjet Spids. Frugten rundagtig, furet. 2. Blatte. Stgl. trind, pibet. Bld. 3dobbelte sammensatte. Det fælles Svøb 0 eller faabladet; de særegne mangebladede.

1 U. *C. virosa*. Vand = Gifftyde.

Roden hult, med Skillerum paa Løvers; Løvlerne traadformige. Bld. 3dobbelte fannede; Smaabld. savtaktede. (Blst. hvide). 1—2 F. 2. Aug. Ved Vand. F. D. T. 208.

2 Slægt. *Apium*. Sellerie.

Kronbld. rundagtige, udeelte. Frugten rundagtig. Frøene ribbede, opstående, indentil lidt flade. Stgl. furet, grenet. Bld. fannede. Ingen Svøb. Blst. hvide, lidt grønagtige.

1 U. *A. graveolens*. Sellerie = Persille.

Blat. De øverste Bld. trefoblede. Smaabld. fileformige, i Spidsen indskårne, tandede. 1 F. 3. Jun., Jul. Paa Syltunge. F. D. T. 790.

3 Slægt. *Helosciadium*. Kjerstjern.

Bæg. Standet, utydeligt. Kronbld. ægformige, hele. Grisl. korte. Frugten langagtig. Blst. hvide. * Det fælles Svøb 1—3bladet, sjældnere 0, de særegne 5—6bladede. Vandplanter, liggende eller krybende. Bld. fannede.

1 U. *H. nodiflorum Koch*. *Sium nodiflorum Linn*. Stilkløs Mærke.

Stgl. liggende, stribt. Smaabld. aflange, lige savtaktede. Skjermene modsatte Bladene, sidende ell. kortstilkede. Svøbet 0 ell. afladende. 1 F. 2. Jul., Aug. Paa vaade Steder. F. D. T.

2 U. *H. repens Koch*. *Sium repens Linn*. Krybende Mærke.

Stgl. liggende, rødskydende. Smaabld. rundagtige, kantet = tandede. Skjermene langstilkede. Svøbbld. ægformig-lanceformige, vedvarende. 2—3 Lomm. 2. Jul. Paa fugtige Steder. F. D. T. 1514.

3 U. *H. inundatum Koch*. *Sison inundatum Linn*. Krybende Skjermille.

Stgl. krybende. Smaabld. under Vandet haarformig-mangedeelte, ovenfor Vandet fileformige, indskårne-trefløvede. Skjermene modsatte Bld., tvædeelte, uden fælles Svøb. 1—3 Lomm. 0, 3, 2. Jul. 3 Vand. F. D. T. 89.

4 Slægt. *Falcaria*. Seglblad.

Røg. Standet. Kronbl. omvendt ægformige, krumme, dybt udrandede med indbøjet Spids, hvide. Grisl. udspilede. Frugten aflang. Frøene opstående, ribbede, indentil lidt flade. Støtten 2kløvet. 4. Glatte. Bl. fannede; Bl. ligebrede, bruset savtaktede. Det fælles Svøb mangelfladet; det særegnes indre Bl. meget smaae. I een og samme Skjerm tvæksømmede og Hanblst.

1 N. F. Rivini *Host*. *Sium Falcaria Linn.* Langfinnet Marke.

Bl. jevnt savtaktede med sammenstødende Tæller. 1—2 F. 4. Aug. Paa Agre. F. D. T. 1749.

5 Slægt. *Ægopodium*. Busmekker.

Kronbl. omvendt ægformige, udrandede, med indbøjet Spids, hvide. Grislernes Fod kugleformig; Grisl. lange, nedstående. Støtten kløvet i Spidsen. Frøene næsten trinde, stribede, indentil lidt flade. Grenet. Bl. dobbelt ell. 3dobbelt trefoblede, de øverste trefoblede; Smaaabl. ægformig-aflange, tilspidsede, savtaktede. Svøb 0.

1 N. Æ. *Podagraria*. Almindelig Busmekker.

1—1½ F. 4. Jun., Jul. I haver og Skove. Ved Sorø. F. D. T. 670.

6 Slægt. *Carum*. Kummen.

Kronbl. ligebannede, omvendt ægformige, udrandede med indbøjet Spids, hvide. Grislernes Fod nedtrykt; Grisl. nedstående. Frugten langagtig. Frøene næsten trinde, indentil lidt flade, stribede. Glatte Urter. Bl. fannede med mangedeelte Smaaabl. * Det fælles Svøb 0 eller 1—3bladet; det særegne 0.

1 N. C. *Carvi*. Almindelig Kummen.

Roden kugleformig. Bl. dobbelt fannede, Smaaabl. mangelflevede med korte, lige brede Flige. Bladskederne bugede. 2 F. 4. Jun., Jul. Paa tørre Enger og hvilende Marker. I Sorø paa Gaardspladser; i Gjøstgiver Soppes Mark. F. D. T. 1091.

7 Slægt. *Pimpinella*. Pimpinelle.

Kronbl. omvendt ægformige, udrandede, med indbøjet Spids. Frugten ægformig, kronet med Grislerne. Årene næsten kugleformige. Frøene ægformig-aflange, stribede, indentil lidt flade. Svøb 0. * 4. Kronbl. fannede, med tandede Smaaabl. Stængelbl. finere deelte. Skjermene for Blomstringen nedhængende. Blst. hvide.

1 U. *P. magna*. Stor Pimpinelle.

RobbladeneS Smaabld. ægformige ell. aflange, tandede ell. indskaarne; Endebl. flappet.
2—3 F. 4. Jul. I Krat. F. D. T. 1155.

2 U. *P. Saxifraga*. Almindelig Pimpinelle.

RobbladeneS Smaabld. rundagtige. 1—2 F. 4. Aug. Paa tørre, lidt sandige Steder.
Paa Bakken ved Lille Ladegaard. Ved Sævejen. F. D. T. 669.

Arter: β) *nigra*. Duunhaaret. De nederste Smaabld. ægformige, savtakkede, næsten lappede.
γ) *hircina*. Lidt duunhaaret. Næsten alle Smaabld. halvfinneede ell. fligede.

8 Slægt. *Sium*. Vandmærke.

Røg. Standet ell. utydeligt. Kronbl. omvendt ægformige, ubrandede med indbøjet
Spids, hvide. Arene hovedformige. Frugten kronet med Grisl. Frøene næsten trinde. Støtten
2deelt; dens Grene vorede til Frøene. 4. Bld. fannede; Smaabld. næsten ægformige. Skjermene
sædvanlig paa Enden af Stgl. Det fælles Svøb sædvanlig mangebladet; det særegne mangebladet.

A. Frøene ophøjede, indentil lidt flade.

1 U. *S. latifolium*. Bredbladed Mærke.

Bøgetænderne forlængede. Roden krybende. Stgl. furet = kantet. Smaabld. lancetformige,
tilspidsede, ved Grunden ulige, sædvanl. savtakkede. 2—3 F. 4. Jul. I Damme og Aær. I
Flommen. F. D. T. 246.

B. Frøene ganske trinde.

2 U. *S. angustifolium*. Smalbladed Mærke.

Roden trævlet, med Sideklub. Stgl. neppe sribet. Smaabld. ulige og stort savtakkede. Skjer-
mene deels modsatte Bld., deels paa Enden af Stgl. Svøbbl. næsten halvfinneede. 1—2 F. 4. Jul.,
Aug. I Damme og Aær. F. D. T. 247.

9 Slægt. *Bupleurum*. Hareøre.

Kronbl. rundagtige, hele, indrullede. Frugten kronet med Griffelens nedtrykte Fod.
Frøet ophøjet, indentil lidt fladt. Blatte. Blst. gule. * O. De særegne Svøb 5bladede,
længere end Blst. Bld. enkelte, udeelte.

1 *U. B. tenuissimum.* Smalbladet Hareøre.

Frugten 5ribbet, med Borter mellem Ribberne. Stgl. grenet. Bld. ligebrede, langspidsede. Endeskjermene 3—5straalede, Sideskjermene ufuldstændige. Det særegne Svøbs Bld. ligebred=lancetformige. 1—6 Lomm. ☉. Jul., Aug. Ved Strandkanter. F. D. T. 1090.

2 *U. B. rotundifolium.* Rundbladet Hareøre.

Frugtens Ribber meget fine; Mellemrummene glatte. Stglbld. bred=ægformige, gjennemborede af Stgl. De fælles Skjermene 5straalede, uden Svøb. Det særegne Svøbs Smaaabd. obdeede. 1 F. ☉. Jun., Jul. Paa Agre. F. D. T.

4 *U. f. f. nit.*

Seselineæ. Sefeliartede.

Frugten næsten triind, ribbet. Frøene indentil flade. Hviden indentil flad. * Kronbld. med indbøjet Spids, sædvanl. hvide. Frøene ribbede. Urter. Bld. sammensatte; Rødbld. dobbelt ell. 3dobbelt sammensatte. De særegne Svøb fleerbladede.

1 Slægt. *Oenanthe.* Klaseffjerm.

Væg. Standet, vedvarende. Kronbld. omvendt ægformige, udrandede, hvide ell. rødlig. Griflernes Fod kegelformig. Frugten valseformig=ægformig, kronet med de lange, oprette Grifl. Frøene med lidt ophøjede, butte Ribber. Det fælles Svøb ofte 0. De yderste Blst. i de særegne Skjermene langstilkede, ufrugtbare, de midterste siddende ell. kortstilkede, frugtbare.

1 *U. O. fistulosa.* Pibet Klaseffjerm.

Frugten topformig, tættsiddende, med tykke Ribber. Roden knippeformig med aflange Knolde imellem, med Sideskud. Stgl. og Bldstf. glatte. Rødbld. dobbelt finneede; Smaaabd. fileformige, lappede. Stglbld. finneede, traadformige. Skjermene 3—4straalede, uden Svøb. 1—1½ F. ☉. Jul., Aug. I Damme og Aær. F. D. T. 486.

2 *U. O. pimpinelloides.* Pimpinellebladet Klaseffjerm.

Frugten valseformig, sribet, nedentil haardhudet, længere end den korte, tykke Blstf. Rodtrærlerne i et Knippe, valseformige, imod Enden udvidede til en ægformig=kugleformig Knold. Rødbld. dobbelt finneede; Smaaabd. fileformige, indskaarne. Stglbld. med ligebrede, hectrandede Smaaabd. Svøbet mangebladet. 1—1½ F. 4. Juli, Paa Enge. F. D. T. 1454.

3 *U. O. Phellandrium Lamarck.* *Phellandrium aquaticum Linn.* Vand=Stikle.

Frugten aflang, sribet, næsten kortere end Smaaafsilken. Rodtrærlerne i Krands, traadformige. Stgl. pibet, furet. Grenene udspilede. Bld. dobbelt ell. 3dobbelt finneede; Smaaabd. ægformige, indskaarne. Skjermene møbsatte Bld., uden Svøb. 1—2 F. 3. I Moser, I Flommen. F. D. T. 1154.

2 Slægt. *Æthusa*. Halvsøb.

Kronbl. omvendt ægformige, udbrandede, de yderste noget større. Frugten ægformig-kugleformig, furet. Frøene næsten halv-kugleformige. Støtten 2deelt. ○. Oprette. Bl. Håftede. Det fælles Svøb 0 eller 1bladet. Det særegne Svøbs Blade 1, 2 eller 3, ved Ydersiden af Skjermen, børsteformige. Blst. hvide.

1 U. *Æ. Cynapium*. Giftig Halvsøb.

Bl, dobbelt ell. 3dobbelt finne. Smaaablades Flige lidt butte. Skjermens Straaler næsten lige lange. Det fælles Svøb 0. Det særegne Svøbs Bl. 3, længere end den særegne Skjerm. 1—3 F. ○. Jul, Aug. 3 Haver. Ved Sorøe. F. D. T.

3 Slægt. *Libanotis*. Libanot.

Bæg. Standet; Lænderne tynde, sylformige, forlængede, farvede, affaldende. Kronbl. omvendt ægformige. Frugten ægformig-aflang, kronet med de tilbagehøjede Grifler, næsten trind, sribet.
* Begge Svøbene fleerbladede.

1 U. *L. vulgaris De Cand.* *Athamanta Libanotis Linn.* Laaden Hjortetod.

Frugten laaden. Stgl. furet. Bl. dobbelt finne; Smaaablade indskaaen = halvfinne; de nederste korsformige; Fligene lancetformige. 2—3 F. 4. Aug. Paa aabne Marker. F. D. T. 754.

4 Slægt. *Ligusticum*. Løestilk.

Bæg. Standet ell. utydeligt. Kronbl. omvendt ægformige, spidse, udbrandede, med meget korte Negle. Frøene næsten halvtrinde, med næsten vingeformige Ribber. Blst. hvide.

1 U. *L. scoticum*. Skotst Løestilk.

Bæg. Standet, vedvarende. Stgl. næsten enkelt, sribet. Bl. dobbelt trekbladede, matte. Smaaabl. næsten rudeformig = ægformige, tandet = takkede. Det fælles Svøbs Bl. 5—7, ligebred = lancetformige. 1—2 F. 4. Jul. Ved Strandbredder. F. D. T. 207.

5 U f s n i t.

Angelicæ. Angelikartede.

Frugten fladtrykt, firevinget. Frøene indentil lidt ophøjede, indentil flade; de yderste Ribber paa hvert Frøe vingeformige. Hviden indentil flad. * 4, sjelden 3. Stgl. opret. Bl. flere Gange sammensatte, sædvanl. glatte. De særegne Svøb fleerbladede.

1 Slægt. *Levisticum*. Lovstikke.

Kronbl. indbøjede, rundagtige, udeelte. Alle Ribberne vingeformige, de yderste bredest. Støtten 2deelt. 2. Glat. Stgl. trind. Bl. fleerobbelt trekoblede. Smaaabl. omvendt ægformige, næsten kileformige, indsaaren = tandede. Det fælles Svøb fleerbladet. Blst. guulagtige.

1 *U. L. officinale Koch. Ligusticum Levisticum Linn.* Almindelig Lovstikk.

$\frac{1}{2}$ F. 2. Jun., Jul. I Haver. F. D. T.

2 Slægt. *Selinum*. Seline.

Kronbl. omvendt ægformige, udrandede, hvide. Alle Ribberne vingeformige, de yderste bredest. Støtten 2deelt. 2. Glatte. Bl. fleerobbelt sammensatte; Smaaabl. halvfinne. Det fælles Svøb saabladet eller 0.

1 *U. S. Carvifolia.* Rummenbladet Seline.

Kronbl. med indbøjet Spids. Stgl. furet = kantet. Skjermenes Straaler glatte. 2-3 F. 2. Jul. Paa vaade Enge. F. D. T. 667.

3 Slægt. *Angelica*. Angelik.

Kronbl. lancetformige, udeelte, spidse, hvide. De 3 mellemste Ribber paa hvert Frøe traadformige. Frøet næsten halotrindt. Støtten 2deelt, fri. Bl. dobbelt finne. Skjermen paa Enden af Stgl.

1 *U. A. silvestris.* Skov = Angelik.

Kronbl. indbøjede. Stgl. sribet, oventil sløjlsagtig duunhaaret. Bladstilkene meget udvidede. Bl. dobbelt ell. 3dobbel finne. Smaaabl. lancetformige, spidse, glatte, savtaktede, ikke nedløbende. Det fælles Svøb 1-2bladet. 3-6 F. 2 ell. 3. Jul. Ved Grøfter. I Steensbøg. F. D. T. 1639.

4 Slægt. *Archangelica*. Dvan.

Væg. kort standet. Kronbl. elliptiske, udeelte, tilspidsede, med indbøjet Spids. De 3 midterste Ribber paa hvert Frøe opbøjede. Støtten 2deelt. 2. Bladstilkene udvidede, omfædende, bugede. Det særegne Svøb eensidigt.

1 *U. A. officinalis Hoffm. Angelica Archangelica Linn.* Ved Angelik.

Stgl. glat, trind, sribet. Bl. dobbelt finne. Smaaabl. næsten hjerteformige, lappede, skarpt takkede; Endebladet klappet. Det fælles Svøb saabladet, affaldende. Det særegne Svøbs Bl. af

den særegne Skjerm's Længde. Blst. grønagtig gule. 4—6 F. 3. Jul. Ved Kænbredder og paa Enge mellem Busse. F. D. T. 206.

6 Uffnit.

Peucedaneæ. Svovlrøddartede.

Frugten fladtrykt, omgivet med en udeelt, jevn, vingeformig Rand. Frøene næsten flade. Hviden indentil flad. * Stgl. opret, sædvanl. trind. Bld. sammensatte.

1 Slægt. *Peucedanum*. Svovlrød.

Bøgerets Rand standet. Kronbld. omvendt ægformige, med indbøjet Spids. Støtten 2deelt. De særegne Svøb fleerbladede.

1 U. *P. officinale*. Læge = Svovlrød.

Frugten oval, med smal Rand. Stgl. trind, grenet. Bld. 5dobbelte trefoblede; Smaaabl. ligebrede, spidse, flappe. Det fælles Svøbs Bld. 3, børsteformige, affaldende. Blst. hvidagtig gule. 2—3 F. 4. Paa Enge. F. D. T.

2 U. *P. silvestre De Cand.* *Selinum silvestre Linn.* *Selinum palustre Rafn.*

Kjær = Seline.

Frugten lancetformig = elliptisk, med smal Rand. Stgl. trind, furet. Bld. dobbelt ell. 3dobbelte finneede; Smaaabl. halvfinneede; Fligene ligebred = lancetformige, lidt butte. Det fælles Svøb mangebladet. Blst. hvide. 2—3 F. 4. Jul. 3 Moser. Ved Sorøe. F. D. T. 257 og 412.

3 U. *P. Oreoselinum Cusson.* *Athamanta Oreoselinum Linn.* Udspilet Hjorterød.

Frugten oval = kredbrund med smal Rand. Stgl. trind, fribet. Bld. 3dobbelte finneede; de særegne Bld. af. udspilede. Smaaabl. ægformige, indskaarne, glindsende. Blst. hvide. 2—3 F. 4. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 1750.

4 U. *P. (?) lineare.* *Selinum lineare Schumacher.* Fimbladete Seline.

Frugten elliptisk, med hindet Rand. Stgl. fribet. Bld. 3dobbelte finneede; Smaaabl. halvfinneede; Fligene ligebrede, lidt butte. Det fælles Svøbs Bld. mange, ligebred = børsteformige. Blst. hvide. 2—3 F. 4. Jul., Aug. Paa Diger og ved Strandbredder. F. D. T. 1330.

Ann. Den er efter Gornemanns Vidnesbyrd forskjellig fra *P. Rablense*, hvortil De Candolle henfører den.

2 Slægt. *Imperatoria*. Storfjern.

Kronbl. omvendt ægformige, med indbøjet Spids. Støtten 2deelt. 2. Glatte. Stgl. trind, sribet. Bld. savtaktede. Fælles Svøb sædvanl. 0. De særegne Svøb faabladede. Blst. hvide.

1 N. I. *Ostruthium*. Bjerg = Storfjern.

Bld. dobbelt 3koblede; Smaabl. ægformige, hele og fløvede, indskaaen = savtaktede. Bladfløderne meget store. 2—3 F. 2. Jul. Paa lave Bjerge. F. D. T.

3 Slægt. *Anethum*. Dil.

Kronbl. rundagtige, indbøjede; Endeflgen næsten 4kantet og indtrykt. De 3 mellemste Ribber paa hvert Frøe skarpt hjølfornige. O. Drette, glatte. Bld. flere Gange sammensatte, med børstefornig = ligebrede Smaabl. Fælles og sæveget Svøb 0. Blst. gule.

1 N. A. *graveolens*. Have = Dil.

Frugten elliptisk, med en bred, flad Rand. 1—2 F. O. Jul., Aug. Som vild i haver, ogsaa i Soroc. F. D. T. 1572.

4 Slægt. *Pastinaca*. Pastinak.

Væg. utydeligt ell. fint tandet. Kronbl. rundagtige, indbøjede; Endeflgen bred, indtrykt. Ribberne meget tynde. Støtten 2deelt. Urter med tapformig Rod. Bld. fannede. Smaabl. fløvede ell. tandede. Fælles og sæveget Svøb 0 ell. faabladet. Blst. gule.

1 N. P. *sativa*. Almindelig Pastinak.

Begertænderne utydelige. Frugten oval. Stgl. furet. Bld. glatte, fannede; Smaabl. ægformig = aflange, butte, rundtattet = tandede, nedentil indskaaene; Endebld. 3lappet. Ingen Svøb. 2—3 F. 2. Aug. Ved Grøfter og Weje. F. D. T. 1206.

5 Slægt. *Heracleum*. Bjørnekloe.

Væg. 5tandet. Kronbl. omvendt ægformige, ubrandede med indbøjet Spids, de yderste ofte straalformige, 2fløvede. Ribberne meget tynde. Støtten 2deelt. Bldst. omfløvede, brede. Det fælles Svøb affaldende, sædvanl. faabladet. De særegne Svøb mangebladede.

1 N. H. *Sphondylium*. Almindelig Bjørnekloe.

Frugten flad, næsten kredsrund. Bld. fannede ell. halvflannede, hvashaarede. Smaabl. 3—5lappede; Lapperne indskaaene, rundtattede. De særegne Svøbs Bld. ligebred = børstefornige. Blst. rødagtig hvide. 4—5 F. 2. Jul. Ved Weje og paa Gærder. Ved Soroc. F. D. T.

7 Uffnit.

Thapsiæ. Goldfrøarte.

Frugten fladtrykt ell. næsten trind. Frøet indentil fladt; Hovedribberne traadformige, 3 paa Ryggen, 2 paa Siderne af Frøet; Viribberne 4, alle eller de 2 yderste vingeformige, heelrandede. Sviden indentil flad.

1 Slægt. *Laserpitium*. Goldfrø.

Bæg. Standet. Kronbl. omvendt ægformige, udrandede med indbøjet Spids. Frugten Svinget (alle Viribberne vingeformige). Støtten 2deelt. Urter. Begge Svøb mangebladede. * Blst. hvide.

1 U. *L. glabrum Crantz.* *L. latifolium Jacquin.* Bredbladet Goldfrø.

Frugten glat; Ringerne næsten ligestore og krusede. Bl. dobbelt finned, ganske glatte; Smaaabl. stejvt hjerteformige, hist og her oddet tandede, paa den øverste Deel af Stgl. heelrandede. Det fælles Svøbs Bl. børsteformige. 3—6 F. 4. Jul. 3 Skove. F. D. T. 1513.

2 U. *L. prutenicum*. Preussisk Goldfrø.

Frøenes Hovedribber stivhaarede; Ringerne ulige store, de yderste størst. Bl. dobbelt sammensatte, paa Blstf. og Nerverne lidt stivhaarede. Smaaabl. æg-lancetformige, halvfinned; Fligene lancetformige, langspidsede, de sidste sammentøbende. Stgl. kantet, nedentil bagvendt stivhaaret. Det fælles Svøbs Bl. ligebrede, i Randen klare, heelrandede. 2—3 F. 3. . . . Paa Bakker. F. D. T. 1751.

8 Uffnit.

Daucinæ. Gulerodarte.

Frugten fladtrykt ell. næsten trind. Frøet indentil fladt; Hovedribberne stivhaarede, 3 paa Ryggen, 2 paa Siderne af Frøet; Viribberne 4, mere fremstaaende, piggede. Sviden indentil flad.

1 Slægt. *Daucus*. Gulerod.

Bæg. Standet. Kronbl. omvendt ægformige med indbøjet Spids; de yderste ofte straalformige og 3kløvede. Frugten aflang. Viribberne næsten vingeformige, ende sig i en enkelt Rad af Pigge. Det fælles Svøbs Bl. halvfinned ell. 3kløvede; det særegnes 3kløvede ell. udeelt.

1 U. *D. Carota*. Almindelig Gulerod.

Viribberne umærkelig vingeformige; Piggene af samme Længde som Frugtens Diameter. Støtten 2deelt. Stgl. stivhaaret. Bl. 2—3dobbelt finned, Smaaabl. halvfinned. Fligene lancetformige, tilspids-

fede. Det fælles Svøbs Bld. halvsinnede, næsten af Skjermens Længde. (Blst. hoide). Skjermens Straaer ved Modenheden indbojede. 1—2 F. *J.* Jul. Paa tørre Marker. Ved Sorø. F. D. T. 723.

9 Affnit.

Caucalineæ. Fodangelartede.

Væg. Standet. Kronbld. omvendt ægformige med indbøjet Spids, de yderste større, 2klovede. Frugten sammentrykt fra Siderne eller næsten trind. Hovedribberne børstede eller piggede; Viribberne 4, piggede. Hviden med en Fure paa langs indentil. * \odot . Bld. sammensatte, klette. Det fælles Svøb 0 ell. faabladet. De særegne Svøb 3—8bladede. Blst. hoide.

1 Slægt. *Caucalis*. Fodangel.

Viribberne med en enkelt Rad Pigge. Støtten stiv, i Spidsen kløvet.

1 *U. C. daucoides*. Faastraalet Fodangel.

Frugtens Pigge hagede. Stgl. nedentil haaret, oventil glat. Bladskederne haarede. Bld. flere Gange sammensatte; Smaaabd. halvsinnede; Fligene korte, lidt spidse. Den fælles Skjerm 3straalet, uden Svøb. Den særegne Skjerm har sædvanl. kun 3 frugtbare Blomster. 1—1½ F. \odot . Paa Agre. F. D. T.

2 Slægt. *Torilis*. Hvasfræe.

Hovedribberne smaat børstede. Viribberne med mange Pigge, opfyldte ganske Mellemrummene mellem Hovedribberne. Støtten børsteformig, 2kløvet.

1 *U. T. Anthriscus Gmelin*. *Tordylium Anthriscus Linn.* *Caucalis Anthriscus Scop.*
Hvasshaaret Fodangel.

Frugternes Pigge stive, ikke hagede, halv saa lange som Frugtens Brede. Skjermene langsilke, 5—7straaledede. Det fælles Svøbs Bld. 4—5, ligebred-sylformige. (Blst. rødagtige). ½—3 F. \odot . Jul. 3 Krat. Ved Sorø. F. D. T. 919.

2 *U. T. nodosa Gærtner*. *Tordyl. nodosum Linn.* *Cauc. nodosa Hud.* Knudret Fodangel.

Frugtens Pigge længere end Frugtens Brede. Skjermene næsten siddende, nøgleformige. Fælles Svøb 0. ½—1½ F. \odot . Jul. Paa Agre. F. D. T.

10 Affnit.

Scandicineæ. Rjørvelartede.

Frugten sammentrykt ell. med fordybede Sider, ofte næbbet. Ribberne alle lige store, undertiden ifkun kjendelige ved Spidsen. Frøet opbøjet-trindt. Hviden indentil med en

Fure. * Bld. næsten 3kantede, flere Gange sammensatte; Smaaald. indskaarne. Fælles Svøb sædvanlig 0. Særeeget Svøb fleerbladet. Blst. hvide.

1 Slægt. Scandix. Langnæb.

Frugtens Næb meget langt. * Støtten udeelt.

1 U. S. Pecten Veneris. Langnæbbet Kjørvel.

Frugtens Næb fladttrykt, lidt laadent, det Øvrige glat. Det særegne Svøbs Smaaald. i Spidsen indskaarne. 4-8 Somm. ☉. Jun., Jul. Mellem Korn. F. D. T. 844.

2 Slægt. Anthriscus. Kjørvel.

Kronbld. omvendt ægformige, afflumpede ell. ubrandede. Frugten med indtrykte Sider, næbbet; Næbbet kortere end Kjernerne. Frøene næsten trinde. Ribberne 0, undtagen paa Næbbet. Støtten 2fløvet. Stgl. trind, stribet ell. furet. * Bld. fleerdobbelst 3koblede. Smaaald. halvfinnede.

1 U. A. silvestris Hoffm. Chærophyllum silvestre Linn. Almindelig Huulsvøb.

Grisl. korte, neppe udspilede. Frugten aflang, glat. Stgl. furet, grenet. Smaaald. ægformige, halvfinnede; Fligene aflange, noget butte; de sidste forlængede. Skjermene paa Enden af Stgl. Straalerne glatte. Det særegne Svøbs Bld. 5, ægformige, hule. 2-3 F. 4. Maj, Jun. I Haver og ved Gjerder. Ved Sorøe. F. D. T.

2 U. A. Cerefolium Hoffm. Scandix Cerefolium Linn. Almindelig Kjørvel.

Frugten aflang-sylformig, glat. Bld. glatte; Smaaald. ægformige, halvfinnede, Fligene noget butte; Skjermene modsatte Bld., fiddende; Straalerne 3-5, duunhaarede. Det særegne Svøbs Bld. sædvanlig 2, ligebred-lancetformige. 2 F. ☉. Jun. Som vild i Haver, ogsaa ved Sorøe. F. D. T. 1640.

3 U. A. vulgaris Pers. Scandix Anthriscus Linn. Wild Kjørvel.

Frugten ægformig, børstet, med kegleformigt Næb. Stgl. jevn, glat. Smaaald. med korte, butte Flige. Blstf. haarede. Bladskederne randhaarede. Skjermene modsatte Bld. De særegne Svøbs Bld. 5-6, ægformige. 1-2 F. ☉. Maj, Juni. Ved Gjerder. Ved Sorøe. F. D. T. 863.

3 Slægt. Chærophyllum. Huulsvøb.

Kronbld. omvendt ægformige med indbøjet Spids. Frugten uden Næb. Støtten 2fløvet. * Frøets Ribber ufjendelige.

1 *U. B. cernua*. Niffende Brønſel.

Blst. undertiden med Straalblst. Bld. lancetformige, sædvanl. sammengroede, ſjernt takkede, glatte. Blst. sædvanl. niffende. 1—2 F. ☉. Aug., Sept. Ved Vand. Ved Sorøe. F. D. T. 841.

Afart: β) radiata. Med Straalblomſter.

γ) minima. Med oprette Blst. 2 Komm. F. D. T. 312.

2 *U. B. tripartita*. Tredeelt Brønſel.

Blst. altid ſtivedannede, oprette. Bld. 3deelte, lancetformige, indſtaaren = takkede, ovenpaa glatte, nedenunder lidt haarede. (Hele Planten har en mørkere Farve end den foregaende). 1—2 F. ☉. Aug., Sept. Ved Vand. Ved Sorøe. F. D. T.

Afart: pumila. Stgl. eenblomſtret.

II. Smaa-blst. i Randen ere Sun-blst., ikke længere end de tvæjænnede. * Stgl-bl. afværlende ell. 0.

3 Slægt. *Tussilago*. Heftehov.

Det fæll. Bøger taglagt, af Smaa-blomſternes Længde; Skjællene ikke ſtivhinde. (Blst. undertiden ſtraalede). Frugtbunden nøgen. Fnocken haaret. Urter med Skaf eller ikkun nedentil bladet Stgl. * Skafet enkelt, ſjællat. Bld. næſten hjerteformige, ſtilkede.

1 *U. T. Farfara*. Almindelig Heftehov.

Blst. ſtraalede (gule). Straalblst. ligebrede, meget ſmalle. Skafet eenblomſtret. Bld. kantede, tandede, nedenunder duunhaarede; de komme frem efter Blst. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Martz, April. Paa leret Grund. Ved Sorøe. F. D. T. 595.

2 *U. T. alba*. Hvid Heftehov.

Blst. ſtivedannede (hvide). Bld. hjerteformig = fredeformige, bugtede, ſkarpt tandede, nedenunder hvidſilkede. Blomſterbuſſens Grene lige høje, ſteerblomſtrede. 1 F. 4. April. Paa fugtige, lerede Steder. Ved Sorøe. (Jeg har endnu ikke fundet den der). F. D. T. 524.

3 *U. T. Petasites*. Storbladet Heftehov.

Blst. ſtivedannede (ljødfarvede). Bld. elliptiſk = hjerteformige, ulige ſmaatandede (meget ſtore), nedenunder graaſilkede; Grundlapperne nær ved hinanden. Blomſterklafen ægformig; Smaaſilkene ſædvanlig udeelte. 1—2 F. 4. Apr., Maj. Paa fugtige Steder. Ved Sorøe paa en Eng mellem Byen og Søen; ved Lyng. F. D. T. 842.

Fure. * Bld. næsten 3kantede, flere Gange sammensatte; Smaaabd. indskaarne. Fælles Svøb sædvanlig 0. Særeeget Svøb fleerbladet. Blst. hvide.

1 Slægt. *Scandix*. Langnæb.

Frugtens Næb meget langt. * Støtten udeelt.

1 U. *S. Pecten Veneris*. Langnæbbet Kjørvel.

Frugtens Næb fladtrykt, lidt laadent, det Øvrige glat. Det særegne Svøbs Smaaabd. i Spidsen indskaarne. 4—8 Tomm. ☉. Jun., Jul. Mellem Korn. F. D. T. 844.

2 Slægt. *Anthriscus*. Kjørvel.

Kronbld. omvendt ægformige, affumpede ell. ubrandede. Frugten med indtrykte Sider, næbbet; Næbbet kortere end Kjørnerne. Frøene næsten trinde. Ribberne 0, undtagen paa Næbbet. Støtten 2fløvet. Stgl. trind, sribet ell. furet. * Bld. fleerdobbelst 3koblede. Smaaabd. halvfinnede.

1 U. *A. silvestris Hoffm.* *Cherophyllum silvestre Linn.* Almindelig Huulsvøb.

Griff. korte, neppe udspilede. Frugten aflang, glat. Stgl. furet, grenet. Smaaabd. ægformige, halvfinnede; Fligene aflange, noget butte; de sidste forlængede. Skjermene paa Enden af Stgl. Straalerne glatte. Det særegne Svøbs Bld. 5, ægformige, hule. 2—3 F. 4. Maj, Jun. I haver og ved Gårder. Ved Sorøe. F. D. T.

2 U. *A. Cerefolium Hoffm.* *Scandix Cerefolium Linn.* Almindelig Kjørvel.

Frugten aflang = sylformig, glat. Bld. glatte; Smaaabd. ægformige, halvfinnede, Fligene noget butte; Skjermene modsatte Bld., fiddende; Straalerne 3—5, duunhaarede. Det særegne Svøbs Bld. sædvanlig 2, ligebred = lancetformige. 2 F. ☉. Jun. Som vild i haver, ogsaa ved Sorøe. F. D. T. 1640.

3 U. *A. vulgaris Pers.* *Scandix Anthriscus Linn.* Wild Kjørvel.

Frugten ægformig, børstet, med kogleformigt Næb. Stgl. jevn, glat. Smaaabd. med korte, butte Flige. Bldstik. haarede. Bladfæderne randhaarede. Skjermene modsatte Bld. De særegne Svøbs Bld. 5—6, ægformige. 1—2 F. ☉. Maj, Juni. Ved Gårder. Ved Sorøe. F. D. T. 863.

3 Slægt. *Cherophyllum*. Huulsvøb.

Kronbld. omvendt ægformige med indbøjet Spids. Frugten uden Næb. Støtten 2fløvet. * Frøets Ribber ukjendelige.

1 *U. C. temulum.* Knudret Huulsvøb.

Frøene aflang = sylformige. Stgl. ru, plettet. Bld. dobbelt finned, paa begge Sider lidt sivhaarede. Smaa bld. ægformig-aflange, indskaarne, smaat tandede. De særegne Svøbs Bld. omtrent 8, tilbagebøjede, ægformige, randhaarede. Skjermene før Blomstringen lødende. 2 *F. J.* Jun., Jul. *J. Krat* og ved Gjerder. Ved Sorøe. *F. D. T.* 918.

Ann. Den ligner meget *Torilis Anthriscus*, fra hvilken den dog let skelnes ved de glatte Frøe.

4 Slægt. *Myrrhis.* Kortnøb.

Kronbld. omvendt ægformige, udrandede med indbøjet Spids. Frøenes Ribber skarpt kjelede, indvendig hule. Støtten 2kløvet. De midterste Blst. i Skjermen 5antblst.

1 *U. M. odorata Scopoli.* *Scandix odorata Linn.* Spanst Kjørvel.

Bld. paa Underfladen duunhaarede. De særegne Svøbs Bld. lancetformig = sylformige. 2-3 *F.* Jun. *J. Haver.* *F. D. T.* 1928.

11 *Uffnit.*

Smyrneæ. *Smyrniunartede.*

Frugten ophovnet. Hviden indentil med en Fure. * Fælles Svøb 5-7bladet. Særeeget Svøb eensidigt, sædvanlig 3bladet.

1 Slægt. *Conium.* Skarntyde.

Kronbld. omvendt hjerteformige, med meget kort indbøjet Spids. Frugten sammentrykt, ægformig. Ribberne lige store, bølget = rundtakkede. Støtten 2kløvet i Spidsen. Bld. flere Gange sammensatte. Blst. hvide.

1 *U. C. maculatum.* Plettet Skarntyde.

Stgl. glindsende, plettet. Det særegne Svøbs Bld. lancetformige, kortere end den særegne Skjerm. 5-7 *F. J.* Jun. Ved Gjerder. *F. D. T.*

2 *Orden.*

Araliaceæ. Bedbendeartede.

Kronbld. 4-5 ell. 10, afværende med Bægerets Tænder, før Blomstringen sammenstødende med Randene, meget sjelden 0. Støvdr. 4-10. Griff. sædvanlig flere, enkelte.

Et fleerrummet Bær; Nummene Ifræde. Hviden fjædet. Embryonet lidet, indsluttet i Hviden. Bld. stillede; Stilkene ved Grunden tykkere. Blst. i Ekjerne ell. Hoveder.

1 Slægt. *Adoxa*. Desmerurt.

Bæg. 4—5fløvet, ved Grunden omgivet med et andet, 2—3bladet Bæg. Kronbld. 0. Støvdr. 8 ell. 10, 2 ved Grunden af hver Bægerflig. Griff. 4—5 adskilte. Bærret Arummet. Frøene omgivne med en hindeagtig Rand. 2. Glat. Roden skjælet. Bld. 3koblede eller dobbelt 3koblede; Emaabld. 2—3lappede; Stgbl. 2, modsatte. Blst. i et 5blomstret Hoved; den øverste Blst. 4fløvet; de øvrige 5fløvede.

1 N. A. *Moschatellina*. Almindelig Desmerurt.

2—3 Lomm. 2. Apr. 3 fugtige Skove. Ved Sorøe, f. Ex. i Philosophgangen. F. D. T. 94.

2 Slægt. *Hedera*. Vedbende.

Bæg. heelt ell. 5tandet. Kronbld. 5—10, frie. Støvdr. 5—10. Griff. 5—10, sammenstødende ell. sammenvorne til een. Bærret 5—10rummet. h.

1 N. H. *Helix*. Almindelig Vedbende.

Stammen klattrende ved rodformige Trævler. Bld. læderagtige, glatte, glindsende, heelrandede, immergrønne, afværende; de nederste 5lappede, de øverste ægformige. (Blst. guulgrønne). 10—30 F. h. Detkr. 3 Skove og Byer. 3 og ved Sorøe. F. D. T. 1027.

3 Orden.

Corneæ. Korneelartede.

Bæg. 4fløvet. Kronbld. 4, nedtil brede. Støvdr. 4, afværende med Kronbld. Griff. traadformig, med enkelt Nr. En Steenfrugt med 2rummet Steen. 1 Frøe i hvert Rum. Hviden fjædet. Bld. sædvant. modsatte, enkelte. Blst. i Hoveder, Ekjerne eller Halvskjerne.

1 Slægt. *Cornus*. Korneel.

Bæg. 4tandet. Kronbld. før Blomstringen sammenstødende med Randene, aflange.

1 N. C. *sanguinea*. Rød Korneel.

Grenene lige. Bld. ægformige, heelrandede, eensfarvede, nedenunder finhaarede. Halvskjermene nedtrykte, flade, uden Svøb. (Blst. hvide, Frugterne sorte). 4—8 F. h. Jun., Jul. 3 Krat. F. D. T. 481.

2 U. C. svecica. Hønsføt-Korneel.

Frugten kugleformig. Stgl. urtagtig, sædvanl. grenet. Bl. alle modsatte, siddende, agformige, heelrandede, nerveede. Skjermen silket. Svøbet længere end Blst., 4bladet, hvidagtigt. (Blst. fortagtig-røde. Frugterne røde). 2—4 Lomm. 4. Jun., Jul. Paa høje Skovenge. F. D. T. 5.

4 Orden.

Loranthaceæ. Mistelartede.

Blst. tvækjønnede ell. enkeltkjønnede. Bæg. voret omkring Frugtknuden, ved Grunden omgivet med et andet Bæger. Kronbl. 4—8, frie ell. sammenvoxne, før Blomstringen med sammenstødende Rande. Støvdr. 1 indenfor hvert Kronbl. Griff. traadformig ell. 0. Get Irummet, Ifreet Bær. Frøet omgivet med en Hinde. Hviden fjædet. Sædvanl. buskagtige Snylteplanter. Bl. sædvanl. modsatte, udeelte.

1 Slægt. Viscum. Fuglelium.

Blst. tvæboe ell. eenboe. Bæg. utydeligt, i Hanblst. 0. Kronbl. sædvanl. 4, tykke, i Hanblst. ved Grunden sammenvoxne, i Hunblst. frie. Støvkapperne siddende, voxede til Kronbl., manganrummede. Griff. 0. Bærret indvendig flinet.

1 U. V. album. Hvid Fuglelium.

Tveboe. Stgl. tvædeelt, noget grenet. Grenene treinde. Bl. lancetformige, butte, uden Nerver. Blomstehovederne sædvanl. 5blomstrede, siddende. (Blst. gullgrønne). Bærrene kugleformige. 2—3 F. H. Paa Træers Stammer. F. D. T. 1657.

- Rhamnus. See 1 Afdeling 2 Orden.
- Isnardia. See 1 Afdeling 5 Orden 2 Afsnit.
- Circæa. See 1 Afdeling 5 Orden 3 Afsnit.
- Bryonia. See 1 Afdeling 9 Orden.
- Ribes. See 1 Afdeling 13 Orden.
- Jasione. See 3 Afdeling 6 Orden.
- Phyteuma. See 3 Afdeling 6 Orden.

3 Afdeling.

Flosculiferæ. Samblomstrede.

Vægerets Hær voret omkring Frugtknuden. Kraven undertiden overgaaende til en Fiof. Kronen oversædig, eenbladet, sædvanl. 4 ell. 5kløvet, Støvdr. sædvanl. 4 ell. 5, og siddende paa Kronen. * Griff. sædvanl. 1, med 2—3 Nr.

1 Orden.

Caprifoliaceæ. Gedebladartede.

Vægerets Krave sædvanl. 5deelt. Kronen 1bladet, undertiden uregelmæssig. Griff. 1 ell. 0. 3 Nr, adskilte eller sammenvorne til et Hoved. Et Hær. Embryonet midt i den fjædede Hvide, med opadvendt Rodspids. Bld. modsatte. Arelbld. sædvanl. 0.

1 Afsnit.

Sambuceæ. Hyldeagtige.

Kronen regelmæssig, 5kløvet. Støvdr. 5. Griff. 0. 3 siddende Nr. * Ikke slyngende. Bld. takkede ell. tandede. Blst. i Dvafter.

1 Slægt. **Sambucus.** Hylde.

Kronen frukkeformig=hjulformig. Hæret 3—4frøet. Bld. fannede. 2 Arelbld. ell. Hjertler ved Grunden af hvert Bld.

1 A. **S. Ebulus.** Sommer-Hylde.

Alle Blst. toekjønnede. Stgl. vortet. Arelbld. bladagtige. Dvafterne 3deelte. (Blst. blegrode). 1—3 F. 4. Jul. Ved Byer. Ved Kongeheden i Sorøe. F. D. T. 1156.

2 A. **S. nigra.** Almindelig Hylde.

Smaaabl. æg=lanceformige, fasttakkede, glatte. Dvafterne 5deelte. (Blst. hvide). 6—10 F. h. 3 Haver og ved Gårder. Ved Sorøe. F. D. T. 545.

2 Slægt. **Viburnum.** Dvalfved.

Kronen hjulformig ell. klokkeformig. Hæret 1frøet. Frøet sammentrykt.

1 U. V. Opulus. Almindelig Qvalkved.

De yderste Blst. større, ufrugtbare. Frøet omvendt hjerteformigt. Blb. spidst klappede, savtakkede, glatte. Blstf. hjertelede. Dvasterne stilkede. (Blst. hvide, Bærrene røde). 3—10 F. h. Juni. 3 Krat. Ved Sorø. F. D. T. 661.

2 Uffnit.

Lonicereæ. Gedebladlignende.

Kronen med Nr, sædvanl. uregelmæssig. Griff. traadformig.

1 Slægt. Lonicera. Gedeblad.

Stovdr. 5. Bærret drummet, med faa Frøe. Frøene storpede. h, undertiden flattrende. Blb. modsatte, sædvanl. udeelte. Blst. i Bladhjørnerne.

1 U. L. Periclymenum. Almindelig Gedeblad.

Kronen gabende (rødlig hvid). Grenene slyngende. Blb. affaldende, ovale, nedentil smallere, heelrandede, alle adskilte. Blst. i krandsformige Hoveder. 10—20 F. h. Jun. 3 Krat. Ved Sorø. F. D. T. 908.

2 U. L. Xylosteum. Dunet Gedeblad.

Kronen pufket, Næbet (hvid). Duunhaaret. Stammen opret. Blb. ægformig, elliptiske, heelrandede. Blstf. kortere end Blb., 2blomstrede. Frugtknuderne duunhaarede. Bærrene nedentil sammentorne, kugleformige. h. 4—8 F. Jun., Jul. 3 Krat. F. D. T. 808.

2 Orden.

Rubiaceæ. Krapartede.

Stovknapperne drummede, aabne sig indad. Griff. sædvanl. 1 med 2 Nr. Frugten sædvanl. drummet. Hviden kjedet ell. hornagtig, stor. Embryonet sædvanl. lige, midt i Hviden. Blb. enkelte, omgivne med en Nerve i Randen, heelrandede, modsatte ell. i Krands, med Nrelbld., som ofte antage Bladenes Form.

Stellataæ. Stjernede: Kronen hjulformig eller tragtformig; Fligene før Blomstringen sammenstødende. Griff. 2fløvet. Nrrene hovedformige. 2 ikke opspringende, 1frøede Frøegjemmer. Hviden hornagtig. Blb. modsatte. Nrelbld. af Bladenes Form; 1, 2 ell. 3 ved hver Side. De danne med de egentlige Blade 4-, 6- ell. 8bladede Krands. * Urter. Etgl. svag, ledet.

1 Slægt. *Sherardia*. Blaaftjerne.

Vægerets Krave 4—6tandet, vedvarende. Kronen tragtformig, med trindt Rør, 4kløvet. Stovdr. 4. Frugten tør, kronet med Væg. Bl. (Nrelbl. medregne) 6hobede. Bl. lancetformige, spidse, ujevne. Blst. i Enden, med Svøb, næsten siddende.

1 U. *S. arvensis*. Uger = Blaaftjerne.

(Blst. lila). O. 2—4 Somm. Jun.—Aug. Paa Ugre. Ved Sorøe. F. D. T. 439.

2 Slægt. *Asperula*. Myssike.

Vægerets Krave 4tandet ell. utydelig. Kronen sædvanl. tragtformig og 4kløvet. Frugten ikke kronet; Frøegjemmerne næsten kugleformige. Bl. 4—8hobede, de øverste modsatte (uden Nrelbl.). * Glatte. Blst. hvide.

1 U. *A. tinctoria*. Farve = Myssike.

Kronen ofte 3kløvet. Næsten opret. Bl. ligebrede, de nederste 6z, de mellemste 4hobede, de øverste modsatte; Bl. ved Blst. ægformige. Blst. i Skjermene. 1—3 Somm. 4. Jun., Jul. Paa Bakker. F. D. T.

2 U. *A. odorata*. Krands = Myssike.

Frugten hvasshaaret. Dpret ell. opstigende. Bl. 8hobede, i Randen smaataffet = hvasshaarede, lancetformige. Halvskjermene i Enden, stikkede. $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj. 3 Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 562.

3 Slægt. *Galium*. Enerre.

Vægerets Krave ufsjendelig. Kronen hjulformig, 4kløvet ell. sjeldnere 3kløvet. Stovdr. korte. Grisl. 2, korte. 2 tørre, næsten kugleformige Frøegjemmer. Grenede.

A. Frugten glat. 4. Bl. 4—10 i hver Krands. Blst. tvæjsnede, hvide, i en kvastartet Top.

1 U. *G. silvaticum*. Skov = Enerre.

Kronens Flige butte. Frugten glat. Stgl. opret, jevn, trind, meget grenet. Bl. 8hobede, elliptiske, butte, obdele, jevne, nedenunder ujevne og blaaflige; Bl. ved Blst. modsatte. Toppen i Enden af Stgl.; Blstiff. haarformige. 1—3 F. 4. Jul. 3 Kratføve. F. D. T. 609.

2 U. *G. læve Thuill. G. pusillum Engl. Bot.* Jevn Enerre Br.

Kronens Flige spidse, uden Stak. Frugten jevn, glat. Stgl. udbredt, opstigende ell. nedliggende, jevn, glat. Bl. 8hobede, ligebred = lancetformige, obdele, glatte, de nederste næsten omvendt ægformige. Skjermen i Enden af Stgl., 3deelt. $\frac{1}{4}$ F. 4. Jul. Paa Enge. F. D. T. 1866.

3 N. G. Bocconi *Allioni*. G. silvestre *Leyser*. Krat = Snerre.

Kronens Flige spidse, uden Stak. Frugten jevn, glat. Stgl. opstigende, 4kantet, nedentil duunhaarede. Bld. 6—8hobede, lancetformige, noget jevne, oddede; de nederste noget bredere, duunhaarede. Skjermene tredeelte. $\frac{1}{4}$ —1 F. 4. Jul. 3 Krat. F. D. T.

4 N. G. Mollugo. Bredbladet Snerre.

Kronens Flige tilspidsede. Frugten glat, jevn. Stgl. flap, 4kantet, ovenfor Leddene tykkere, med udflaaende Grene. Bld. 8hobede, aflang = lancetformige, oddede, udspilede, i Randen ruc. Toppen meget grenet. 2—3 F. Jun., Jul. Ved Gjerder og i Kratstove. Ved Sorøe. F. D. T. 455.

5 N. G. uliginosum. Sump = Snerre.

Kronens Flige spidse. Frugten glat, lidt vortet. Stgl. svag, næsten opret, langs Kanterne ruc. Bld. 6hobede, ligebred = lancetformige, sædvanl. i Randen og paa Ribben stintandede og piggede, med tilbagevendte Pigge, braadede, stive. Blstf. sædvanlig i Enden, tredeelte. $\frac{1}{4}$ —1 F. 4. Jul., Aug. 3 Sump. Ved Sorøe, f. Kr. i Søestoven. F. D. T. 1509.

6 N. G. palustre. Kjør = Snerre.

Kronens Flige ægformige, uden Stak. Frugten jevn, glat. Stgl. udbredt, 4kantet, temmelig jevn. Bld. 4—6hobede, omvendt ægformige, ulige store, glatte, de øverste lancetformige. Blstf. i Enden, tredeelte. $\frac{1}{4}$ —1 F. 4. Jul., Aug. Paa vaade Enge. Ved Sorøe, f. Kr. paa Slommen. F. D. T. 423.

7 N. G. hercynicum *Weigel*. G. saxatile *Mönch*. Lyng = Snerre.

Frugten 2knoppet, vortet. Stgl. nedliggende, glat. Bld. 4—6hobede, lancetformige, spids-oddede, glatte. Blstf. i Bladhjørnerne, korte, 5—6blomstrede. 1—4 Lomm. 4. Jun., Jul. Paa Lyngheider. F. D. T. 1633.

B. Frugten stivhaaret. 4. Blst. i Qvaster ell. Toppe, 2kjonmede, sædvanlig hvide.

8 N. G. boreale. Trenervet Snerre.

Stgl. opret, rank, 4kantet, temmelig glat. Bld. 4hobede, ligebred = lancetformige, 3nervede, glatte. Blstf. i Bladhjørnerne, tredeelte, længere end Bld., danne en Top. Blstbld. omvendt ægformig-kredsformige. $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul., Aug. Paa Enge. F. D. T. 1024.

C. 4. Blst. alle 2kjonmede, gule, i en Top. Bld. 6—10hobede.

9 N. G. verum. Gul Snerre.

Frugten sædvanlig glat. Stgl. sædvanlig opret og enkelt, 4kantet. Bld. 8hobede, ligebrede, furede, lidt tilbagebøjede, jevne. Toppen i Enden. Smaasilkene samlede, bladede, omtrent af Blomsternes Længde. 1—2 F. 4. Jun., Jul. Ved Beje og Gjerder. Ved Sorøe. F. D. T. 1146.

Ufart: pallidum. Blst. hvidgule.

D. Blst. deels Hænbst., deels tvækjønnede, gule.

10 *U. G. Cruciata Scopoli. Valantia Cruciata Linn. Saadden Valantie.*

Frugten glat. Stgl. opret, nedentil sædvanlig grenet, oventil enkelt, haaret. Bl. 4hobede, elliptisk = aflange ell. ægformige, stvhaarede, 3nervede. Blstik. hvæshaarede, grenede. Blstbl. 2, aflange, randhaarede. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Maj, Jun. Ved Gjerder. F. D. T.

E. ○. Blst. oftest tvækjønnede, hvide ell. guulagtig-hvide. Stgl. ru. Bl. 4—8hobede. Blst. i Bladhjørnerne. Frugten 2knoppet. Frøene næsten kugleformige. * Stgl. svag, grenet.

11 *U. G. saccharatum Allioni. Valantia Aparine Linn. Enerve = Valantie.*

Blst. 2kjønnede og Hænbst. Frugten vortet. Bl. 6—7hobede, ligebred = lancetformige, lange Randene rue, med fremad vendte Pigge. Blstik., i Bladhjørnerne, 3—4blomstrede, ved Frugtens Modenhed tilbagebøjede og lige lange med Bl. $\frac{1}{2}$ F. ○. Jul. Mellem Korn. F. D. T.

12 *U. G. Aparine. Burre = Enerve.*

Frugten hvæshaaret med hagede Børster. Stgl. med tilbagevendte Pigge, ved Leddene laaden. Bl. 8hobede, lancetformig = ligebrede; Røden og Randen rue med tilbagevendte Pigge. Blstik. deels enkelte, deels 2grenede, rue. 1—3 F. Jun., Jul. 3 Haver o. s. v. Ved Sorø. F. D. T. 495.

3 Orden.

Valerianæe. Baldrianartede.

Bøgerets Krave forskjellig. Kronen med Rer, næsten tragtformig, sædvanlig 5kløvet. Stødr. befæstede paa Kronens Rer, 1—4. Griff. traadformig. 1, 2 eller 3 Nr. Frøegjemmet tært, ikke opspringende, enten Drummet med 1 eller 2 tomme Rum, eller Drummet. 1 hængende Frø. Hviden 0. Urter. Bl. modsatte. Arelbl. 0. Blst. i Kvaster ell. Halvstjerne.

1 Slægt. Valerianella. Krop.

Bøgerets Krave tandet, vedvarende. Kronen uden Spore, regelmæssig, 5kløvet. Stødr. 3. Urret heelt ell. 3kløvet. Frøegjemmet Drummet, næsten hindeagtigt, med 1 ell. 2 tomme Rum. ○. Stgl. eventl. tvedeelt. Blst. smaae, med Blstbl.

1 *N.* *V. olitoria* *Mönch.* *Valeriana Locusta* var. *olitoria* *Linn.* *Fedia olitoria* *Vahl.*
Feldt = Krop.

Bøgerets Krave næsten 0. Frugten kugleformig = sammentrykt, glat, stæv; de 2 tomme Rum med et ufuldstændigt Skillerum, forenede til eet. Stgl. paa Kanterne ru. Dvafterne hovedformige. Blsbl. udbredte, aflang = ligebrede, randhaaret = savtakkede. Bld. ligebred = aflange, sædvanl. heelrandede. (Blst. blegblaae). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj. Paa hvilende Marker og Diger. F. D. T. 1681.

2 *N.* *V. dentata* *De Cand.* *Valeriana Locusta* var. *dentata* *Linn.*
Fedia dentata *Vahl.* Frøetandet Krop.

Bøgerets Krave stæv affumpet, øreformig, 3—6tandet. Frugten ægformig, glat, temmelig jevn, paa den ene Side flad og stribet, paa den anden hvælvet; de tomme Rum større end det frugtbare. Bld. aflang = ligebrede, heelrandede, de øverste ved Grunden tandede. Blsbl. udbredte, lancetformig = ligebrede, glatte. (Blst. blegt kjødsfarvede). $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jun., Jul. Mellem Waarsæden. F. D. T. 738.

2 Slægt. *Valeriana.* *Baldrian.*

Bøgerets Krave under Blomstringen indrullet, derefter udbredt, bliver til en affaldende Fruk, bestaaende af mange fjerformige Dyrster. Kronens Rør uden Spore. Stovdr. 3. Den modne Frugt krummet, 1frøet. * Kronen but, 5kløvet, ved Grunden puklet. Frugten glat. Stgl. opret, stribet, glat, med modsatte Grene. Blst. i en Quast, hvide.

1 *N.* *V. dioica.* Tveboe = *Baldrian.*

Blst. tveboe; (Hunblst. mindre end Hanblst.). Arrets Flige næsten sammengroede. Frugterne ægformige. Glat. Rodbl. stilkede, spadeformig = ægformige, ubeelte. Stglbl. finnet = deelte med lancetformige, butte Flige. $\frac{1}{2}$ —1 F. 24. Maj, Jun. Paa vaade Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 687.

2 *N.* *V. officinalis.* Læge = *Baldrian.*

Temmelig glat. Bld. sædvanlig alle finned. Smaaabl. 13—17, lancetformige, savtakkede. Dvaften tilfids topformig. 3—4 F. 24. Jun. I Enge, ved Grøfter og Aær ic. Ved Sorøe. F. D. T. 570.

4 Orden.

Dipsaceæ. *Sammenhobede.*

Kronen sædvanlig lidt uligebannet, 4—5kløvet. Stovdr. 4, sædvanlig aldeles adskilte. Griff. traadformig. Arret enkelt. Frøegjemmet tørt, ikke opspringende, krummet, 1frøet. Frøet hængende. Hviden kjedet. Embryonet lige. Bld. modsatte. Arrelbl. 0.

Blst. sammenhobede, med fælles Frugtbund og Bæger. Hver Blst. omgivet med et særregt ydre Bæger. * Det fælles Bæg. mangebladet.

1 Slægt. Dipsacus. Kardebolle.

Frugtbunden med tilspidsede, næsten bladagtige Avner. Det fælles Bæger længere end Avnerne. Det ydre egne Bæg. 4kantet, 8furet. Kronen 4fløvet. ♂. Oprette. Blomsterhovederne paa Enden af Stgl. * Det ydre egne Bæger furet lige ud til Enden. Stgl. smaa pigget.

1 U. D. silvestris. Almindelig Kardebolle.

Det fælles Bægers Smaaabl. noget flappe, længere end det aflange Blomsterhoved. Avnernes rette, ligebred = lancetformige, børsteformige, bøjelige. Bld. ægformig = lancetformige, næsten tilspidsede, tandede. (Blst. lysrøde). 3—5 F. ♂. Jul. Ved Beje og paa høje, hvilende Marker. F. D. T. 965.

2 U. D. pilosus. Haaret Kardebolle.

Det fælles Bægers Smaaabl. nedadbojede, kortere end det fugleformige Blomsterhoved, og neppe længere end de ligebred = spidsformige, haarede Avner. Stgl. glat. Piggene under Blomsterhovedet haarformige. Bld. glatte, firkede, ægformige, tandede, med Drev ved Enden af Bldst. (Blst. hvide). 3—6 F. ♂. Aug. Ved Gjerder. F. D. T. 1448.

2 Slægt. Knautia. Knautie.

Avner 0. Frugtbunden stivhaaret. Det ydre egne Bæg. sammentrykt, tæt omgivende Frugten, i Enden smaa tandet, med 2 større Tænder, forsynet med en kort Stilk. Bæg. uden Fnek. Kronen 4—5fløvet. Oprette grenede Urter. * Det fælles Bæg. udbredt, mangeblomsret. Bæg. 8—10spidset.

1 U. K. arvensis Coulter. Scabiosa arvensis Linn. Almindelig Skabiose.

Det fæll. Bægers Smaaabl. lidt butte. Stgl. stivhaaret. Bld. fiddende, laaden = stivhaarede. Rodbld. ulige halvfinne; Fligene lancetformige. Stglbld. halvfinne, med ligebrede Flige, de øverste ligebred = lancetformige. (Blst. lys = violette, fiednere hvide). 1—2 F. Jun., Jul. Paa Marker. Ved Sorø. F. D. T. 447.

3 Slægt. Scabiosa. Skabiose.

Frugtbunden avnet. Bægerets Krave nedentil rørformig, eventl. endende sig i 1—5 Børster. Kronen 4—5fløvet. 2 ell. h.

1 N. S. columbaria. Due = Skabiose.

Blst. straalformige, 5kløvede, (blaaagtige). Blsthovedet ved Modenheden ægformig = kugleformigt. Frøekronen kortere end Røret, 20nervet; Børsterne dobbelt saa lange som Frøekronen. Stgl. grenet, temmel. glat. Rødbld. ægformige, butte, silkede, rundtakkede, hindeagtige, paa begge Sider duunhaarede. Stglbld. temmel. glatte, finnet=deelte; Fligene flade, næsten heelrandede. Blstst. forlængede, duunhaarede. 1 F. 4. Sul. Paa tørre Steder. F. D. T. 314.

2 N. S. Succisa. Afbidt Skabiose.

Det fæll. Bagers Smaabld. i 2—3 Rader. Kronerne ligedannede, 4kløvede, (blaae). Det ydre egne Bæg. Afantet. Frøekronen meget kort, bølget; Børsterne korte, sammensøjede. Roden afbidt. Rødbld. ægformig = lancetformige, spidse i begge Ender, heelrandede. Stglbld. sammengroede, næsten heelrandede. Blsthovederne silkede. 1 F. 4. Aug.—Oct. Paa Enge. Ved Sorø. F. D. T. 279.

5 Orden.

Compositæ. Sammensatte.

Vægerets Krave undertiden utydelig, ofte forandret til en Snok. Kronen nedentil rørformig. Støvdr. 5, paa Kronen; Stifterne sædvanlig frie; Støvknapperne Drummede, opspringende paa langs indad, sammenvorne til et Rør, med en hindeagtig Forlængelse. Griff. 1. 2 Nr, undertiden sammenvorne. Frøet 1, tilsyneladende nøgent, opret. Hviden 0. Embryonet lige. Arelbl. 0. Blst. sammensatte, med fæll. Frugtbund og sædvanl. med fæll. Væg.

1 Affnit.

Cichoraceæ. Tungeformede.

Alle Blst. Kjenneede, frugtbare. Alle Kronerne Hæbede, tungeformede, sædvanl. i Epidsfen Standede. Stængelens og Bladenes Saft melkagtig. * Urter. Bl. afværende, sædvanl. siddende, enkelte. Det fælles Væg. sædvanl. fleerbladet. Den sammensatte Blst. ovenpaa næsten flad. Smaaablst. sædvanlig i flere Rader inden for hinanden, og de yderste størst. Blst. sædvanlig gule.

I. Snokken haarformig.

1 Slægt. Crepis. Høgeffjæg.

Det fælles Væg. omgivet med et andet Væg. Frugt bunden nøgen ell. lidt stivhaaret. Snokken siddende. * Stgl. opret, furet, bladet. Bl. sædvanlig høvlformige. Blst. i en opret, halvskjermformig, Top.

1 N. C. tectorum. Lag = Høgeffjæg.

Det fæll. Væg. graalig = duunhaaret. Frøene røe, furede. Stgl. kantet, temmelig glat, graalig. De nederste Bl. lancetformige, sædvanl. bugtet = tandede og høvlformige; de øverste pillformige = ligebrede. (Griff. i Enden brunagtig). $\frac{1}{2}$ —2 F. ☉. Jul.—Sept. Paa Diger og Agre. Ved Sorø. F. D. T. 501.

2 N. C. biennis. Toaarig Høgeffjæg.

Det fæll. Væg. blødpigget, duunhaaret. Frøene glatte. Stgl. og Bl. noget hvashaarede. De nederste Bl. høvlformig = halvfinneede, de øverste lancetformige, tandede. 1—3 F. J. Jun., Jul. Paa Diger og ved Beje. Paa Galgebakken norden for Pedersborg. F. D. T.

2 Slægt. *Hieracium*. Høgeurt.

Det fæll. Bæg. mangebladet, med smalle Bægerbl., taglagt. Frugtbunden nøgen, prikket. Snokken siddende. * 2. Bl. temmelig seje, uden Pigge.

A. Med eenblomstret Skaft.

1 N. *H. Pilosella*. Haarig Høgeurt.

De yderste Smaakroner paa Underfladen rødagtige. (Blst. ellers svovlgule). Krybende Sideskud. Bl. aflange, butte, heelrandede, nedenunder filtede, ovenpaa haarede. Skaflet sliinhaaret. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. 2. Jun., Jul. Ved Veje. Ved Sorø. F. D. T. 1110.

B. Med fleerblomstret Skaft.

2 N. *H. præmorsum*. Afbidt Høgeurt.

Skaflet højt, duunhaaret. Halskjermerne sammensat. Bl. aflange, heelrandede eller lidt tandede, lidt laadne. 1—2 F. 2. Maj, Jun. Paa Enge. F. D. T. 942.

3 N. *H. Auricula*. Lancetbladet Høgeurt.

Det fæll. Bæg. fortagtigt, lidt hvashaaret. Sideskuddene korte. Skaflet faa= (2—3=) blomstret, (rødagtigt), forthaaret. Rodbl. lancetformige, heelrandede, spidsse, haarede. $\frac{1}{2}$ —1 F. 2. Maj—Jul. Paa Diger og tørre Bakker. I Sjortenæs. Ved Vejen fra Pedersborg til Sorø. F. D. T. 1111.

4 N. *H. dubium*. Tvetydig Høgeurt.

D. fæll. Bæg. fortagtigt, sliinhaaret. Krybende, haarede Sideskud. Skaflet glat, sædvanlig 4blomstret. Bl. næsten spadeformige, butte, heelrandede, temmel. glatte, lidt blaagraae, randhaarede. 1 F. 2. Jul. Paa tørre Steder. F. D. T. 1044.

C. Med bladet Stgl.

5 N. *H. murorum*. Muur = Høgeurt.

D. fæll. Bæg. sliinhaaret. Stgl. faabladet. Bl. egformig = aflange, oddet = tandede, sliinhaarede ell. temmel. glatte; Lænderne ved Grunden de længste. Rodbl. stilkede. Blst. næsten i en Halskjerme. 2 F. 2. Jul., Aug. Ved Steengjærder og i Skove. F. D. T.

6 N. *H. cymosum*. Dvaftblomstret Høgeurt.

D. fæll. Bæg. dobbelt haaret. Stgl. forthaaret, faabladet. Bl. næsten spadeformig = lancetformige, lange, lidt tandede, forthaarede. Blst. (smaa) i en skjermformig, udbredt Dvaft. $1\frac{1}{2}$ —3 F. 2. Jul., Aug. Paa tørre Steder. F. D. T. 810?

7 *U. H. aurantiacum.* Pommerantsfarvet Høgeurt.

D. fæll. Bæg. og den øverste Deel af Stgl. besat med fortagtige, korte Haar. Krydende Sideskud. Bld. aflang = lancetformige, smaa tandede, stivhaarede. Blst. i en Halvsfjerm, (mørk = pommerantsgule). 1—2 F. 4. Jul., Aug. Ved Haver. F. D. T. 1112.

8 *U. H. vulgatum Fries.* Almindelig Høgeurt.

D. fæll. Bæg. tæt taglagt, duunhaaret. Stgl. opret, oventil duunhaaret. Bld. aflang = lancetformige, smallere ved begge Ender, med store, fremad vendte Tænder, temmel. glatte. Blst. næsten i en Halvsfjerm. 2 F. 4. Jul., Aug. I Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 1113.

9 *U. H. boreale Fries.* Nordlig Høgeurt.

D. fæll. Bæg. tæt taglagt. Stgl. nedentil enkelt, oventil stærk = grenet. Bld. alle fiddende, lancetformige, tilspidsede, ovenpaa glatte, nedenunder rue; de nederste med fremad vendte Tænder, de øverste heelrandede. Blst. i Toppe, som fide paa Grenene. 2—3 F. 4. Jul., Aug. I Skove. F. D. T. 872.

10 *U. H. paludosum.* Kjær = Høgeurt.

D. fæll. Bæg. fortagtigt, hvasthaaret. Stgl. enkelt, glat. Bld. glatte, de nederste omvendt ægformig = aflange, høvlformige; de øverste omfattende, med tilbage vendte Tænder. Blst. i en Top, ell. næsten i en Halvsfjerm. Blstbld. randhaarede. 2—3 F. 4. Jul., Aug. I sumpige Skove. F. D. T. 928.

11 *U. H. umbellatum.* Smalbladet Høgeurt.

D. fæll. Bægers Skjæl udspærrede. St. Stgl. opret, enkelt. Bld. ligebred = lancetformige, sædvanl. tandede. Blst. i en Skjerm ell. Halvsfjerm. 2 F. 4. Aug., Sept. I Skove og Krat. Ved Saverup. F. D. T. 680.

3 Slægt. *Sonchus.* Svinemelk.

D. fæll. Bæg. taglagt, nedentil buget; Bægerbld. noget brede, i Randen næsten stivhinde. Frugtbunden nøgen. Gnokken fiddende. * Bld. sfjære, glatte, omfattende, næsten høvlformige, tandede; Tænderne ende sig i smaae Pigge.

1 *U. S. oleraceus.* Almindelig Svinemelk.

D. fæll. Bæg. jævnt. Frøene ujevne, næsten valseformige. Bld. deels lireformig = høvlformige, deels udeelte. Blst. i en Dvaak. Blstst. skjællede, i den yngre Alder filtede. 2—3 F. ☉. Jun.—Aug. I Haver. Ved Sorøe. F. D. T. 682.

Ufart: β) lævis. Bld. blaagraae.

γ) asper. Bld. krusede, stive. F. D. T. 843.

2 *U. S. palustris.* Kjør = Evinemelk.

D. fæll. Bæg. hjertlet = hvashaaret. Frøene kantede, glatte. Roden krybende. Bld. øret-
pilsformige, høvlformige. Blst. i en Halvsfjerm. Blstst. hjertlet = hvashaarede. 4—10 F. 2. Aug.
3 Moser og ved Aær. Ved Parnas. F. D. T. 1109.

3 *U. S. arvensis.* Uger = Evinemelk.

D. fæll. Bæg. pigget = hvashaaret. Frøene kantede, glatte. Roden krybende. Stgl. trind,
oventil hjertlet = haaret. Bld. hjerteformige, de nederste bugtet = høvlformige, de øverste lancetformige. Blst.
næsten i en Halvsfjerm (fløre, stærkt gule). Blstst. hjertlet = hvashaarede. 2—3 F. 2. Aug. Paa Ugre
og ved Gærder. Ved Sorøe. F. D. T. 606. (Maadelig).

4 Slægt. *Borkhausia.* Borkhausie.

Det fæll. Bæg. omgivet med et andet Bæg. Frugtbunden nøgen. Fnocken stillet.

1 *U. B. foetida Link.* *Crepis foetida Linn.* Stinkende Høgefjæg.

D. fæll. Bæg. hjertlet = haaret. Stgl. opret, stivhaaret. Bld. høvlformig = halvfinde, graa-
lige, stivhaarede. Blstst. oventil tykkere, hjertlet = haarede. 2 F. 3. Jun., Jul. Paa Ugre. F. D. T.

5 Slægt. *Prenanthes.* Hængeblomst.

Det fæll. Bæg. enkelt, valsfemigt, med Skjæl nedentil. Smaaablst. i en enkelt Kreds
(sædvanl. 5). Frugtbunden nøgen. Fnocken stillet.

1 *U. P. muralis.* Almindelig Hængeblomst.

Stgl. oventil grenet. Bld. lireformige, glatte, nedenunder lidt blaagraae; Fligene lidt ad-
stille; Endestigen spydformig = muursteerformig, spids, kantet = tandet. Blst. i en Top. 2—3 F. 2. Jul.
Ved Mure og i Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 509.

6 Slægt. *Chondrilla.* Chondrille.

Det fæll. Bæg. enkelt, 4deelt, med Skjæl nedentil. Frugtbunden nøgen. Fnocken
stillet, haarig og avnet. * Smaaablst. i en enkelt Kreds (omtrent 8—12).

1 *U. C. juncea.* Glat Chondrille.

D. fæll. Bæg. valsfemigt, temmel. glat. Stgl. nedentil haaret. Grenene rissagtige, mar-
vede. Rodbld. høvlformige, lidt hvashaarede. De øverste Bld. ligebred = lancetformige, lidt tandede eller
hestrandede, glatte. 2 F. 2. Jul., Aug. Paa sandige Marker. F. D. T. 1652.

7 Slægt. *Leontodon*. Løvetand.

Det fæll. Bæg. omgivet med et andet Bæg. Frugtbunden nøgen. Fnokken stillet.
* Bld. næsten glatte. Eenblomstrede, trinde, hule Skafter.

1 U. *L. Taraxacum*. Almindelig Løvetand.

Det ydre Bæg. tilbagebøjet; Skjællene lancetformige, tilspidsede. D. fæll. Bægers Skjæl
puklede nedenfor Spidsen. Bld. sædvanl. høvlformige, tandede, lidt haarede; Fligene 3kantede, $\frac{1}{2}$ —1 F.
* U. Apr.—Aug. I Haver, paa Enge, paa Diger o. s. fr. Ved Sorøe. F. D. T. 574.

Ufart: *subintegrifolium*. Bld. næsten heelrandede.

2 U. *L. obliquus Fries*. Skjæv Løvetand.

Det ydre Bægers Skjæl aflange, oprette, slappe. Bld. fannede ell. halvannede. Smaa bld.
ell. Fligene næsten ligebrede, seglformige, adskilte. Skafterne opstigende. $\frac{1}{4}$ F. U. Jul. Paa Græs-
marker. F. D. T. 1935.

3 U. *L. salinus Pollin*. *L. palustris Smith*. Kjør = Løvetand.

Det ydre Bægers Skjæl oprette, ægformige, spids. Skaftet glat. Bld. spadeformig = lancet-
formige ell. ligebred = lancetformige, med tilbage vendte Lænder, glatte. $\frac{1}{2}$ —1 F. U. Jul. Paa
Enge. F. D. T. 1708.

8 Slægt. *Lactuca*. Laktuf.

Det fæll. Bæg. taglagt, kogleformigt; Skjællene noget brede, i Randen stivhindede.
Frugtbunden nøgen. Fnokken stillet. Stgl. bladet, fleerblomstret.

1 U. *L. Scariola*. Tornbladet Laktuf.

Bld. omfattende, næsten lodrette, pilsformig = hjertesformige, høvlformig = bugtede, smaatandede,
nedenunder blødpiggede paa Ribben, de øverste lancetformige, nedenunder jevne. Blst. i en Top. $1\frac{1}{2}$ —2 F.
O. Aug. Ved Beje. F. D. T. 1227.

II. Fnokken fjeret.

9 Slægt. *Tragopogon*. Sedeshjæg.

Det fæll. Bæg. mangebeelt ell. mangebladet. Frugtbunden nøgen. Fnokken stillet.
* Glatte. Stgl. opret, trind. Bld. lancetformig = ligebrede, omfattende, heelrandede. Blst.
eenlige, oprette.

1 *U. T. pratensis.* Eng = Gedesfjæg.

Randkronerne (gule) af det fæll. Bagers Længde. Blisfisk, trinde. 2—3 F. J. Jul. Paa Enge og ved Gjærder. Ved Sorøe. F. D. T. 906.

2 *U. T. porrifolius.* Porrebladet Gedesfjæg.

Randkronerne (violet=røde) kortere end det fæll. Bæg. Blisfisk, oventil tykkere. 3—5 F. J. Jun. Ved Byer. F. D. T. 797.

10 Slægt. *Picris.* Bittermælk.

Det fæll. Bæg. omgivet med et andet Bæg. Frugtbunden nøgen. Fnokken siddende. Frøene firede paa Tværs.

1 *U. P. hieracioïdes.* Heelbladet Bittermælk.

Det ydre Bæg. flapt, udbredt. Hvashaaret, med frogformige Haar. Bld. aflang = lancetformige, tandede. Blst. i en Halvsfjerm. 2—3 F. 4. Aug. Ved Gjærder. Ved Sorøe (?) F. D. T. 1522.

Ann. Den ligner temmelig meget *Crepis biennis*.

11 Slægt. *Apargia.* Borst.

Det fæll. Bæg. taglagt. Frugtbunden haaret, prikket. Fnokken siddende. * Skafterne 1= ell. faablemstrede, undertiden med nogle faa Blade ell. Skjel.

1 *U. A. autumnalis Hofmann.* *Leontodon autumnale Linn.* Almindelig Borst.

Det fæll. Bæg. finhaaret. Skafstet grenet, oventil skjælet. Bld. lancetformige, tandet = halvfinne, temmel. glatte. 6—8 Somm. 4. Aug., Sept. Paa hvilende Marker. Ved Sorøe. F. D. T.

Ufart: *asperior.* Det fæll. Bæg. fortz og stivhaaret. Ved Pedersborg.

2 *U. A. hispida Willd.* *Leontodon hispidum Linn.* Stivhaaret Borst.

Det fæll. Bæg. forthaaret. Smaafrøerne i Munden haarede og i Spidsen fjertede. Skafstet blomstret, temmel. glat. Bld. aflange, tandede, rue, med kløvede Haar. $\frac{1}{2}$ —1 F. Jul., Aug. Paa Enge og i Arat. Ved Saverup; paa en Bakke norden for Pedersborg; i Bulbroe = Skoven. F. D. T. 862.

3 *U. A. Taraxaci Willd.* *Hieracium Taraxaci Linn.* Glatbladet Borst.

Det fæll. Bæg. haaret. Skafstet oventil tykkere, 1—2 blomstret, haaret. Bld. spadeformige, med tilbage vendte Tænder, glatte. 6—8 Somm. 4. Aug. Paa Bjerger. F. D. T.

12 Slægt. *Thrinicia*. *Thrinicie*.

Det fæll. Bæg. temmelig enkelt, mangedeelt, med Skjæl nedentil. Frugtbunden hulret. Fnokken paa de yderste Frøe kort, avneagtig, paa de inderste fjeret.

1 U. *T. hirta* Roth. *Leontodon hirtum* Linn. *Apargia hirta* Scopoli. Laaden Dorst.

D. fæll. Bæg. glat. Smaafronerne nedenunder mørkfarvede. Skaftet opstigende, glat. Bld. næsten spadeformig = lancetformige, tilbagevendt = tandede, lidt stivhaarede; Haarene adspredte, kløvede. $\frac{1}{2}$ —1 F. 2. Jul., Aug. Paa hvilende Marker. F. D. T. 1827.

Anm. Den ligner meget *Apargia hispida*, men har mindre Blst.

13 Slægt. *Scorzonera*. *Skorzonere*.

Det fæll. Bæg. taglagt, med noget brede Skjæl. Frugtbunden næsten nøgen. Fnokken siddende ell. stilket.

1 U. *S. humilis*. Lav Skorzonere.

D. fæll. Bæg. uldet. Stgl. enkelt, sædvanl. blomstret. Rodbld. stilkede, aflang = lancetformige, nerveede, ved Grunden sædvanl. uldede. Stglbld. ligebrede. $\frac{1}{2}$ —1 F. 2. Maj. Paa Enge. Paa Galgebakken norden for Pedersborg. F. D. T. 816.

Ufart: *angustifolia*. Rodbld. ligebred = lancetformige. F. D. T. 1653.

2 U. *S. laciniata*. Fliget Skorzonere.

D. fæll. Bæg. glat, omtrent af Smaafronerne's Længde; Skjællene med en Braad nedenfor Spidsen. Stgl. grenet, lidt ru. De nederste Bld. halvsfinne, ligebrede, de øverste udeelte. $\frac{1}{2}$ —1 F. 3. Jul. Paa Enge. F. D. T.

14 Slægt. *Hypochaeris*. Kongepen.

D. fæll. Bæg. taglagt. Frugtbunden avnet. Fnokken siddende ell. stilket. * Stgl. med 0 ell. faa Bld. Blst. eenlige, oprette.

1 U. *H. radicata*. Ru Kongepen.

D. fæll. Bægers Skjæl paa Kjølen piggede. Fnokken stilket. Stgl. grenet, næsten bladløs, glat. Bld. næsten hovedformige, butte, temmelig stivhaarede. Blstst. skjælede. 1—1 $\frac{1}{2}$ F. 2. Jul., Aug. Paa Enge og ved Gjerder. Ved Sorøe. F. D. T. 150.

2 *H. glabra.* Glat Kongepen.

D. fæll. Bæg. glat. Fnoffen silket. Stgl. sædvanl. grenet, næsten bladløs. Bld. aflange, butte, bugtet-tandede. Blstik. uden Skjæl. $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jul., Aug. Paa hvilende Agre. F. D. T. 424.

3 *H. maculata.* Plettet Kongepen.

D. fæll. Bæg. sivhaaret. Fnoffen ikkun paa Frosene i Midten silket. Stgl. rauf, næsten nøgen, faablomstret, haaret. Rodbld. aflange, tandede, laadne. Blstik. oventil tykkere. 1—1 $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul. Paa høje Enge. F. D. T. 149.

III. Fnoffen avneagtig eller børstet.

15 Slægt. *Cichorium.* Cichorie.

D. fæll. Bæg. omgivet med et andet Bæg. Frugtbunden avnet. Fnoffen avneagtig.

1 *C. Intybus.* Almindelig Cichorie.

Smaafrønerne i en enkelt Kreds (omtrent 12—20, blaae, hvide ell. rødlig). Ru. Rodbld. høvlformige; de øverste Bld. hjerteformige. Blst. sædvanl. parrede, siddende. 2—3 F. ☉. Jul., Aug. Ved Veje, Ved Sorøe. F. D. T. 907.

IV. Fnoffen 0.

16 Slægt. *Lapsana.* Haremad.

D. fæll. Bæg. enkelt, med Skjæl nedentil. Frugtbunden nøgen.

1 *L. communis.* Almindelig Haremad.

D. fæll. Bæg. sædvanl. glat. Stgl. grenet. De nederste Bld. lireformig=høvlformige, de øverste ægformige, tandede. Blst. i en Top. 2—3 F. ☉. Jun., Jul. I haver. Ved Sorøe. F. D. T. 500.

2 *L. pusilla Willden.* *Hyoseris minima Linn.* Almindelig Svinesøjle.

D. fæll. Bæg. glat, ægformig=kugleformigt. Skæftet faablomstret; Smaaafstikene i Enden fjelleformig=opblæste. Bld. spadeformig=aflange, med fremad vendte Tænder. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul., Aug. Paa tørre Marker. F. D. T. 201.

2 *Affnit.*

Carduaceæ. Hovedblomstrede.

Smaafrønerne rørformige, sædvanlig alle tvæjennede. Griff. oventil tykkere, haarede. Frugtbunden haaret, avnet ell. celled. Stgl. uden mæktigt Skæft. * Det fæll. Bæg. sædvanl. buget, taglagt. Blst. sædvanl. rødlig. Stgl. opret. Bld. afverlende.

I. Fnoffen fjeret. * Etgl. stiv. Vld. i Randen piggede.

1 Slægt. *Cirsium*. Bladhoved.

Det fæll. Bøgers Skjæl piggede. Frugtstanden børstet. Fnoffen siddende.

A. Vld. nedløbende.

1 N. *C. lanceolatum Scopoli*. *Cardus lanceolatus Linn.* Lancetbladet Tidfel.

D. fæll. Bøgers Skjæl duunhaarede, lancetformige, udstaaende. Vld. meget stivhaarede, fife, halvfinne; Fligene 2klove, udspilede, piggede. (Blst. rød-violette). 2-3 F. J. Jun.-Sept. Ved Beje. Ved Sorø. F. D. T. 1173.

2 N. *C. palustre Scopoli*. *Cardus palustris Linn.* Kær = Tidfel.

D. fæll. Bøgers Skjæl ægformig-lancetformige, oddede, tiltrykte. Vld. lancetformige, halvfinne, temmel. glatte, pigget-tandede. Blst. i en Klasse, nøgleformig sammenhobede, (violet-røde, undertiden hvide). 3-5 F. J. Jul., Aug. I Lørvemoser. Ved Sorø. F. D. T.

B. Vld. ikke nedløbende.

3 N. *C. heterophyllum Allioni*. *Cardus heterophyllus Linn.* Forskjelligbladet Tidfel.

D. fæll. Bøg. glat; Skjællene lancetformige, tiltrykte, oddede. Vld. omfattende, hjerteformige, lancetformige, savtakkede, nedeunder filtede, de nederste indstaaende halvfinne. (Blst. mørk-violet-røde). 2-3 F. 4. Jul., Aug. I Skove. F. D. T. 109.

4 N. *C. arvensis Lamarck*. *Serratula arvensis Linn.* *Cardus arvensis Curtis*.
Ager = Tidfel.

D. fæll. Bøg. næsten valsformigt, temmel. glat; Skjællene tiltrykte, oddede. Etgl. oventil grenet. Vld. lancetformige, tildeels halvfinne, tandede, hølgede, temmel. glatte, læderagtige. (Blst. lys-violet-røde). 1½-2 F. 4. Jul., Aug. Paa Ager. Ved Sorø. F. D. T. 644.

5 N. *C. acaule Allioni*. *Cardus acaulis Linn.* Kortstænglet Tidfel.

D. fæll. Bøgers Skjæl glatte, lancetformige, tiltrykte, næsten uden Pigge. Etgl. eenblomsret, sædvanl. meget kort. Rodtbl. halvfinne, paa begge Sider grønne; Fligene udspilede, tandede. (Blst. violet-røde). 1-6 L. 4. Aug., Sept. Paa høje Enge. I Hjortenæs. F. D. T. 1114. 1884.

6 N. *C. oleraceum Allioni*. *Cnicus oleraceus Linn.* *Cardus oleraceus Hornem*.
Hjertebladet Tidfel.

D. fæll. Bøgers Skjæl lancetformige, piggede. Vld. omfattende, halvfinne, temm. glatte, randhaaret-savtakkede. Blst. næsten i en Klasse, omgivne med Svøb. Svøbtbl. ægformig-lancetformige,

farvede, takkede, randhaarede. (Blst. og Svøb guulagtig = hvide). 3—5 F. **U.** Jul.—Sept. Paa Enge og ved Grøfter. Ved Sorøe. **F. D. T.** 860.

2 Slægt. *Carlina*. *Carlina*.

D. fæll. Bøgers ydre Skjæl piggede i Randen, de indre forlængede, stivhinde, farvede. Frugtbunden cellet, arnet = børstet. Fnokken siddende, omgivet med korte Børster.

1 *U. C. vulgaris*. Almindelig *Carlina*.

De yderste Bøgerskjæl halvfinne, med brune Pigge, de inderste ligebrede, hvidgule. Stgl. nedentil enkelt, i Toppen grenet. Blb. aflange, bugtet = tandede, nedenunder lidt oddede. Blst. næsten i en Halvsfjerm, med et bladagtigt Svøb, (rødlig = hvide). $\frac{1}{2}$ —1 F. **J.** Jul., Aug. Paa tørre Bakker. Paa Bakken ved Lille Ladegaard. **F. D. T.** 1174.

II. Fnokken haarformig, siddende. Alle Smaablst. tvæsfjonne. * Stgl. stiv.

3 Slægt. *Carduus*. *Lidsel*.

D. fæll. Bøgers Skjæl piggede. Frugtbunden børstet. Fnokken samlet affaldende. * Blb. i Randen piggede, bugtede, nedløbende. Blst. rødlig = violette.

1 *U. C. nutans*. Nikkende *Lidsel*.

D. fæll. Bøg. fugleformigt, ved Grunden laadent; Skjællene farvede, udstaaende. Blb. bugtet = halvfinne, paa begge Sider stivhaarede. Blststf. fildede, eenblomstrede, lødende, (mærk = violett = røde). 2—3 F. **J.** Jul., Aug. **J** Skove. **F. D. T.** 675.

2 *U. C. acanthoides*. Laadstillet *Lidsel*.

D. fæll. Bøg. fugleformigt = ægformigt; Skjællene ligebrede, udstaaende. Blb. lancetformige, bugtet = halvfinne. Grenene stivhaarede, piggede. Blststf. sædvanlig eenblomstrede. 2—5 F. **○.** Jun., Jul. Paa Diger, i Haber o. s. v. Ved Sorøe. **F. D. T.** 1141.

3 *U. C. crispus*. Kruset *Lidsel*.

D. fæll. Bøg. næsten fugleformigt; Skjællene sylformige, lidt rynkede, udstaaende. Blb. aflange, grenet = bugtede, nedenunder hvid = uldhaarede. Blst. paa Enden af Stgl., stikede, sammenhøbede. 2—3 F. **○.** Jul., Aug. Paa Diger og ved Gærder. **J** Pedersborg. **F. D. T.** 621.

4 *U. C. tenuiflorus Curtis*. Lyndblomstret *Lidsel*.

D. fæll. Bøg. næsten valseformigt, glat, næsten siddende; Skjællene lancetformige, oprette. Blb. aflange, bugtede, paa begge Sider hvidgraae, nedenunder uldhaarede. Blststf. sammenhøbede. 2 F. (?) **○.** Jul. **J** Sumpe. **F. D. T.**

4 Slægt. *Onopordon*. Vælfoder.

D. fæll. Vægers Skjæl piggede. Frugtbunden celled. Fnokken børsteformig-haarformig, samlet affaldende. Frøene kantede, sribede.

1 U. O. *Acanthium*. Almindelig Vælfoder.

D. fæll. Vægers Skjæl hvidgraae, udspilede, stærkt piggede. Stgl. grenet, uldet. Bl. nedløbende, hvidgraa = siltede, bugtet = tandede, piggede. (Blst. violet = røde). 4—5 F. ♂. Jul., Aug. Paa sandige Diger, meest ved Byer. F. D. T. 909.

5 Slægt. *Arctium*. Burre.

D. fæll. Vægers Skjæl hagede. Frugtbunden celled. Fnokken med korte, fine, snoede Haar. Stgl. grenet, furet. Bl. hjerteformige, butte, stilkede, ovenpaa jevne, nedenunder uldhaarede. Blst. i en Top, sædvanlig violet = røde. ♂.

1 U. A. *Lappa*. Almindelig Burre.

D. fæll. Bæg. glat; Skjællene omtrent af Kronernes længde. Bl. lidt tandede. 2—3 F. ♂. Jun.—Aug. Ved Veje, i Haver ic. Ved Sorøe. F. D. T.

Ufart: minor. Af mindre Vært.

2 U. A. *Bardana Willd.* A. *Lappa* β *Linn.* Uldhaaret Burre.

D. fæll. Bæg. næsten kugleformigt; Skjællene uldhaarede (ell. ligesom overtrukne med Spindelhvæv), kortere end Kronerne. Bl. næsten heelrandede. 2—3 F. ♂. Jul.—Aug. Ved Veje, i Haver ic. Ved Sorøe. F. D. T. 642.

Ufart: minor. Af mindre Vært.

6 Slægt. *Serratula*. Skjær.

D. fæll. Vægers Skjæl uden Pigge. Frugtbunden børstet. Fnokken haarformig-børsteformig, vedvarende.

1 U. S. *tinctoria*. Enge = Skjær.

D. fæll. Bæg. ægformigt; Skjællene lancetformige, spidse, tiltrykt = oprette. Bl. glatte, aflange, dels udeelte, dels fligede, dels halvfinnede, skarpt savtaktede. Blst. i en Halvskjerm paa Enden af Stgl. (Vægerskjællene mørkebrune. Kronerne violet = mørkerøde). 1—2 F. ♀. Jul., Aug. I Krat og paa Enge. F. D. T. 281.

III. Gnoffen avneagtig.

7 Slægt. *Silybum*. Sølvblad.

D. fæll. Bøgers Skjæl piggede, udspilede, nedentil ørede. Frugtbunden adnet = børstet. Gnoffen samlet affaldende, avneagtig, randhaaret.

1 U. *S. Marianum*. Marie = Tidsef.

D. fæll. Bæg. opret; Skjællene i Randen piggede. Bld. omfattende, spydformig = halvsinnede, hvidplettede, i Randen piggede. (Blst. violet = røde). 3—5 F. ☉. Aug. 3 Haver. F. D. T.

IV. Gnoffen 0.

8 Slægt. *Echinops*. Tidsefugle.

D. fæll. Bæg. 0. Frugtbunden kugleformig, børstet. Smaaafst. omgivne med et avneagtigt, ydre eget Bæg. Frøene hvasshaarede.

1 U. *E. sphærocephalus*. Fligbladet Tidsefugle.

D. ydre Bæg. randhaaret. Stgl. grenet. Bld. halvsinnede, ovenpaa duunhaarede, nedenunder uldhaarede; Fligene lancetformige, i Randen piggede. Blomsterhovederne kugleformige, stilkede. (Blst. og Bæg. blaaagtige. Kronerne blaae). 2—3 F. 4. Jul. Paa Marker. F. D. T.

V. De yderste Smaaafst. uden Befrugtningsdele. Gnoffen haarformig, fiddende.

* Stgl. og Bld. uden Pigge.

9 Slægt. *Centaurea*. Knopurt.

D. fæll. Bæg. buget, taglagt. Randkronerne omtrent tragtformige, gylde. Frugtbunden børstet. * Bøgerskjællene uden Pigge. Randkronerne længere end Skivekronerne. Stgl. kantet ell. furet, grenet. Blst. eenlige, paa Enden af Stgl. og Grenene, temmel. langstilkede, øprette.

1 U. *C. Jacea*. Almindelig Knopurt.

D. fæll. Bøgers Skjæl stivhinede, lasede. Grenene kantede, eenblomstrede. Bld. sædvanlig duunhaarede. Rødbld. aflange, tandede; Stgl. lancetformige, heelrandede. (Bæg. lys-graabrunt. Blst. sædvanl. lys-violette). 1—2 F. 4. Jul., Aug. Ved Gærder. Ved Sorø. F. D. T. 519.

2 U. *C. Scabiosa*. Skabiosartet Knopurt.

D. fæll. Bøgers Skjæl egformige, duunhaarede, i Randen brune, randhaarede. Randkronernes Flige lange og smalle. Bld. halvsinnede, rue; Fligene lancetformige, indstaaren = tandede. (Blst. mørk-violet-røde). 2—3 F. 4. Jul., Aug. Ved Beje og Gærder. Ved Sorø. F. D. T. 1231.

3 U. C. Cyanus. Blaa Knopurt.

D. fæll. Bæg. ægformigt; Skjællene lancetformige, i Randen fortagtige, savtakkede. Randkronerne store, med brede Flige (sædvanl. blaae. Stivekronerne sædvanl. mørk-violette). Grenene eensblomstrede. De nederste Bld. ofte ved Grunden tandede ell. halvfinnede, de øvrige ligebrede, heelrandede, nedenunder sædvanlig uldhaarede, uden Nerver. 1—1½ F. O. Jun., Jul. I Winterforret. Ved Sorøe. F. D. T. 993.

4 U. C. phrygia. Haarbægret Knopurt.

D. fæll. Bægers Skjel i Enden finnede, med haarformige, tilbagebøjede Flige, lysbrune. Bld. halvomsfattende, ægformig=afslange, stort tandede, sivhaarede. (Blst. violet=røde). 1½—2 F. U. Jul., Aug. I Kratfove. F. D. T. 520.

3 U f f n i t.

Corymbiferæ. Kamilleartede.

Det fæll. Bæg. sædvanlig halvugleformigt ell. valseformigt. Frugtbunden sædvanl. negen, undertiden avnet. De inderste Kroner rørformige, omtrent af det fæll. Bægers Længde, sædvanlig gule, de yderste ofte tungedannede. Griff. traadformig, glat. Stgl. uden melkagtig Saft.

I. Alle Smaablst. tvæfjennede og frugtbare. Kronerne alle rørformige. (Sjeldnere straalblomstrede, med gølge Randblst.). * Bld. modsatte.

1 Slægt. Eupatorium. Hjortetrost.

Det fæll. Bæg. taglagt. Frugtbunden nøgen. Griff. meget lang. Fnokken haarformig. (Blst. røde).

1 U. E. cannabinum. Hampagtig Hjortetrost.

D. fæll. Bæg. 4—5blomstret, neppe taglagt. Stgl. opret, lidt sivhaaret. Bld. firkede, 3- ell. 5deelte, lidt sivhaarede; Fligene lancetformige, savtakkede. Blst. i en Halvskjerm (lys-violet=røde). 2—4 F. U. Jul, Aug. Ved Naer og Grøfter. Ved Sorøe. F. D. T. 745.

2 Slægt. Bidens. Brønsef.

Det fæll. Bæg. mangedeelt, sædvanl. farvet, omgivet med et andet Bæg. (Randblst. undertiden tungedannede, gølge). Frugtbunden avnet. Fnokken bestaaer af (2, 3, 4) Stak med tilbage vendte Pigge. * Det fæll. Bæg. brunagtigt. Stgl. opret, grenet. O. Blst. omgivne med et Svøb, som er længere end det fæll. Bæg., gule.

1 *U. B. cernua*. Niffende Brønjel.

Blst. undertiden med Straalblst. Bl. lancetformige, sædvanl. sammengroede, fjernt takkede, glatte. Blst. sædvanl. niffende. 1—2 F. ☉. Aug., Sept. Ved Vand. Ved Sorøe. F. D. T. 841.

Art: β) radiata. Med Straalblomster.

γ) minima. Med oprette Blst. 2 Lomm. F. D. T. 312.

2 *U. B. tripartita*. Tredeelt Brønjel.

Blst. altid fivedannede, oprette. Bl. 3deelte, lancetformige, indskaaen = takkede, ovenpaa glatte, nedenunder lidt haarede. (Hele Planten har en mørkere Farve end den foregaaende). 1—2 F. ☉. Aug., Sept. Ved Vand. Ved Sorøe. F. D. T.

Art: pumila. Stgl. eenblomstret.

II. Smaaflst. i Randen ere Sunblst., ikke længere end de tvæjennede. * Stglbl. afværende ell. 0.

3 Slægt. *Tussilago*. Hestehov.

Det fæll. Væger taglagt, af Smaaflomsternes Længde; Skjællene ikke stivhinde. (Blst. undertiden straalede). Frugtunden nogen. Fnocken haaret. Urter med Skaf eller ikkun nedentil bladet Stgl. * Skafet enkelt, skjællat. Bl. næsten hjerteformige, stilkede.

1 *U. T. Farfara*. Almindelig Hestehov.

Blst. straalede (gule). Straalblst. ligebrede, meget smalle. Skafet eenblomstret. Bl. kantede, tandede, nedenunder duunhaarede; de komme frem efter Blst. $\frac{1}{2}$ —1 F. 2. Marts, April. Paa leret Grund. Ved Sorøe. F. D. T. 595.

2 *U. T. alba*. Hvid Hestehov.

Blst. fivedannede (hvide). Bl. hjerteformig = kredsformige, bugtede, skarpt tandede, nedenunder hvidstilkede. Blomsterbuskens Grene lige høje, fleurblomstrede. 1 F. 2. April. Paa fugtige, levede Steder. Ved Sorøe. (Jeg har endnu ikke fundet den der). F. D. T. 524.

3 *U. T. Petasites*. Storbladet Hestehov.

Blst. fivedannede (kjødfarvede). Bl. elliptisk = hjerteformige, ulige smaatandede (meget store), nedenunder graastilkede; Grundlapperne nær ved hinanden. Blomsterklafen ægformig; Smaaflkene sædvanlig udeelte. 1—2 F. 2. Apr., Maj. Paa fugtige Steder. Ved Sorøe paa en Eng mellem Byen og Søen; ved Lyng. F. D. T. 842.

4 N. *T. spuria* Retz. Hvidbladet Hestehov.

Blst. stivedannede (røde). Bld. spydformig = hjerteformige, ulige smaatandede, nedenunder sneehvid = siltede; Grundlapperne udspilede, ofte 2kløvede. Blomsterduften aflag, med 1 blomstredes Smaa-silke. 1 F. 24. Maj. Paa Klinten. F. D. T. 1828.

4 Slægt. *Gnaphalium*. Evighedsblomst.

Det fæll. Væg. taglagt; de inderste Skjæl stivhinde (ligne ofte Kronblade). Frugt-bunden nøgen, prikket. Randkronerne utydelige. Fnokken haarformig. * Urter. Stgl. bladet, fleerblomstret. Bld. siddende, omtrent lancetformige, heelrandede, sædvanl. uldhaarede.

A. Det fæll. Væg. guult.

1 N. *G. luteo - album*. Guulhvid Evighedsblomst.

Bld. halvomsfattende, uldhaarede; de nederste spadeformige, butte, lidt rundbugtede, de øverste lancetformige. Blst. i Enden af Stgl. i nøgleformige Kvaster. De nederste Grene opstigende. (Det fæll. Væg. bleggult. Kronerne guulagtige). 1 F. C. Jul., Aug. Paa fugtige Steder. F. D. T. 1763.

2 N. *G. arenarium*. Guul Evighedsblomst.

D. fæll. Væg. næsten kugleformigt (citrongult, sjældnere offergult); Skjællene udstaende, butte. Bld. halvomsfattende, hviduldede, de nederste spadeformige, de øverste ligebred = lancetformige. Blomstertoppen halvskjermformig. (Kronerne lys = pommerantegule). 1 F. J. Jul. Paa tørre, sandige Marker. Ved Munkeshjergbye, Bromme, Lyng ic. F. D. T. 641.

B. Det fæll. Væg. hvidt eller rødt.

3 N. *G. dioecum*. Tveboe = Evighedsblomst.

Blst. tveboe. Det fæll. Vægers Skjæl butte. Krybende Sideskud. Rodbld. spadeformige, uldhaarede. Stglbld. ligebred = lancetformige. Stgl. ganske enkelt. Halvskjermen sammentrængt. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ F. 24. Jun., Jul. Paa tørre Bakker. Ved Pedersborg. F. D. T. 1228.

C. Det fæll. Væg. graaligt.

4 N. *G. silvaticum*. Skov = Evighedsblomst.

D. fæll. Vægers Skjæl i Randen sortebrune. Bld. lidt uldhaarede; de nederste lancetformige, de øverste ligebrede. Stgl. enkelt, bladet, opret. Blst. siddende, i de øverste Bladhjørner, danne samlede et Kr. (Kronerne smaae, hvidagtige). $\frac{1}{2}$ —1 F. 24. Aug. Paa fugtige Steder og i Skove. Ved Sorø. F. D. T. 1229.

5. U. *G. uliginosum*. Sump = Evighedsblomst.

D. fæll. Bøgers Skjæl lidt spidse. Stgl. med udbredte Grene, uldhaaret. Bld. ligebrede, lidt butte, fiddende, paa begge Sider uldhaarede. Blst. nøgleformig sammenhøvede i Bladhjørnerne og i Enden af Stgl. (Bøgerfjællene guulagtig = glindsende. Kronerne graaagtige). $\frac{1}{2}$ F. ☉. Aug., Sept. Paa fugtige Steder. F. D. T. 859.

6 U. *G. germanicum* *Smith*. *Filago germanica* *Linn*. Lydst Evighedsblomst.

Stgl. opret, lidt grenet. Bld. lancetformige, bølgede, lidt butte, udstaende, næsten fittede. Blst. i fugleformige Hoveder i Bladhjørnerne og i Enden af Stgl. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. ☉. Aug. Paa tørre, sandige Bakker. Ved Jæverup. F. D. T. 997.

7 U. *G. arvense* *Willd*. *Filago arvensis* *Linn*. Ager = Evighedsblomst.

D. fæll. Bæg. fittet; Skjællene lancetformige, randhaarede. Stgl. fra neden af grenet, uldhaaret. Bld. ligebred = lancetformige, uldhaarede. Blst. tæt samlede, deels paa Siderne, deels paa Enden af Stgl. (Kronerne gule). $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jul. Paa tørre, sandige Marker. Ved Pedersborg. F. D. T. 1275.

8 U. *G. montanum* *Willd*. *Filago montana* *Linn*. Bjerg = Evighedsblomst.

D. fæll. Bæg. pyramideformigt. Stgl. sædvanlig i Toppen tvedeelt, tæt uldhaaret. Bld. ligebred = lancetformige, tiltrykte, tæt uldhaarede. Blst. sædvanlig tæt samlede, deels i Bladhjørnerne, deels i Enden af Stgl. (Kronerne guulagtige). $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul. Paa tørre, sandige Bakker. Ved Pedersborg. F. D. T. 1276.

5 Slægt. *Tanacetum*. Rejnsfan.

Det fæll. Bæg. taglagt, halvfugleformigt. Randblomsterne småe, 3kløvede. Frugt-bunden nogen. Snokken en smal Rand.

1 U. *T. vulgare*. Almindelig Rejnsfan.

Bld. dobbelt halvfinne, glatte; Fligene næsten lancetformige, indstaende = sabtakkede. Halvfjermen i Enden af Stgl., sammensat. (Blst. gule). 2—3 F. 4. Jul.—Sept. Ved Sjærdar ic. Ved Sorøe. F. D. T. 871.

6 Slægt. *Artemisia*. Dyrnke.

Det fæll. Bæg. taglagt. Randblomsterne hylformige, udeelte. Frugt-bunden nogen ell. sieldnere uldet. Snok O. * Duunhaarede, uldhaarede ell. fittede. Stgl. kantet ell. furet. Bld. kløftede. Blst. i Klaser ell. Ur.

1 *A. vulgaris*. Graa Bynke.

D. fæll. Bæg. valseformig = ægformigt, filtet. Bl. nedenunder filtede; Rodbl. dobbelt halvfinne, Stglbl. halvfinne; Fligene lancetformige, næsten tandede; Bl. ved Blst. ligebred = lancetformige. Blomstertoppen udbredt, bladet. Blst. siddende, oprette. (Kronerne guulagtige). 2—3 F. 24. Aug. Ved Veje og Gårder. Ved Sorø. F. D. T. 1176.

2 *A. campestris*. Mark = Bynke.

D. fæll. Bæg. ægformigt. Stgl. opstigende, grenet. Rodbl. dobbelt finne, graaagtig filkehaarede. Stglbl. finne, traadformige, glatte. Klaserne samlede til en Top. Blst. filkede, nikkende. (Kronerne rødagtige). 1 F. Aug. Paa tørre Marker. Ved Pedersborg. I Bromme = Plantage. F. D. T. 1175.

3 *A. maritima*. Strand = Bynke.

D. fæll. Bæg. ægformig = aflangt. Hvidagtig filtet. Stglbl. finne, ligebrede. Klaserne samlede til en Top, næsten oprette. Blst. meget kortfilkede, lundene. 1 F. 24. Aug.—Sept. Ved Strandkanter. F. D. T. 1655.

Ufart: erecta. Klaserne ganske oprette.

4 *A. Absinthium*. Malurt = Bynke.

D. fæll. Bæg. halvugleformigt. Frugtstanden uldet. Bl. graaagtig filkehaarede; Rodbl. næsten finne ell. dobbelt halvfinne; Stglbl. dobbelt halvfinne ell. halvfinne, med aflang = lancetformige, butte Flige; de øverste udeelte. Klaserne i Bladhjørnerne. Blst. nikkende (gule). 2—3 F. 24. Aug. Ved Byer. F. D. T. 1654.

7 Slægt. *Cotula*. Fjirkløft.

Det fæll. Bæg. taglagt (halvugleformigt). Hvidbl. sædvanlig 3kløvede, de tvækkjønede Blst. 4kløvede. Frugtstanden nøgen. Inok 0.

1 *A. C. coronopifolia*. Frenliggende Fjirkløft.

Glat. Bl. ligebred = lancetformige, ved Grunden savtakke ell. halvfinne, omskedende. Grenene blomstrede. (Blst. gule). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. Jun., Jul. Ved Strandkanter paa Syltøng. F. D. T. 341.

- * *Conyza squarrosa*. See 8 Slægt.
- Cineraria campestris*. See 14 Slægt.
- Senecio vulgaris*. See 15 Slægt.

III. Straalblomstrede. Alle Smaablomsterne frugtbare; i Straalen Sunblst., i Skiven tværfjonne. Frukten haarformig. * Bld. sædvanlig afverlende.

8 Slægt. *Conyza*. Drekløst.

Det fæll. Bæg. taglagt. Randkronerne 3kløvede, næsten 2løbede. Frugt bunden nøgen.

1 N. *C. squarrosa*. Grenet Drekløst.

D. fæll. Bæg. udsperret. Lidt laaden. Stgl. opret, kantet. De nederste Bld. stilkede, ægformig = aflange, savtakfede; de øverste siddende, aflang = lancetformige, heelrande. Halvsfjermene sammensatte, i Enden af Stgl. 2-3 F. J. Jul., Aug. Paa tørre Steder. F. D. T. 622.

9 Slægt. *Erigeron*. Bakkestjerne.

Det fæll. Bæg. taglagt. Frugt bunden nøgen. Randkronerne tungedannede, meget smalle. * Haarede. Stgl. opret, stribet. Bld. omtrent lancetformige.

1 N. *E. heterophyllus Willd.* *Aster annuus Linn.* Navig Aster.

D. fæll. Bæg. halvfugleformigt, haaret. Bld. lidt haarede; Rødbld. stilkede, ægformig = aflange, indskaaren = savtakfede; Stgl. lancetformige, siddende, paa Midten tandede. Halvsfjermen ovenpaa flad. (Randkronerne meget lysblaae ell. hvide). 1-2 F. O. Jul., Aug. Som vild omkring Haver. Sunden paa Slommen af Student Toft. F. D. T. 486.

2 N. *E. acris*. Bitter Bakkestjerne.

Laaden. Bld. lancetformige, heelrandede; de øverste siddende. Halvsfjermen enkelt, paa Enden af Stgl. (Randkronerne lys = violet = blaae). $\frac{1}{2}$ -1 F. J. Jul., Aug. Paa tørre Bakker. Ved Sorøe. F. D. T. En Afart: T. 874.

10 Slægt. *Inula*. Mant.

Det fæll. Bæg. taglagt, med udsperrede Skjæl. Frugt bunden nøgen. Støvknapperne med 2 Børster nedentil. * Blst. gule. 2. Bld. udeelte.

1 N. *I. salicina*. Pilebladet Mant.

Stgl. glat, faablomstret. Bld. omfattende, temmel. glatte, lancetformige, noget fve, i Randen sinitakfede = rue og næsten tilbagebøjede. De nederste Blst. længere end de øverste. 1-1 $\frac{1}{2}$ F. 2. Aug. Ved Strandfanter. F. D. T. 786.

2 *U.* *I. britannica.* Britanniſk Mant.

D. fæll. Bøgers Skjæl lancetformige. Straalblomſterne lange. Stgl. opret, uldhaaret. Bld. omfattende, hjerteformig = lancetformige, ſpidſe, flade, hjertlet = ſmaatandede, nedenunder ſædvanl. uldhaarede. Blſt. i en Halvſtjerm. 1 *F.* 2. Jul., Aug. Ved Strandbredder. *F. D. T.* 413.

3 *U.* *I. dysenterica.* Blodgangſtillende Mant.

D. fæll. Bøgers Skjæl ligebrede. Straalblſt. temmel. lange. Fknoffen dobbelt. Stgl. ud-
breedt, uldhaaret. Bld. omfattende, hjerteformig = aflange, bølgede, tandede, nedenunder uldhaarede. Blſt. i en Halvſtjerm. 1—2 *F.* 2. Aug., Sept. Ved Strandkanter. *F. D. T.* 410.

4 *U.* *I. Helenium.* Almindelig Mant.

D. fæll. Bøgers Skjæl ægformige, bladagtige. Stgl. opret, laaden. Bld. omfattende, ægformig-
aflange, tandede, rynkede, nedenunder ſittede. Blſt. i en Halvſtjerm. 3—5 *F.* 2. Jul., Aug. Paa
Enger ved Landsbyer. *F. D. T.* 728.

11 Slægt. *Pulicaria.* Løppeurt.

Det fæll. Bæg. taglagt. Frugt bunden nøgen. Fknoffen dobbelt; den yderſte eenbladet,
den inderſte haarformig.

1 *U.* *P. inuloides Vahl.* *Inula Pulicaria Linn.* Løppe = Mant.

Straalblſt. meget korte. Stgl. opret, grenet, kantet, haaret. Bld. omfattende, aflange, bøl-
gede, ſiinhaarede. Blſtſtk. eenblomſtede. Blſt. gule. $\frac{1}{2}$ *F.* 0. Sept., Oct. Ved Bredden af Damme.
F. D. T. 613.

12 Slægt. *Aster.* Aſter.

Det fæll. Bæg. taglagt, de nederſte Skjæl ſædvanl. udſtaaende. Randkronerne af anden
Farve end Skiven (blaae, røde ell. hvide). Frugt bunden næſten nøgen.

1 *U.* *A. Tripolium.* Strand = Aſter.

D. fæll. Bøgers Skjæl butte, opret = tiltrykte. Blat. Stgl. ſædvanl. grenet. Bld. ligebred-
lancetformige, kjøbede, trenerveede, mod Spidsen tandede. Blſt. i en Halvſtjerm. (Randkronerne violetagtig=
blaae). 1—1 $\frac{1}{2}$ *F.* 2. Aug., Sept. Ved Strandkanterne. *F. D. T.* 615.

13 Slægt. *Solidago.* Gyldenruiſ.

Det fæll. Bæg. taglagt. Randkronerne af Skivens Farve (gule). Frugt bunden nøgen.

1 *U. S. Virgaurea.* Almindelig Gylbenriis.

Randfrønerne lange. Stgl. trind, opret, sædvanl. oventil duunhaaret og grenet. Bl. aflange lancetformige, spidse i begge Ender, savtakkede; (de øverste undertiden heelrandede); de nederste sædvanl. lidt haarede. Blomstertoppen opret, næsten ægformig, bestaaende af mange tætte, stillede Klaser. 1—2 F. 4. Aug., Sept. Imellem Krat, især paa Bakker. Ved Sorøe. F. D. T. 663.

14 Slægt. *Cineraria.* Jnokurt.

Det fæll. Bæg. enkelt, mangedeelt. Frugtbunden nøgen. * Det fæll. Bæg. valsefermigt. Blst. gule. 4. Stgl. opret, enkelt, furet, uldhaaret. Bl. omtrent lancetformige.

1 *U. C. campestris* Retz. Mark-Jnokurt.

Bl. mestendeels heelrandede; Rodbl. omvendt ægformig = elliptiske, tilsløbende i en Stilk; Stglbl. lancetformige. Blst. i en Halvsfjerm paa Enden af Stgl. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Maj, Jun. Paa Kribtbakker. F. D. T. 1177.

2 *U. C. palustris.* Almindelig Jnokurt.

Bl. bred = lancetformige, spidse, halvomsfattende, bugtet tandede, laadne. Blst. i Halvsfjerm paa Enden af Stgl. og i Bladhjørnerne. 1—1 $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun., Jul. I Moser. I Søefkoven. F. D. T. 573.

15 Slægt. *Senecio.* Brandbæger.

Det fæll. Bæg. sædvanl. omgivet med et andet Bæg., nogle af Skjællene med en mørk Plet (ligeform brændte) i Spidsen. Frugtbunden nøgen. * Stgl. opret. Blst. gule.

A. Straalblomstrede. Randfrønerne udstaaende. Bl. udeelte, lancetformige, spidstakkede. 4.

1 *U. S. saracenicus.* Kiilbladet Brandbæger.

D. fæll. Bæg. duunhaaret. Bl. sædvanl. fiddende, lange, spidse til begge Ender, smaat savtakkede; Takterne vendte fremad. Stgl. vinget. Halvsfjermene samlede til en Top. Blst. duunhaarede. 3—5 F. 4. Jul., Aug. Paa Bakker. F. D. T.

2 *U. S. paludosus.* Rjær-Brandbæger.

D. fæll. Bæg. temmelig glat. Stgl. uldhaaret. Bl. halvomsfattende, tilspidsede, nedenunder lidt uldhaarede. Halvsfjermen sammensat, i Enden af Stgl. 3—5 F. 4. I Lørvemose. F. D. T. 385.

B. Straalblomstrede. Randfrønerne udstaaende. Bl. fløstede. Blst. i en Halvsfjerm, paa Enden af Stgl. 4.

3 U. *S. aquaticus*. Vand = Brandbæger.

Randkronerne flore. Frugtknuderne glatte. Bl. glatte. Rødbld. omvendt ægformig = aflange, udeelte, tilløbende i en Stilk; Stglbl. ligeformige. Halvfjermens Grene ranke, 1—1½ F. 4. Jul., Aug. Paa fugtige Steder. F. D. T. 784.

4 U. *S. Jacobæa*. Eng = Brandbæger.

Frugtknuderne duunhaarede. Temmelig glat. Bl. lireformig = halvfinne; Fligene lancetformige, udspilede, indskæren = tandede. 1—2 F. Jul., Aug. Paa Enge, i Krat og ved Veje. Ved Sorø. F. D. T. 944.

5 U. *S. erucifolius*. Hørn. Plant. Haarig Brandbæger.

D. fæll. Bæg. og Blst. hvidfillede. Bl. halvfinne, tandede, lidt stivhaarede. 2—3 F. 4. Aug. Paa Diger. F. D. T. 1875.

C. Straalblomstrede. Randkronerne tilbagerullede. Bl. halvfinne. Blst. danne næsten en Halvfjerm. ☉.

6 U. *S. silvaticus*. Skov = Brandbæger.

D. ydre Bæg. meget kort. Lidt haaret. Stgl. temmelig enkelt. Bladenes Flige lancetformige, smaatandede. 2—3 F. ☉. Jul., Aug. Ved Skove. F. D. T. 869. En Afart T. 791?

7 U. *S. viscosus*. Klæbrig Brandbæger.

D. ydre Bæg. slapt, næsten af det indres Længde. Klæbrig = duunhaaret. Stgl. noget grenet. Bladenes Flige lancetformige, bugtet = tandede. 2—3 F. ☉. Jul. — Octbr. Paa sandige Steder. F. D. T. 1230.

D. Skiveblomstrede.

8 U. *S. vulgaris*. Almindelig Brandbæger.

Bæg. næsten valseformigt. Bl. omfattende, halvfinne, glatte; Fligene butte, tandede. Blst. i en halvfjermformig Top. ½—1 F. ☉. Marts—Nov. 3 Haver. F. D. T. 513.

16 Slægt. *Arnica*. Volverlej.

Det fæll. Bæg. mangebladet, dobbelt. Frugtbunden besat med Haar eller fjerfermige Børster. Straalblst. have adskillte, ufuldkomne Støvdragere. Gnøkken ru.

1 U. *A. montana*. Bjerg = Volverlej.

Duunhaaret. Stgl. opret, 1—3blomstret. Bl. aflange, butte, nerveede. Stglbl. modsatte, jædvant. kun 1 Par. (Blst. mørkgule). 1—1½ F. 4. Jul., Aug. Paa Bakker. F. D. T. 63.

* *Tussilago Farfara*. See 3 Slægt.

IV. *Straalblomstrede*. Alle Smaablst. frugtbare, i Straalen Hvinblst., i Skiven tvefjennede. Fnoffen utydelig eller 0. * Stglbl. afværende, eller sjeldnere 0. Bl. sædvanlig kløstede. Randkronerne sædvanlig hvide.

17 Slægt. *Bellis*. Tusendfryd.

Det fæll. Væg. temmelig sladt, næsten taglagt; Skjællene ikke stivhinde. Frugtbunden nogen, kogleformig. Bl. udeelte.

1 U. *B. perennis*. Almindelig Tusendfryd.

Genblomstret Skaf. Bl. spadeformige, rundtakkede, lidt stivhaarede. (Randkronerne hvide, nedenunder rødlig). 2—3 Lomm. 4. Paa Fælleder, ved Veje ic. Ved Sorø. F. D. T. 503.

Ufart: *substulosa*. Randkronerne rørformige, heelrandede, røde. Paa Ridebanen ved Sorø Akademie. F. D. T.

18 Slægt. *Matricaria*. Munkefrone.

Det fæll. Væg. næsten sladt, taglagt; Skjællene stivhinde. Frugtbunden kogleformig, nogen.

1 U. *M. Chamomilla*. Kamille = Munkefrone.

D. fæll. Vægers Skjel butte. Bl. dobbelt finned; Smaabl. ligebred = traadformige, butte, med en Braad, glatte. 1 F. Jun., Jul. Ved Veje, paa Græsmarker og i Korn. F. D. T. 1764.

19 Slægt. *Chrysanthemum*. Drosje.

Det fæll. Væg. halvkugleformigt, taglagt; Skjællene stivhinde i Randen. Fno 0. Frugtbunden slad, nogen. * Stgl. sædvanl. grenet. Stglbl. omtrent aflange, omfattende. Blst. eenlige, eprette.

1 U. *C. Leucanthemum*. Hvidblomstret Drosje.

Randkronerne hvide. Bl. rundtakkede ell. savtakkede, temmel. glatte; de nederste ombendt ægformige, næsten spadeformige, de øverste lancetformige. 1—2 F. 4. Jun., Jul. Ved Veje og paa hvilede Marker. Ved Sorø. F. D. T. 994.

2 U. *C. segetum*. Korn = Dyrøje.

Randkronerne gule. Bld. aflang = lancetformige, i Enden bredere, indskårne, tandede, blålige, glatte. 1—2 F. ☉. Sun., Jul. I Baarkornet. Ved Sorøe. F. D. T. 995.

20 Slægt. *Pyrethrum*. Matrem.

Det fæll. Væg. halvkugleformigt, taglagt; Skjællene i Randen stivhinde. Frugtstanden flad, nøgen. Fnoffen en hindeagtig Rand. * Randkronerne hvide.

1 U. *P. Parthenium*. Have = Matrem.

Randkronerne ikke længere end Stivens Brede. Stgl. opret, grenet. Bld. sædvanlig dobbelt halvfinne, temmel. glatte; Fligene aflange, noget butte, tandede. Blststf. fve, danne en Halvfjerm. 1—2 F. 4. Sun., Jul. Ved Diger og Weje. F. D. T. 674.

2 U. *P. inodorum*. Lugtløs Matrem.

Frøekronen sædvanlig hectrandet. Stgl. aaben = grenet. Bld. fiddende, dobbelt finne; Smaabld. traadformig = mangedelte. 1 F. ☉. Jul., Aug. I Græsmarker. Ved Sorøe. F. D. T. 696.

Ufart: *maritimum*. *Matricaria maritima* *Lin.* Bld. mere fjødede. Ved Strandkanter. F. D. T. 1936.

21 Slægt. *Anthemis*. Kamille.

Det fæll. Væg. halvkugleformigt, taglagt; Skjællene i Randen stivhinde. Frugtstanden avnet. Randkronerne mange (over 10). * Randkronerne omtrent aflange. Stgl. grenet. Bld. dobbelt finne ell. dobbelt halvfinne. Blst. eenlige.

A. Randkronerne hvide. Frugtstanden kugleformig.

1 U. *A. arvensis*. Uger = Kamille.

Kvorne lancetformige, spidse, fjødede, fremragende. Frøene kronede. Bld. dobbelt halvfinne, duunhaarede. ☉. 1. 1—1 F. Sun., Jul. Paa hvilende Marker og ved Weje. Ved Sorøe. F. D. T. 1178.

Ufart: *procumbens*. Stgl. nedliggende. F. D. T. 685.

2 U. *A. Cotula*. Gaase = Kamille.

Kvorne børsteformige, kortere end Smaabld. Frøene uden Krone. Bld. dobbelt finne, lidt laadne. Fligene sylformige, 3delte. ☉. 1 F. Sun., Jul. Paa hvilende Marker og ved Weje. F. D. T. 1179.

B. Randkronerne gule.

3 U. A. tinctoria. Farver = Kamille.

Frøene kronede. Stgl. opret. Bld. dobbelt halvfinne-ede, graaagtige, duunhaarede. 1—1½ F. 4. Jul., Aug. Paa høje Steder. F. D. T. 741.

22 Slægt. Achillea. Kællike.

Det fæll. Væg. sædvanl. ægformigt, taglagt. Frugtbunden avnet. Randkronerne sædvanlig faa (4—12), omvendt hjerteformig-kredscunde. * Randkronerne sædvanlig hvide. Stgl. opret. Blst. i en Halvsfjerm.

1 U. A. Ptarmica. Nyse = Kællike.

Randkronerne 7—10. Kværne udeelte. Frøene uden Krone. Lemmel. glat. Bld. ligebred-lancetformige, lige og skarpt savtaktede. Halvsfjermen i Enden, enkelt. 1—1½ F. 4. Jul., Aug. Ved Græfter og paa Enge. Ved Vindebroehuset. F. D. T. 643.

2 U. A. Millefolium. Almindelig Kællike.

Randkronerne omtrent 5. Lemmel. glat ell. duunhaaret. Bld. dobbelt finne-ede; Fligene ligebrede, savtaktede. Halvsfjermen sammensat. 1—2 F. 4. Jul., Aug. Paa Enge og ved Gjærder. Ved Sorø. F. D. T. 737. En rød Afart T. 1937.

3 U. A. magna. Stor Kællike.

Bld. 3dobbelt halvfinne-ede, duunhaarede; Fligene fileformig-lancetformige, tilspidsede, de nederstes Dreftige 4kantede. (Blst. hvide). Halvsfjermen topdannet. 2—3 F. 4. Aug., Sept. . . . F. D. T.

V. Straalblomstrede. Skiveblst. ere Hænbst., Randblst. frugtbare Hænbst.

23 Slægt. Calendula. Morgenfrue.

Det fæll. Væg. mangebladet eller mangebeelt. Frugtbunden nøgen. Frø 0. Frøene uligedannede, tildeels krumme, med en pigget Rand.

1 U. C. officinalis. Læge = Morgenfrue.

Lidt stivhaaret. Stgl. opret, grenet, kantet. Bld. afvejlende, omvendt ægformige, halvomsfattende, bugtet-tandede. Blst. eenlige (brandgule). ½—1 F. ☉. Jul., Aug. Ved Haver og paa Kirkegaard (ikke oprindelig indenlandst). F. D. T.

2 *U. C. arvensis.* Uger = Morgenfrue.

Frøene baadformige, piggede, de yderste lancetformig = sølformige. Bld. hjerteformig = lancetformige, tilspidsede. (Blst. gule). $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. ☉. Jun.—Aug. Paa Ugre. F. D. T.

VI. Sanblst. og Sunblst. paa forskjellige Frugtbunde.

24 Slægt. *Xanthium.* Braadfroe.

Sanblst. Det fæll. Bæg. sædvanl. Bladet, mangeblemfret. Frugtbunden børstet. Kronen (det særegne Bæg.) rørformig, standet. 1 Støvdr. med 4—5 Støvnapper. Sunblst. Det fæll. Bæg. Bladet, 1—2blemfret. Kronen 0. 2 sammenvorne, piggede Steenfrugter. Griff. 2kløvet.

1 *U. X. Strumarium.* Almindelig Braadfroe.

Bld. hjerteformige, lappede, tandede, ved Grunden 3nervede. (Blst. grønne). 1—2 F. ☉. Aug., Sept. Ved Byer. F. D. T. 970.

6 Orden.

Campanulaceæ. Klokkeartede.

Bøgerets Krave sædvanl. 5deelt, vedvarende. Kronen sædvanl. 5kløvet, undertiden 5deelt, næsten 5bladet. Støvdragerne ikke befæstede paa Kronen. Støvnapperne 2rummede, sædvanl. frie. 1 Griff., haaret. Frøegjemmet tæt, fleerrummet, mangefrøet. Frøene paa en Frøestol i Midten, oprette. Hviden kjedet. Urter med mellekagtig Saft. Bld. sædvanlig afveklende, enkelte. Krolbld. 0.

1 Slægt. *Campanula.* Klokke.

Bæg. 5kløvet. Kronen klokkeformig eller hjulformig, uden Kør, 5kløvet. Støvdr. 5; Stifterne nedentil bredere. Urret 3—5kløvet. Kaps. 3—5rummet, opspringende enten ved Huller paa Siderne ell. ved Klapper. * Kronen sædvanl. blaa. Kaps. sædvanl. 3rummet. Krolbld. stilkede.

A. Kronen omtrent klokkeformig. Jagen særstilt Honninggjemme. Kaps. aabner sig ved Huller paa Siderne.

1 *U. C. rotundifolia.* Rundbladet Klokke.

Bøgerfligene sølformige. St. Krolbld. rundagtige, sædvanl. visnede før Blomstringen. Stglbld. ligebrede, heelrandede. Blst. sædvanlig i en saablomstret Top, nikkende. $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jul.—Sept. Paa tørre Marker og Bakker. Ved Sørøe. F. D. T. 1086.

Ufart: *stricta.* Krolbld. aflange. Stglbld. ligebred = børsteformige. F. D. T. 855.

2 *U. C. patula.* Landmærket Klokke.

Bøgerfligene lancetformige, smaaandede, udstaaende. Kronens Flige udstaaende. Ru. Stgl. kantet, enkelt. Rodbl. aflange, butte, rundtakkede; Stglbl. lancetformige. Blomstertoppen meget aaben, med mange smaae sylformige Blstbl. paa Stilkene. 1—2 F. *J.* Jul., Aug. Ved Gjerder og Krat. **F. D. T.** 373.

3 *U. C. Rapunculus.* Rapuntsel = Klokke.

Bøgerfligene sylformige, sædvanl. heelrandede. Kronens Krave opret. Stgl. temmelig trind, enkelt, nedentil duunhaaret. Rodbl. omvendt ægformig = aflange, bølgede, rundtakkede, lidt haarede; de øverste Bl. lancetformige, heelrandede, lidt nedløbende. Blomstertoppen opret, tæt. Blstfl. smaae, 1—2 blomstrede. 2—3 F. *J.* Jul., Aug. Paa Marker og ved Gjerder. **F. D. T.** 1326.

4 *U. C. persicifolia.* Smalbladet Klokke.

Kronen udbredt. Stgl. temmelig trind, enkelt. Bl. ligebred = lancetformige, lange, sædvanl. heelrandede, glindsende; Stglbl. fiddende. Klafen paa Enden af Stgl. 2—3 F. *U.* Jul. *J* Kratter. **F. D. T.** 1087.

Ufart: *acutangula.* Frugtknuderne kantede. **F. D. T.**

5 *U. C. latifolia.* Bredbladet Klokke.

Bøgerfligene fint takkede og randhaarede. Stgl. udeelt, haaret, trind. Bl. ægformig-lancetformige, spidse, sædvanl. fiddende, dobbelt rundtakkede = savtakkede, paa begge Sider duunhaarede. Blst. paa Enden af Stgl. i en Klasse, oprette. 2—4 F. *U.* Jul.—Aug. *J* smaae Skove. Ved Næsbyholm. **F. D. T.** 782. En hvid Ufart **T.** 85.

6 *U. C. rapunculoides.* Ensidet Klokke.

Bøgerfligene tilbagebøjede, heelrandede. Stgl. enkelt, i Enden kantet, ru med nedadvendte Haar. De nederste Bl. næsten hjerteformig = ægformige, ulige savtakkede, meget ruc. Blst. paa Enden af Stgl. i en Klasse, nikkende, vendte til een Side. 1—1½ F. Jul. Ved Gjerder og i haver. Almindelig i haverne ved Sorø. **F. D. T.** 1327.

7 *U. C. Trachelium.* Almindelig Klokke.

Bæg. hvashaaaret. Bøgerfligene lancetformige, lige, meget stibhaarede i Randen. Stgl. kantet, hvashaaaret med nedadvendte Haar. Bl. hvashaaarede, de nederste sædvanlig hjerteformige, silkede, de øverste ægformige, tilløbende i en Stilk. Blstfl. i Bladhjørnerne, sædvanlig 2—3 blomstrede. 2—3 F. *U.* Jul. *J* Krat. Ved Sorø. **F. D. T.** 1026.

Ufarter: *β) parviflora.* De nederste Blstfl. 1 blomstrede, de mellemste 2 blomstrede, de øverste næsten nøgleformige.

γ) uniflora. Blstfl. 1 blomstrede. Bøgerfligene randhaarede.

δ) glabrata. Bøgerfligene glatte.

8 U. *C. glomerata*. Nøgleblomstret Klokke.

Stgl. enkelt, kantet, lidt laaden. Bld. lidt rundtakkede, laadne; Rodbld. hjerteformige, stilkede; Stglbld. aflange, siddende. Blst. i et Hoved, siddende, med Svøb. 1—1½ F. 4. Jul.—Aug. Paa høje, tørre Steder. F. D. T. 1328.

9 U. *C. Cervicaria*. Hjørneblomstret Klokke.

Stgl. enkelt, hvashaaret. Bld. ligebred=lancetformige, bølgede, stivhaarede. Blst. dels i Nøgler i de øverste Bladhjørner, dels i et Hoved. 1—1½ F. Jul., Aug. 3 Krat. F. D. T. 787.

B. Kronen sædvanl. uregelmæssig. Kapselen opspringende i Spidsen.

10 U. *C. hederacea*. Webvende = Klokke.

Kronen næsten regelmæssig (hvidblaa). St. Stgl. tynd, flap. Bld. hjerteformige, femkantede, stilkede. Blstf. lange, i Enden af Stgl. 1—2 L. 4. Aug. Paa tørre Steder. F. D. T. 330.

C. Kronen omtrent hjulformig. Kapselen prismatisk.

11 U. *C. hybrida*. Bastard = Klokke.

Bøgerfligene ægformige, længere end Kronen. St. Stgl. sædvanl. enkelt. Bld. aflange, bølgede, tandede. Blst. siddende. 2—6 L. ☉. Jul., Aug. Imellem Korn. F. D. T.

2 Slægt. *Phyteuma*. Kapuntsjel.

Bæg. 5kløvet. Kronen 5deelt, med ligebrede Flige. Støvd. 5; Stifterne nedentil bredere. Urret 2—3kløvet. Kaps. 2—drummet, aabner sig paa Siderne.

1 U. *P. spicatum*. Urbærende Kapuntsjel.

St. Stgl. rank, furet. De nederste Bld. hjerteformig = aflange, dobbelt savtakkede, stilkede; de øverste ligebred=lancetformige, heelrandede, siddende. Blstbld. ligebrede, længere end Kronen. Blst. (bleggule) i et aflang = valseformigt Ur. 1—2 F. 4. Jul. 3 Krat. F. D. T. 362.

3 Slægt. *Jasione*. Munke.

Blst. i en hovedformig Skjerm, med Svøb. Bæg. 5kløvet. Kronen 5deelt. Støvd. knapperne sammenhængende ved Grunden. Kaps. Drummet.

1 U. *J. montana*. Blaa Munke.

St. Stgl. opret, stribet. Bld. ligebred=aflange, bølgede, lidt spidse. Blomstf. stilkede, lange, oprette. (Blst. blaa). ½—1 F. ☉. Jul., Aug. Paa tørre Bakker. Ved Sorø. F. D. T. 319.

Lobeliaceæ. Lobelierte.

Væg. 5klovet ell. ubeelt. Kronen uregelmæssig, 5klovet. Støvdr. 5, ikke paa Kronen. Støvknapperne sammenvorne. Nrret omgivet med en Krands af Haar. Kaps. 1—Drummet, opspringende i Spidsen, mangefræet. Hviden kjødet. Embryonet lige. Vld. afværende. Saften melkagtig.

1 Slægt. Lobelia. Lobelia.

Væg. Standet. Støvknapperne sfjæggede. Kapselen Drummet. Frøene paa en Frøestol i Midten.

1 N. L. Dortmanna. Dvepibet Lobelia.

Stgl. næsten bladløs, med en Blomsterklase paa Enden. Vld. samlede ved Roden, ligebred-trindagtige, butte, glatte, Drummede. Kapslerne tilfids oprette. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul. I temmelig dybt ferst Vand. F. D. T. 39.

4 Afdeling.

Bicornes. Tvehornede.

Kronen 4—7klovet, sjældnere deelt ell. flerbladet, sædvanlig regelmæssig. Støvdr. sædvanlig dobbelt saa mange som Kronens Flige ell. Bld., sjældnere af samme Tal, sædvanlig befæstede paa Frugtbunden ell. paa Grændsen mellem Frugtbunden og Kronen. Griff. 1. Frøegjemmet sædvanlig fleerrummet. Frøene sædvanlig befæstede paa en Frøestol i Midten. Embryonet lige, omgivet af Hviden. Sædvanlig h. Bld. enkelte, udeelte. Arelbld. 0. * Kronens Flige ell. Bld. 4—5. Støvdr. dobbelt saa mange, Drummede. Frøegjemmets Rum ligesaa mange som Kronens Flige. Frøestolen 4—5ribbet; Ribberne afværende med Stilleveggene.

1 Orden.

Vacciniaceæ. Bølleartede.

Bæg. voret omkring Frugtknuden. Kronen eenbladet, oversjædig. Støvknapperne 2hornede. Frøegjemmet et Bær. Blst. med Blstbld. * Støvdr. sædvanlig 8.

1 Slægt. **Vaccinium. Bølle.**

Bæg. 4tandet. Kronen 4tandet. * Kronen buget. Bld. omtrent ovale.

A. Bld. affaldende, aarede, glatte. Blststik. i Bladhjørnerne, eenblomstrede. Kronen snæver i Munden. Bærret sort med blaaligt Overtræk.

1 N. **V. Myrtillus. Blaabær = Bølle.**

Kronen næsten kugleformig, (kjosfarvet). (Bærret indvendig mørkerødt). Stammen kantet. Bld. ægformige, smaat savtaktede, oddede. $\frac{1}{2}$ —1 F. h. Maj, Juni. I høje, tørre Skovegne. F. D. T. 974.

2 N. **V. uliginosum. Mose = Bølle.**

Kronen ægformig (hvidagtig). Støvknopperne med Staf. (Bærret indvendig hvidt). Stammen og Grenene trinde. Bld. ægformige, hekrandede. 1—2 F. h. Maj. I højtliggende Løvemoser. F. D. T. 231.

B. Bld. immergrønne.

3 U. V. *Vitis Idæa*. Lyttebær = Bølle.

Kronen klokkeformig (blegrød). Støvknapperne uden Stak. Bærret rødt. Stammen med kantede Grenene. Bld. omvendt ægformige, i Randen tilbagerullede, paa Underfladen prikkede. Blomsterklaserne paa Enden af Stammen, nikkende. 4—6 L. H. Jun., Juli. F. D. T. 40.

2 Slægt. *Oxycoecos*. Eranebær.

Bæg. 4tandet. Kronen 4deelt med tilbagebøjede Flige.

1 U. O. *palustris Persoon*. Almindelig Eranebær.

Blat. Stammen traadformig, fremliggende. Bld. afvejlende og modsatte, ægformige, heelrandede, lidt tilbagebøjede i Randen. Blstik. flere sammen i Enderne af Grenene, cenblomstrede. (Blst. rosenrøde. Bærrene mørkerøde). 1 L. H. Jun., Jul. 3 Løvemoser. F. D. T. 80.

2 Orden.

Ericææ. Lyngartede.

Bæg. 4—7deelt, frit. Kronen undersædlig. Støvdr. 8—10, 2rummede, undertiden 2hornede.

1 Slægt. *Erica*. Erica.

Bæg. enkelt, 4deelt. Kronen 4fløvet. Kapselen 4rummet; Skillevæggene paa Midten af Klapperne. * Bæg. omgivet med 2 Blstbld. Kronen ægformig, med snæver Munding og 4 korte Flige. Blst. i Enden af Stammen og Grenene.

1 U. E. *Tetralix*. Mose = Lyng.

Støvknapperne med Stak, indsluttede. Griff. sædvanl. indsluttet. Bld. 4 i hver Krands, ligebred-ægformige, randhaarede. Blst. i et skjermformigt Hoved, ludende, (rosenrøde). $\frac{1}{2}$ —1 F. H. Jul., Aug. 3 store Løvemoser. F. D. T. 81.

2 Slægt. *Calluna*. Lyng.

Bæg. dobbelt, det yderste Ablade, det inderste 4deelt. Kronen 4deelt. Kaps. 4rummet. Skillevæggene paa Midten af Klapperne.

1 U. C. *vulgaris Salisbury*. *Erica vulgaris Linn*. Almindelig Lyng.

Det indre Bæg. større end Kronen og farvet. Støvknapperne med Stak. Stammen og Grenene tvinde. Bld. næsten taglagte, sylformig-pilformige. Blst. censidige, i Klaser, nikkende, (rosenrøde, sjældnere hvide). $\frac{1}{2}$ —2 F. H. Sept. Paa tørre, sandige Steder. Ved Sorø. F. D. T. 677.

3 Slægt. *Andromeda*. *Andromede*.

Bæg. 5deelt. Kronen næsten klokkeformig, 5kløvet, med tilbagebøjet Krave. Støvdr. 2horneede. Kaps. 5rummet; Skillevæggene paa Midten af Klapperne.

1 *U.* *A. polifolia*. Rosmarinbladet *Andromede*.

Kronen ægformig (lys fjødfarvet). Støvdr. med Stak. Blat. Stammen opstigende. Bl. afværlende, lancetformige, i Randen tilbagebøjede, nedenunder blaagraae. Blstf. næsten i en Skjerm paa Enden af Grenene, 1blomstred, med 2 ægformige Skjæl ved Grunden. $\frac{1}{2}$ —1 *F.* *h.* Jun. 3 Løvemoser. *F. D. T.* 54.

4 Slægt. *Arctostaphylos*. *Meelbær*.

Bæg. 5deelt. Kronen krukkeformig; Kraven tilbagebøjet, 5tandet. Støvknapperne med Stak. Bærret med 5 haardskallede Frøe.

1 *U.* *A. Uva Ursi Spreng.* *Arbutus Uva Ursi Linn.* Usmindelig *Meelbær*.

Stammen fremliggende. Bl. omvendt ægformige, heelrandede, læderagtige, glindsende. Blst. i Knipper (fjødfarvede). (Bærrene røde). $\frac{1}{2}$ *F.* *h.* Jul. Paa Lyngheder. *F. D. T.* 33.

5 Slægt. *Pyrola*. *Vintergrøn*.

Bæg. 5kløvet. Kronbl. 5, rundagtige. Støvdr. opstigende. Støvknapperne nedentil tvehornede. Urret 5lappet. Kaps. 5rummet, opspringende paa Siderne. Frøene omgivne med en Hinde. * Blatte. Bl. rundagtige ell. næsten ægformige, immergrønne.

A. Blst. i en Klase. Blsttbl. lancetformige.

1 *U.* *P. rotundifolia*. Rundbladet *Vintergrøn*.

Kronen udbredt. Griff. nedbøjet, farvet, længere end Kronen. Bl. rundagtige, heelrandede ell. utydelig takkede; imellem dem aflange, butte Skjæl. Klase 8—12blomstret. (Blst. hvide). $\frac{1}{2}$ —1 *F.* *h.* Jul., Aug. Paa fugtige Steder. *F. D. T.* 1816.

2 *U.* *P. minor*. Liden *Vintergrøn*.

Kronen tilsluttet. Griff. lige, kortere end Kronen. Bl. aflang=krædstrunde, lidt tilspidsede, tandede. Skaffet med et sylformigt Skjæl paa Midten. Klase 5—10blomstret. (Blst. rødagtige). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ *F.* *h.* Jul., Aug. I højtliggende Skove. Ved Gyrstinge. *F. D. T.* 55.

3 *U. P. secunda*. Eensidig Wintergrøn.

Kronbl. hule med indbøjet Spids. Griff. næsten lige, lidt længere end Kronen. Bl. ægformige, spidse, finttakkede. Blst. i en eensidig, tæt Klase (hvide). $\frac{1}{4}$ F. **h.** Jul., Aug. 3 højtliggende Skove. **F. D. T.** 402.

B. Blst. eenlige.

4 *U. P. uniflora*. Eenblomstret Wintergrøn.

Griff. lige, længere end Støvd. Bl. næsten kredsrunde, tandede. Blstst. eenblomstret, lang, opret. 2—3 Tomm. **h.** Jul. 3 Skove. **F. D. T.** 8.

6 Slægt. *Chimaphila*. Armeftage.

Bæg. 5kløvet. Kronbl. 5. Støvdragernes Stifter paa Midter udvide til en Skive; Støvknapperne nedentil tvehornede. Arret Slappet. Kaps. Drummet, opspringende i Spidsen.

1 *U. C. umbellata Nuttall*. *Pyrola umbellata Linn.* Skjermblomstret Wintergrøn.

Stammen opstigende. Bl. fileformig = ægformige ell. lancetformige, takkede, glatte, modsatte ell. i Krands. Blst. i en 4—6blomstret Skjerm paa Enden af Stgl. (rødgigt hvide). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. **h.** Jul. 3 Skove. **F. D. T.** 1336.

7 Slægt. *Ledum*. Post.

Bæg. 5kløvet. Kronen flad, 5bladet, ligedannet. Arret Slappet. Kaps. Drummet, aabner sig ved Grunden. Frøene omgivne med en netformig Hinde.

1 *U. L. palustre*. Mose = Post.

Stammen grenet, trind. Bl. ligebrede, i Randen tilbagebøjede, nedenunder ruffarvet filtede. Blst. i enkelte Skjerm paa Enden af Grenene. (Blst. hvide). 1—3 F. **h.** Jul. 3 Moser. Efter Rylling ved Steenlille. **F. D. T.** 1031.

3 Orden.

Monotropeæ. Snylterodartede.

Bæg. flerbladet, kronbladagtigt, frit. Kronen flerbladet, undersædig. Kronbl. ved Grunden pukkede. Kaps. 4—Drummet. Frøene omgivne med en Hinde. Snylterplanter med Skjæl istedenfor Bl.

1 Slægt. *Monotropa*. Snylterod.

1 U. M. Hypopitys. Vellugtende Smylterod.

Roden fæstet paa Roden af Træer. Stgl. opret, trind, hjækket, udeelt. Stjællene gjennem-
 sigtige, i Enden bruunagtige. Blst. i en lodende, eensidig Klasse paa Enden af Stgl., alle meget sijnhaa-
 rede, uligedannede. Den øverste Blst. med 5 Bøgerbl., 5 Kronbl. og 10 Støvdr.; de øvrige med
 4 Bøgerbl., 4 Kronbl. og 8 Støvdr. (Hele Planten straaguul). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. 3 Skove paa
 Rodderne af Træer. F. D. T. 232.

Ufart: glabra. Kronbl. og Støvdr. glatte. (Er efter Nøgles Mening en egen Art). F. D. T. 2051.

Num. Denne Orden stod maaskee rettere i 1 Underklasse 1 Afdeling.

Tredie Underklasse.

Corollifloræ. Kronblomstrede.

Bæg. sædvanlig eenbladet, frit. Kronen eenbladet, sædvanlig med Nør, undersædig. Støvdr. befæstede paa Kronen. Sædvanlig 1 Griffel. * 2—7 Støvdr. Arelbl. 0.

1 Orden.

Jasmineæ. Jasminartede.

Støvdr. 2. Kronen regelmæssig, fjeldnere 0. Frøegjemmet 1 $\frac{1}{2}$ eller Drummet, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ eller 4frøet. Embryonet lige, sædvanlig omgivet af Hvide. H. Bl. sædvanlig modsatte. Blst. i Klaser, Toppe eller Halvsfjerner. * Frøene hængende. Stammen og Grenene trinbe. Bl. glatte, bittere.

1 Slægt. *Fraxinus*. Uff.

Bæg. 0 eller 4bladet. Kronen 0 eller 4bladet. Frøegjemmet pergamentagtigt, sammentrykt, Drummet, sædvanlig 1frøet, vinget i Spidsen.

1 N. *F. excelsior*. Almindelig Uff.

Bæg. og Krone 0. Evekjønede og Hunkb. imellem hinanden i den samme Top. (Nogle Træer bære alene Hunkb.). Frugten lancetformig. Bl. ulige finne; Smaaabl. 9—13, aflange, lancetformige, smalt tilløbende, savtaktede, næsten fiddende. 50 F. H. Maj (før Bladene). Ved Byer. Ved Sorø. F. D. T. 969.

2 Slægt. *Ligustrum*. Liguster.

Bæg. 4tandet. Kronen tragtformig, 4kløvet. Bæret Drummet; 2 Frøe i hvert Rum.

1 N. *L. vulgare*. Almindelig Liguster.

Bl. meget kortstilkede, aflange-lancetformige, heelrandede. Blomsterduslene i Enden af Grenene. (Blst. hvide). 4—6 F. H. Jul. Ved Byer (oprindeligt fremmed). F. D. T. 1141.

3 Slægt. *Syringa*. Syrene.

Bæg. 4tandet. Kronen tragtformig, 4kløvet. Kaps. Drummet, 2klappet, 2frøet.

1 *U. S. vulgaris.* Almindelig *Cyrene.*

Bl. stikkede, ægformig = hjerteformige, heelrandede, spidsc. Blomsterduftene næsten ægformige, i Enden af *Cyrene.* (Blst. lila, sjældnere lyseblaae ell. hvide). 6—10 F. **h.** Jul. Ved Byer (oprindelig fremmed). **F. D. T.**

2 *Orden.*

Apocynææ. *Apocynartede.*

Bæg. 5deelt, vedvarende. Kronen regelmæssig, 5kløvet, sædvanl. før Blomstringen snoet. 5 Støvdr. uden Hale. Støvet kornet. 2 Frugt bære, med et fælles Nr, undertiden heelt sammenvorne. Frøene bedækkede. **h.** ofte med melkagtig Saft. Bl. sædvanlig modsatte, udeelte, heelrandede.

1 Slægt. *Vinea.* *Singren.*

Kronen fladkravet; Kåret 5foldet; Kronens Flige stærkt affumpede. Støvdragernes Stifter oventil udvidede til hule Skjel. Støvkapperne hindeagtige, 2rummede. Frugt bærene sammenvorne. 2 Ballekapsler. Frøene uden Uld.

1 *U. V. minor.* *Liden Singren.*

Bægerfligene lancetformige. Stammen fremliggende, rodstyende. Bl. aflange, immergrønne, glindsende, i Randen glatte. Blstst. eenlige. (Blst. blaae). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. **h.** Maj, Jun. Paa tørre Steder. **F. D. T.** 1813.

3 *Orden.*

Asclepiadææ. *Svalerodartede.*

Bæg. 5deelt, vedvarende. Kronen regelmæssig, 5kløvet, sædvanl. før Blomstringen snoet. 5 Støvdr. Stifterne undertiden sammenvorne, udbendig sædvanl. med kjedagtige eller bladagtige Udværter. Støvkapperne 2rummede. Støvet sædvanl. voragtigt, samlet i Klumper, hængende ved de under Nrret siddende hjertelagtige Legemer. 2 Frugt bære, med et fælles, femkantet Nr. 2 Ballekapsler, hvoraf sædvanl. kun een fuldkommen udvikler sig. Frøene hængende. **h.** sjældnere Urter, sædvanlig med melkagtig Saft. Bl. sædvanlig modsatte, udeelte, heelrandede.

1 Slægt. *Cynanchum.* *Svalerod.*

Kronen 5deelt, hjulformig, med en eenbladet, 5—20lappet Svælgkrands. Frøene med Uld. * Svælgkrandsen enkelt, 5lappet.

1 *N. C. Vincetoxicum Persoon. Asclepias Vincetoxicum Linn. Hvideblomstret Svalerod.*

Kronen glat (gulhvid). Svælgkrandsens Blige butte. Stgl. opret. Bld. hjerteformige aflange, spidse, randhaarede. Blst. i Bladarlerne, danne Klaser. $1\frac{1}{2}$ —2 F. 4. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 849.

4 Orden.

Gentianæ. Gentianartebe.

Kronen sædvanl. regelmæssig, ikke snoet. Stovdr. ligesaa mange som Kronens Blige. 1 Frugtknude. 1 ell. 2 Grifler. Frøegjemmet sædvanl. en Kapsel, 1 $\frac{1}{2}$ ell. Drummet. Hviden kjedet. Sædvanl. glatte Urter. Bld. sædvanl. modsatte, heelrandede.

1 Slægt. *Exacum*. Bitterblad.

Bæg. 4kløvet. Kronen 4kløvet. Støvknapperne opspringende paa langs. Frugtbøven nedbøjet. Urret enkelt. Kaps. Drummet, opspringende i Spidsen. 2 Frøestole, som tilsidst løsne sig fra Skillevæggen.

1 *N. E. filiforme Willd. Gentiana filiformis Linn. Traadstænglet Bitterblad.*

Kronen aaben. Stgl. traadformig, tvedeelt. Bld. lancetformige, siddende. Blst. forlængede. (Blst. gule). 2—3 L. ☉. Jul. Paa Enge nær ved Havet. F. D. T. 324.

2 Slægt. *Erythræa*. Tusendgylden.

Bæg. 5deelt, 5kantet. Kronen tragtformig, 5kløvet. Støvknapperne efter Blomstringen krueformig snoede. Urret sædvanl. 2lappet. Kaps. Drummet. 2 Frøestole. * Stgl. opret, 4kantet. Bld. siddende, omtrent aflange. Blst. oprette, røde. Støvknapperne gule.

1 *N. E. Centaurium Fries. Gentiana Centaurium Linn. Almindelig Tusendgylden.*

Bæg. kortere end Kronens Rør. Stgl. tvedeelt topformig. Bld. ægformig = lancetformige. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Aug. Paa Enge. Mellem Pedersborg og Grydebjerg = Skov. F. D. T. 617.

2 *N. E. litoralis Fries. Centaurium Erythræa Rafn. Hutbladet Tusendgylden.*

Bæg. ligesaa langt som Kronens Rør. Stgl. næsten enkelt. Bld. ligebred = lancetformige, butte. Blst. i tatte Knipper. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul.—Sept. Paa Strandenge. F. D. T. 1814.

3 *N. E. pulchella Fries. Stilket Tusendgylden.*

Bæg. kortere end Kronens Rør. Urret udeelt. Stgl. sædvanl. tvedeelt. Bld. ægformig = aflange. Blst. stilkede. (Kronerne næsten altid lukte). 1—3 L. ☉. Aug., Sept. Paa Enge. F. D. T. 1637, højre Fig. Afart: *uniflora*. Stgl. udeelt, 1blomstret.

3 Slægt. *Gentiana*. Entfian.

Bæg. næsten klokkeformigt, 4—5kløvet. Kronen 4—5kløvet. 2 siddende Kr. Kaps. 1rummet, 2klappet. * Stgl. opret, lidt firekantet. Bld. siddende, enkelte. Blst. oprette (blaa).

1 U. *G. Pneumonanthe*. Smalbladet Entfian.

Bægerfligene fylformige. Kronen tragtformig = klokkeformig, (blaa med grønagtige Folder). Bld. ligebrede. Blst. i Bladhjørnerne, modsatte, stilkede. 4—8 Lomm. 4. Aug., Sept. Paa Enge. F. D. T. 269.

2 U. *G. Amarella*. Eng = Entfian.

Bægerfligene lige store. Kronen fladkravet, i Svælget skjæget, sædvanl. 5kløvet (blaa). Stglbld. lancetformig = ægformige. 2—6 Lomm. 0. Aug., Sept. Paa Enge. Ved Tersløse, funden af Hr. Skovrider Seehusen. F. D. T. 328.

3 U. *G. campestris*. Mark = Entfian.

De hvide Bægerflige meget store. Kronen fladkravet, i Svælget skjæget, sædvanl. 4kløvet (blaa). Bld. aflange, nervede. 2—6 Lomm. 0. Aug., Sept. Paa hvilende Marker. Funden ved Sorø af asd. Gartner Nissen. F. D. T. 367.

4 Slægt. *Menyanthes*. Bukkeblad.

Bæg. sædvanlig 5deelt. Kronen tragtformig, paa Underfladen skjæget. Griff. 1. Urret 2klappet. Kaps. 1rummet, 2klappet. Frøestolene langs Midten af Klapperne.

1 U. *M. trifoliata*. Almindelig Bukkeblad.

Stgl. opstigende. Bld. stilkede, afværlende, trekoblede. Smaabld. bred = ægformige. Blst. i en ægformig, tæt Klase paa Enden af Stgl. (rødlig hvide). $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj, Jun. 3 Moser. Ved Sorø. F. D. T. 541.

5 Slægt. *Villarsia*. Waldschmidie.

Bæg. 5deelt. Kronen næsten hjulformig, indvendig skjæget. 5 Kjerter under Frugt-børen, afværlende med Støvdr. Griff. 1. Urret 2klappet. Kaps. med Frøestole paa Underfladen. * Kaps. ikke opspringende.

1 U. *V. nymphoides* Vent. *Menyanthes nymphoides* Linn. *Waldschmidia nymphoides* Weber. Svømmende Waldschmidie.

Kronens Flige randhaarede. Bld. hjerteformig = fredekrunde, rundbugtet, heelrandede. Blst. i Skjerme (gule). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. 3 Søer og dybe Grøfter. F. D. T. 339.

Convolvulaceæ. Snerleartede.

Kronen regelmæssig. 4—5 Støvdragere. 1 ell. 2 Griffler. Kapsl. 1—4rummet. Skillevæggene løsne sig fra Klapperne. Frøene oprette, befæstede ved Grunden af Skillevæggene. Embryonet krumt. Bl. afværende ell. 0. * Slyngende Urter.

1 Slægt. Convolvulus. Snerle.

Bæg. 5deelt. Kronen klotformig ell. tragtformig faldet. Støvdr. 5. * Kronen tragtformig, udeelt. Kapsl. 2rummet, Frøene 2 i hvert Rum. Stgl. slyngende imod Solen. Bl. stilkede, næsten pilformige, glatte. Blst. sædvanl. eenlige, i Bladaxlerne, stilkede.

1 U. C. arvensis. Uger = Snerle.

Bægerfligene butte. Bl. pilformige. Blstfl. længere end Bl. Blstfld. paa Midten af Blstfl., modsatte, ligebrede. (Blst. hvide ell. lysrøde, undertiden af begge Farver). 0—2 F. 2. Jun.—Aug. I Korn, ved Beje og paa Diger. Ved Sorø. F. D. T. 459.

2 U. C. sepium. Gjerde = Snerle.

Bægerfligene spidse. Bl. pilformige, spidse, med afstumpede Baggige. Blstfl. 4kantet, længere end Blstfl. Blstfld. hjerteformige, spidse, tæt ved Bæg. (Blst. hvide). 1—6 F. 2. Jul. Ved Gjerder og mellem Buske. Ved Sorø. F. D. T. 458.

2 Slægt. Cuscuta. Hørfilke.

Bæg. 4—5kløvet. Kronen 4—5kløvet, vedvarende, buget, ofte indvendig skjælet. 2 Griff. Kapsl. opspringende paa Tværs, 2rummet; 2 Frøe i hvert Rum. Embryonet spiralformig snoet, uden Frøblade. Bl. 0.

1 U. C. Epithimum. Riden Hørfilke.

Kronen tragtformig, indvendig skjælet. Støvdr. indsluttede. Griff. traadformige, butte. Blst. fiddende, i Hoveder, paa Siderne af Stgl. (Blst. hvide). 1—2 F. 2. Aug. Snylteplante paa Lyng. F. D. T. 427.

2 U. C. europæa. Stor Hørfilke.

Kronen klotformig, indvendig uden Skæl (hvid). Griff. udspilede, med traadformige Ur. Blst. meget kortstilkede, i Hoveder, paa Siden af Stgl. (Stgl. rødagtig). 2—3 F. Jun., Jul. Snylteplante paa Mælder, Hamp o. a. Ved Sorø. F. D. T. 199.

3 U. *C. Epilinum Weihe.* Mellem = Hørsilke.

Kronen kloffeformig = rørformig, 5kløvet (hvid). Griff. korte, oprette. Stødr. Skjæl fryndse.
 - fede. Stgl. udeelt. Blst. siddende. 2-3 F. Jun., Jul. Enlytteplante paa Hør. F. D. T. 1987.

4 U. *C. lupuliformis Krock.* Humle = Hørsilke.

Stgl. ru af opstående Prikker. Blst. i Klaser. (Blst. hvidagtig = røde). 2-3 F. ☉
 Jul., Aug. F. D. T.

Ann. Denne Slægt burde maaskee danne en Familie for sig selv.

6 Orden.

Borragineæ. Hvasbladede.

Bæg. sædvanl. 5kløvet ell. 5deelt. Kronen sædvanl. regelmæssig og 5kløvet; Gli-
 gene før Blomstringen taglagte. Stødr. sædvanl. 5. Frugtknuderne sædvanl. 4, paa en
 kjedagtig Skive. Griff. 1. Sædvanl. 4 cenfræde, tørre, ikke opspringende, Frægjemmer
 (Nødder). Frøet sædvanl. hængende. Hviden 0 eller meget tynd. Bl. sædvanl. afværende,
 ofte stivhaarede. * Urter. Stglbl. siddende, heelraandede. Blst. sædvanl. i 2rædede, før
 Blomstringen indrullede Klaser. Kronerne sædvanl. i Begyndelsen røde, siden blaae.

1 Slægt. *Lithospermum.* Steenfrøe.

Bæg. 5deelt. Kronen tragtformig, med aabent Svælg. Stødr. indsluttede i Kronens
 Rør. Nødderne uden Hul nedentil, ægformige. * Stgl. opret, trind, grenet. Blst. hvide.

1 U. *L. arvense.* Rynket Steenfrøe.

Bæg. sædvanl. kortere end Kronen, ved Frugtens Modenhed aabent. Nødderne ujævne. Bl.
 lancetformige, uden Næver, stivbørstede. 1 F. ☉. Jun. 3 Vintersæden. Ved Sorøe. F. D. T. 456.

2 U. *L. officinale.* Løge = Steenfrøe.

Kronens Rør af Bagerets Længde. Nødderne glatte, glindsende. Bl. bred = lancetformige,
 spidse, aarede, rue, næsten stivbørstede. (Blst. gullhvide). 2-3 F. 4. Jun. Paa grusede Steder.
 F. D. T. 1084.

2 Slægt. *Pulmonaria.* Lungeurt.

Bæg. prismatisk, femtandet. Kronen tragtformig, med aabent, undertiden haaret, Svælg.
 Nødderne uden Hul nedentil. * Bl. stivhaarede; Rødbld. stilkede. 4. Stgl. opret, kantet.
 Blst. blaae.

1 *P. angustifolia*. Smalbladet Lungeurt.

Kronens Svælg besat med Knipper af Haar. Bld. lancetformige; Stgblb. siddende, halvomsfattende. 1—1½ F. 4. Apr., Maj. 3 Skove. F. D. T. 483. (Maaskee en Bastard af denne og den Følgende).

2 *P. officinalis*. Almindelig Lungeurt.

Rodblb. hjertesformig = ægformige. Stgblb. siddende, ægformig = aflange. ½—1½ F. 4. Apr., Maj. 3 Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 482.

3 Slægt. *Echium*. Slangehoved.

Bæg. 5deelt. Kronen uregelmæssig, tragtformig eller klokkeformig. Svælget aabent. Nrret 2deelt.

1 *E. vulgare*. Almindelig Slangehoved.

Kronen næsten tragtformig (blaa). Støvd. længere end Kronen. Stgl. vortet, hvashaaret, ender sig i en opret Blomster = Klasse, sammensat af udstaaende Smaaax. Bld. ligebred = lancetformige, hvashaarede. 2—3 F. 3. Jun., Jul. Paa sandige Steder, paa Diger o. desl. Ved Sorøe. F. D. T. 445.

4 Slægt. *Myosotis*. Førgjetmigei.

Bæg. 5kløvet. Kronen fladkravet; Svælget sædvanl. lukt med hvælvede Skjæl. Støvdragerne indfluttede i Kåret. Nødderne med et Hul nedentil. * Nødderne glatte. Stgl. kantet. Bld. lancetformige, mere eller mindre haarede.

1 *M. silvatica Ehrh.* *M. Scorpioides Linn.* Skov = Førgjetmigei.

Bæg. 5kløvet, efter Blomstringen lukt. Kronens Krave længere end Kåret, (blaa, sjældnere hvid). Bld. aflang = lancetformige, blød = laadne. Blomsterklaserne meget lange, bladløse. Blststf. efter Blomstringen udstaaende. ½—1 F. 4. Maj, Jun. 3 Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 583, venstre Fig.

2 *M. intermedia Link.* Mellemartet Førgjetmigei.

Bæg. lukt, kortere end Kronens hule Krave. Støvhaaret. Stgl. grenet, kantet. Bld. aflang = lancetformige, lidt butte. Klaserne uden Blstbld. Blststf. lange. ½—1 F. 3. Jun.—Aug. 3 Skove? F. D. T.

3 *M. palustris Roth.* *M. Scorpioides* δ *palustris Linn.* Eng = Førgjetmigei.

Bæg. 5standet, med noget butte Lænder, efter Blomstringen aabent. Kronens Krave længere end Kåret (blaa). Stgl. nedentil rodfyldende. Bld. omvendt ægformig = lancetformige, lidt rue med tiltrykte Haar. Blomsterklaserne bladløse. Blststf. efter Blomstringen udspilede. ½—1 F. 4. Maj—Aug. 3 sumpige Eng og ved Grøfter. Ved Sorøe. F. D. T.

Ufart: *cæspitosa*. *M. cæspitosa Schultz.* Blomsterne mindre.

4 *U.* *M. arvensis* Roth. *M. Scorpioides a arvensis* Linn. Mark = Førgjetmigej.

Bæg. Skløvet, efter Blomstringen luft. Kronens Krave af Rørets Længde (blaa). Bld. aflang = lancetformige, lidt spidse, stivhaaret = laadne. Blomsterklaserne bladløse. Blstst. efter Blomstringen udstaaende, længere end Bæg. $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ F. ☉. Apr., Maj. Paa tørre Marker, i haver ic. Ved Sorø. F. D. T.

5 *U.* *M. versicolor* Ehrh. Dverg = Førgjetmigej.

Bæg. Skløvet, efter Blomstringen luft. Kronens Krave kortere end Røret. (De hvalvede Skjæl mangle undertiden). Bld. lancetformige, butte, stivhaarede. Blomsterklaserne bladløse. Blstst. efter Blomstringen oprette, kortere end Bæg. (Blst. paa een og samme Plante blaae og gule). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj, Jun. Paa tørre Bakker og i Sandbund. Ved Kongebroen, Pedersborg, Borsø. F. D. T. 583, højre Figur.

6 *U.* *M. sparsiflora* Mikan. Bleg Førgjetmigej.

Bæg. efter Blomstringen aabent. Stgl. grenet. Bld. aflang = lancetformige, butte. Klaserne slappe ved Grunden, bladede. Blstst. efter Blomstringen nedbojede. (Blst. blegblaae). $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Maj, Jun. Paa fugtige Steder. F. D. T. 1688.

M. Lappula. See 10 Slægt.

5 Slægt. *Borrago.* Borago.

Kronen hjulformig; Svælget med udrandede Skjæl. Støvknapperne aflange. Nødderne uden Hul nedentil.

1 *U.* *B. officinalis.* Almindelig Borago.

Kronens Flige ægformige, spidse, sædvanl. flade. Svashaaret. De nederste Bld. omvendt ægformige, de øverste næsten hjerteformige = aflange. Blst. ludende (blaae). 1 F. ☉. Jun.—Aug. 3 haver. F. D. T.

6 Slægt. *Lycopsis.* Krumhals.

Bæg. Skløvet. Kronen tragtformig, lidt uregelmæssig, med krumt Rør. Svælget luft med skjægede Skjæl. Nødderne med et Hul nedentil.

1 *U.* *L. arvensis.* Almindelig Krumhals.

Bæg. under Blomstringen opret. Svashaaret. Stgl. opret, trind. Bld. lancetformige. Blomsterklaserne bladede. (Blst. lysblaae). $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Maj—Aug. Paa Agre og Diger. Ved Sorø. F. D. T. 435.

Num. Jeg kan ikke Andet end være enig med Hornemann i at holde denne Art adskilt fra *Anchusa*, hvorfra den er noksom kjendelig ved Kronens Form.

7 Slægt. *Anchusa*. Dretunge.

Væg. 5kløvet. Kronen tragtformig, regelmæssig. Svælget luft med butte, hvælvede Skjæl. Nødderne med et Hul nedentil.

1 U. *A. officinalis*. Læge = Dretunge.

Bld. lancetformige, med tiltrykte Haar. Klaserne arformige, taglagte, eensidige. Blstbld. ægformige. (Blst. violette, blaac, ofte af begge Farver sammen, sjelden hvide). 1—2 F. 4. Jun., Jul. Ved Beje og paa Diger. Ved Sorøe. F. D. T. 572.

8 Slægt. *Symphytum*. Kulstuffer.

Væg. 5deelt. Kronens Krave rørformig = buget; Svælget luft med sylformige Skjæl. Nødderne med et Hul nedentil.

1 U. *S. officinale*. Læge = Kulstuffer.

Bægerfligene spidse. Stgl. grenet, oventil vinget. Bld. æg = lancetformige, ved Grunden smallere, nedløbende, ovenpaa meget rue, nedenunder stivhaarede. Blst. (brunnrøde, rosenrøde, violette eller bleggule) i 2deelte Klaser. 2—3 F. 4. Jun., Jul. Paa skyggesulde, lidt fugtige Steder. Ved Sorøe Søe; ved Næsbyholm. F. D. T. 664 og 1569.

2 U. *S. tuberosum Jacquin*. Knoldet Kulstuffer.

Roden knoldet. Stgl. næsten udeelt. Bld. ægformig = aflange, ved Grunden smallere, stivhaarede, de nederste stilkede, de øverste lidt nedløbende. 2 F. 4. Maj, Jun. Paa Klinter. F. D. T.

9 Slægt. *Asperugo*. River.

Væg. efter Blomstringen sammentrykt med parallelle Lapper. Kronen tragtformig; Svælget luft med hvælvede Skjæl. Nødderne uden Hul nedentil, befæstede ved en Støtte i Midten, jevne.

1 U. *A. procumbens*. Fremliggende River.

Ru. Stgl. liggende. Bld. afværende og modsatte, fiddende, ægformig = lancetformige. Blst. eenlige eller 2 sammen, stilkede, i Bladhjørnerne (sædvanlig blaac). 1 F. 0. Maj, Jul. Ved Gårder. F. D. T. 552.

10 Slægt. *Cynoglossum*. Hundetunge.

Væg. 5kløvet. Kronen tragtformig, fladkravet eller hjulformig. Nødderne uden Hul nedentil, befæstede ved en Støtte i Midten, piggede.

1 U. C. officinale. Læge = Hundetunge.

Kronen fragtformig (sædvanl. brunrød). Støvdr. indsluttede. Frøene fladtrykte, tæt besatte med hagede Piger. Stgl. opret, bladlet. Bl. graalige, noget laadne, de nederste aflange, spidse i begge Ender, de øverste næsten ægformige. Klaserne bladløse, danne en Top. 2—3 F. J. Jul., Jul. Ved Veje og Gårder. Ved Sorø. F. D. T. 1047.

2 U. C. Lappula Br. Myosotis Lappula Linn. Løehaget Førgjetmigej.

Kronen fladkrattet (blaa); Røret af Bøgerets Længde. Nøddernes Piger løehagede, i en dobbelt Rad. Stgl. oventil grenet. Bl. lancetformige, haarede. Klaserne bladede. Frugterne oprette. ½—1 F. O. Jul. Paa tørre, grusede Steder. F. D. T. 692.

Ann. Denne Plante forekommer mig ikke ved tilstrækkelige Mærker adskilt fra Slægten Cynoglossum, og jeg har derfor paa egen Haand hensført den dertil.

7 Orden.

Solanæe. Mistænkte.

Væg. sædvanlig 5deelt. Kronen sædvanlig 5kløvet og regelmæssig. Sædvanlig 5 Drummede Støvdr. Frugtbæren paa en Skive. 1 Griffel. Frægjemmet sædvanlig 2 eller 4rummet med mange Frøe. Hviden kjødet. Embryonet krumt. Bl. sædvanlig afværende. Blsttbl. sædvanlig 0. * Bl. enkelte.

1 Slægt. Solanum. Natfkygge.

Væg. deelt. Kronen sædvanlig hjulformig. Støvdr. sammenstødende, opspringende i Spidsen. Bærret 2—4rummet. Frøestolene voxede til Skillevæggene. Frøene glatte. * Bl. stilkede. Blst. lødende.

1 U. S. Dulcamara. Bitterfød Natfkygge.

Bærret aflangt (rødt). Glat. Stammen bugtet, svag. De nederste Bl. hjerteformige, de øverste trelappet-spydformige. Klaserne quastformige, modsatte Bl. (Kronen violet med 10 grønne Pletter ved Svælget). 2—6 F. H. Jun., Jul. Paa fugtige Steder. Ved Sorø. F. D. T. 607.

2 U. S. nigrum. Sort Natfkygge.

Bærret kugleformigt (sædvanlig sort). Sædvanlig duunhaaret. Grenene kantede. Bl. ægformige, nedentil smallere, rundbugtet = bølgede. Blomsterkjerne paa Siden af Stgl. (Blst. hvide). 1 F. O. Jun.—Oct. J. Haver. Ved Sorø. F. D. T. 460.

3 *U. S. villosum.* Laaden Natfhygge.

Bærret kugleformigt. Grenene trinde, stivhaarede. Bl. ægformige, kantet-tandede, graaagtig-laabne. Blst. i Skjerme (hvide). 1 *ƒ.* ☉. Jun.—Oct. 3 *ƒ.* varer. F. D. T. 1927.

2 Slægt. *Physalis.* Blærebæger.

Bæg. 5fløvet. Kronen sædvanlig hjulformig. Støvknapperne opspringende paa langs. Bærret Drummet, bedækket med det oppustede, kantede Bæg.

1 *U. P. Alkekengi.* Tvillingbladet Blærebæger.

Bæg. efter Blomstringen farvet (højrodt). Roden krybende. Bl. 2hobede, silkeede, ægformige, spidse, sædvanlig heelrandede, duunhaarede. Blst. eenlige, silkeede (guulagtig hvide). 1 *ƒ.* 4. Jul. Ved Byer (oprindeligt fremmed). F. D. T. 1636.

3 Slægt. *Atropa.* Galnebær.

Bæg. 5deelt. Kronen tragtformig eller klokkeformig. Støvdr. lidt fremstaaende. Bærret Drummet. Frøestolene frue.

1 *U. A. Belladonna.* Giftig Galnebær.

Kronen næsten valsformig, udvendig lidt haaret (smudsig-violet). Bl. aflange, spidse i begge Ender, heelrandede, temmelig glatte, ofte modsatte, (1 større, 1 mindre). Blst. 1blomstrede, nikkende. (Bærene sorte). 2—3 *ƒ.* 4. Ved Byer. F. D. T. 758.

4 Slægt. *Datura.* Pigæble.

Bæg. rørformigt; den øverste Deel affaldende, den nederste vedvarende. Kronen tragtformig, foldet, med tandet Krave. Urret Klappet. Kaps. halv-sivrummet, 4klappet, med adskilte Frøestole.

1 *U. D. Stramonium.* Giftig Pigæble.

Kaps. opret, pigget; Piggene næsten lige lange, fra hinanden staaende. Bl. ægformige, spidse, buget-tandede, glatte. Blst. kortsilkeede, eenlige, i Grendelingerne (hvide). 1½—2 *ƒ.* ☉. Jul. Ved Byer og Strandbredder i sandig Grund. F. D. T. 436.

5 Slægt. *Hyoscyamus.* Bulmeurt.

Bæg. næsten rørformigt, 5fløvet. Kronen tragtformig, lidt uregelmæssig. Kaps. Drummet, opspringende med et Laag.

1 *H. niger*. Almindelig Hulmeurt.

Fæd = klæbrig. Stgl. opret, trind. Bld. siddende, halv = nedløbende, halvfinnet = bugtede, med temmelig spidse Flige, ægformig = aflange, spidse. Blst. næsten siddende, vendte til een Side (Skidengule med violette Karer og violet Svælg). 1—2 F. J. Jul. Ved Byer. Ved Sorøe. F. D. T. 1452.

6 Slægt. *Verbascum*. Kongelys.

Bæg. Skløvet. Kronen hjulformig, uregelmæssig. Støvdragernes Stifter tildeels fæggede. Støvnapperne uligedannede. Kaps. Drummet med indbøjede Klapper. * Stgl. opret, kantet. Bld. omtrent aflange, udeelte. Blst. sædvanlig i ærformige Klaser paa Enden af Stgl.

A. De øverste Bld. nedløbende.

1 *V. Thapsus*. Giltbladet Kongelys.

Kronens Krave huul; Fligene butte. Støvnapperne næsten ligedannede. Bld. aflange, filtede, utydelig rundtakkede; de nederste butte, tilløbende i en Stilk; de øverste spidse. Klaser ærformig, tæt. (Blst. store, gule). 2—5 F. J. Jul, Aug. Paa tørre Marker og Diger. Ved Sorøe. F. D. T. 631.

Ufart: album. Kronerne hvide.

2 *V. cuspidatum* Schrad. Spidsbladet Kongelys.

Støvnapperne ulige store. Bld. rundtakkede, filthaarede, de øverste tilspidsede. Klaser Blst. i Knipper, som sidde i Afstand fra hinanden. 2—3 F. J. Jul. Paa tørre Steder. F. D. T.

3 *V. collinum*. Bakke = Kongelys.

Støvnapperne lige store. Bld. rundtakkede, filtede, de nederste aflange, filkede, de øverste aflange, spidse, lidt nedløbende. Blomsterknipperne adskilte. 2—3 F. J. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 1811.

B. Bld. ikke nedløbende; de nederste filkede, de øverste siddende. Blst. noget adskilte.

4 *V. Lychnitis*. Smaablomstret Kongelys.

Støvdragerne lige lange. Stgl. endende sig i en Top. Bld. aflange, utydelig rundtakkede, ovenpaa temmelig glatte, nedenunder nopret = filtede. Blomsterknipperne lidt adskilte. (Blst. hvide med rødtligt Skjær). 2—3 F. Jul. Paa Diger. F. D. T. 586.

5 *V. nigrum*. Mørk Kongelys.

Støvdr. lige lange. Stgl. endende sig i en (tynd, kogleformig) Top. Bld. næsten hjerteformig = ægformige, rundtakkede, sædvanl. buunhaarede. Bladstf. nedløbende. (Blst. gule. Støvdr. violette). 2—3 F. Jul, Aug. F. D. T. 1088.

6 A. V. *Blattaria*. Eenligblomstret Kongelys.

Støvdr. lige lange. Bl. glatte; Rodtbl. næsten bugede, ulige rundtakkede; Stgltbl. næsten hjerteformig = ægformige, tilspidsede, tandede. Kåsen lang; Blstf. eenlige, 1blomstrede. (Blst. gule eller hvidagtige). 2-2½ F. ☉. Jul. Ved Veje. F. D. T.

8 Orden.

Scrophularinæ. Masseblomstrede.

Kronen sædvanlig uregelmæssig. Støvdr. sædvanlig 2 lange og 2 korte, sjældnere 2 eller 4 lige lange. 1 Griffel. Krret Klappet. Frøegjemmet Drummet, sædvanlig en Klappet Kaps. Frøestolene i Midten af Frøegjemmet. Sædvanlig mange Frø. Hviden kjødet, omgivende Embryonet. Bl. sædvanlig modsatte, i det Mindste de nederste. * Urter.

1 Afsnit.

Scrophulariæ Juss. *Scrophularier*.

Væg. sædvanlig 5kløvet eller 5deelt. Kaps. næsten trind, med tykke Frøestole.

1 Slægt. *Scrophularia*. Bruunrod.

Væg. 5kløvet. Kronen buget, med snæver Munding; Kraven ulige Klappet. Støvdr. nedbøjede. Kaps. tilspidsset, med indbøjede Klapper. * Stgl. Akantet. Grenene og Bl. modsatte. Bl. hjerteformige, takkede. Blstf. i Bladhjørnerne, fleerblomstrede.

1 A. *S. nodosa*. Knoldet Bruunrod.

Roden tyk, knudret = knoldet. Blat. Stgl. skarpkantet. Bl. spidse, savtakkede, sædvanlig 3nervede. (Blst. brune). 2-3 F. 2. Jul. I Krat og ved Gærder. Ved Sorøe. F. D. T. 1167.

2 A. *S. aquatica*. Vand = Bruunrod.

Roden tapformig og langtrævlet. Blat. Stgl. vinget. Bl. lidt butte, savtakkede, tilløbende i en Stilk. Blstf. danne Halvkjerme. (Blst. brune). 2-4 F. 2. Jul., Aug. I Aar og Grøfter. F. D. T. -507.

3 A. *S. vernalis*. Vaar = Bruunrod.

Stgl. laaden. Bl. ægformig = hjerteformige, dobbelt tandede, duunhaarede. Blstf. danne faablomstrede Halvkjerme. (Blst. gule). 1½ F. 3. Ved Gærder. Ved Sorøe. F. D. T. 411.

2 Slægt. *Digitalis*. Fingerbølle.

Væg. 5deelt; Fligene sædvanlig ulige store. Kronen klokkeformig, med 4kløvet Krave. Støvdr. nedbøjede. Støvkapperne 2deelte. Kaps. tilspidsset, med indbøjede Klapper.

1 *U. D. purpurea.* Rød Fingerbølle.

Bøgerets flige ægformig = aflange. Stgl. opret, stribet. Bl. stilkede, afværlende, aflange, rundtakkede, rynkede, duunhaarede. Blst. i en Klasse paa Enden af Stgl. Blststf. af Bøgerets Længde. (Kronen violet = rød). 2—3 \mathcal{F} . \mathcal{J} . Jul. 5 Skove. F. D. T. 74.

3 Slægt. *Linaria.* Høruet.

Bæg. Sdeelt. Kronen næskeformig, med en Spore. Kaps. opspringende i Spidsen med Lænder. Frøene næsten randede.

A. Stgl. liggende. Bl. stilkede. Blststf. sædvanlig i Bladhjørnerne, eenblomstrede.

1 *U. L. Cymbalaria Willd. Antirrhinum Cymbalaria Linn.* Lappet Torstemund.

Sporen kort, spids. Bl. afværlende, hjerteformige, sædvanlig flappede, glatte. (Kronen violet og gul). $\frac{1}{2}$ \mathcal{F} . 2. Jun.—Sept. Paa Mure. F. D. T. 1220.

2 *U. L. Elatine Desfont. Antirrhinum Elatine Linn.* Pillebladet Torstemund.

Bl. strøede, næsten ægformige, spydformige, lidt haarede. Blststf. lange. (Kronen violet og gul). $\frac{1}{2}$ \mathcal{F} . \odot . Jul.—Sept. Smellem Baarkornet. F. D. T. 426.

3 *U. L. spuria Willd. Antirrhinum spurium Linn.* Laaden Torstemund.

Bøgerfligene aflange. Laaden. Bl. strøede, rundagtig = ægformige, oddede, sædvanlig heelrandede, de øverste næsten fiddende. Blststf. modsatte, bladede. (Kronen gul og violet). $\frac{1}{2}$ \mathcal{F} . \odot . Aug., Sept. Paa Kornagre. F. D. T. 913.

B. Stgl. opret. Bl. fiddende, omtrent lancetformige, heelrandede.

4 *U. L. arvensis Desfont.* Uger = Torstemund.

Bæg. klæbrig = haaret. Kronens Spore tilbagebøjet. (Blst. violette). Bl. fransformige og strøede, affumpede. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ \mathcal{F} . \odot . Jul. Paa Ugre. F. D. T.

5 *U. L. minor Cand. Antirrhinum minus Linn.* Liden Torstemund.

Stgl. grenet, udbredt, fjertlet = haaret. Bl. modsatte og strøede, ligebred = lancetformige, temmelig butte, duunhaarede. Blststf. i Bladhjørnerne, meget længere end Bæg. (Kronen lys = violet og gul). 3—6 Lomm. \odot . Jul., Aug. Paa dyrkede Steder. (Jeg troer at have set den i en Have i Sorø, hvor den dog maaskee var opkommen af Frøe, som tilfældigvis var udsaaet). F. D. T. 502.

6 *N. L. vulgaris Willd. Antirrhinum Linaria Linn. Hørbladet Torsemund.*

Bld. strøede, lancetformig-ligebrede, spidse. Blst. i en arformig Klase (citrons og orangegule).
1-2 *F.* 24. Jun., Jul. Paa Diger. Ved Sorø. *F. D. T.* 982.

4 Slægt. *Antirrhinum. Torsemund.*

Bæg. 5deelt. Kronen masseformig, nedtil puffed. Kaps. opspringende i Spidsen med Huller.

1 *N. A. Orontium. Langbægret Torsemund.*

Bæg. fingerformig deelt, længere end Kronen, duunhaaret. Bld. afværende og modsatte, lancetformig-ligebrede, sædvanlig fiddende, lidt stivhaarede. Blst. strøede, næsten fiddende (violet-røde, sjældnere hvide). $\frac{1}{2}$ -1 *F.* \odot . Jul., Aug. 3 Kornet. *F. D. T.* 941.

5 Slægt. *Gratiola. Naadesurt.*

Bæg. 5deelt. Kronens Krave uregelmæssig, 4kløvet. Støvdr. 4, deraf 2 ufrugtbare. Kaps. næsten kugleformig-ægformig; Skillevæggen parallel med Klapperne.

1 *N. G. officinalis. Lancetbladet Naadesurt.*

De ufrugtbare Støvdr. udeelte. Bæg. omgivet med Blstbld. Bld. lancetformige, fiddende, smaat savtaktede, sædvanlig 3nervede, Blstst. eenblomstrede, i Bladhjørnerne. (Blst. bleg-guulrøde). $\frac{1}{2}$ *F.* 24. Jun., Jul. Paa Enge. *F. D. T.* 363.

6 Slægt. *Limosella. Dyndurt.*

Bæg. 5deelt. Kronen næsten klokkeformig, 5kløvet. Kaps. 2klappet, halv Drummet. Frøestolen fri, i Midten.

1 *N. L. aquatica. Lidet Dyndurt.*

Bld. ved Roden, stilkede, lancetformige, heelrandede, butte, glatte. Flere meget korte, sædvanlig eenblomstrede Stafter. (Blst. rødlig hvide). 1 Tomm. \odot . Jun.-Sept. Paa vaade, moradsige Steder. *F. D. T.* 69.

Ufart: billora. Bld. ligebrede.

2 *Affnit.*

Pediculares Juss. Pedicularer.

Kaps. sammentrykt eller Knoppet. Frøestolen traadformig eller utydelig. Skillevæggene paa Midten af Klapperne.

1 Slægt. *Alectrolophus*. Skjaller.

Bæg. buget, 4tandet. Kronens Overlæbe sammentrykt, udrandet. Støvknapperne 2deelte. Kapsf. sammentrykt. Frøene randede.

1 N. A. *Crista Galli Bieberstein*. *Rhinanthus Crista Galli Linn.* Almindelig Skjaller.

Glat. Stgl. kantet, plettet. Bl. modsatte, lancetformige, savtaktede. Blst. i 2r paa Enden af Stgl. (Kronen guul; Overlæben i Spidsen blaa). 1 F. ☉. Jun. Paa Enge. Ved Sorø. F. D. T. 981.

Arter: β) *parviflorus*. Kronerne kortere.
 γ) *minor*. Kronerne eenfarvede. R. *minor Ehrhart*.

2 Slægt. *Bartsia*. Bartschie.

Bæg. 4fløvet eller 4deelt. Kronen rørformig; Overlæben heel; Underlæben 3fløvet. Kapsf. ægformig, sammentrykt. Frøene kantede.

1 N. B. *Odontites Hudson*. *Euphrasia Odontites Linn.* Eng = Bartschie.

Støvd. fremstaaende. Frøene strikede. Duunhaaret. Stgl. opret, grenet. Bl. modsatte, lancetformige, savtaktede. Klaserne arformige, eensidige. (Blst. lyserøde). ½—1 F. ☉. Aug.—Sept. Paa Enge. Ved Sorø. F. D. T. 625.

3 Slægt. *Euphrasia*. Hjentrøst.

Bæg. 4fløvet. Kronen 2læbet; Overlæben udrandet eller smaatandet. Støvknapperne 2deelte, ebbede. Arret hovedformigt. Frøene strikede.

1 N. E. *officinalis*. Væge = Hjentrøst.

Bæg. uden Hjertler. Kronens Flige udrandede. Temmelig glat. Bl. sædvanlig fiddende, ægformige, savtaktede. Blst. modsatte, i Bladhjørnerne, (sædvanlig hvide med violette Striber og guult Svælg). ¼—½ F. ☉. Jul.—Sept. Paa Græsmarker. Ved Sorø. F. D. T. 1037.

4 Slægt. *Pedicularis*. Troldurt.

Bæg. buget. Kronen med 2læbet; Overlæben hvælvet, sammentrykt; Underlæben 3fløvet. Kapsf. næbbet. * Hjelmen temmelig hut, nedenfor Spidsen 2tandet. Stgl. opret. Bl. dobbelt halvfinne. Blst. sædvanlig eenlige paa korte Stilke i de øverste Bladhjørner.

1 N. P. *palustris*. Eng = Troldurt.

Bæg. 2fløvet, lidt sammentrykt, bladagtigt. Hjelmen buttandet. (Blst. rosenrøde). ½—1 F. ☉, ♀. Jun., Jul. Paa raade Enge. Paa Slommen. F. D. T.

2 *U. P. silvatica.* Skov = Troldburt.

Bæg. ulige 5kløvet, smaat rundtattet. Hjelmen spidstandet. (Blst. røde). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun., Jul. Paa vaade Enge, mellem Krat. Funden i Hjortenæs af afd. Gartner Nissen. F. D. T. 225.

5 Slægt. *Melampyrum.* Koeføde.

Bæg. 2kløbet, 4kløvet. Kronens Overlæbe hjelmformig med tilbagebøjet Rand; Underlæben flappet. Støvknapperne 2spidsede. Kaps. tilspidset; Kummene sædvanlig 2frøede. * Stgl. opret, med modsatte Grene. Bl. omtrent lancetformige, modsatte, siddende, heelrandede. Blstbl. sædvanlig farvede og noget tandede. Blst. danne et Ur paa Enden af Stgl.

1 *U. M. cristatum.* Firekantet Koeføde.

Krone 4kantede med hule Sider. Blstbl. hjerteformige, tæt taglagte, firetandede. (Kronen lysrød og guul). 1 F. ☉. Jul. 3 Skove og paa Enge. F. D. T. 1104.

2 *U. M. arvense.* Ager = Koeføde.

Krone kegleformige, lidt flappe. Blstbl. lancetformige, fliget = tandede, (røde). (Kronen rosenrød og guul). 1 — $1\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul. 3 Winterfæden. Ved Sorø efter Professor J. C. Molbech. F. D. T. 911.

3 *U. M. nemorosum.* Lund = Koeføde.

Bæg. uldhaaret. Blst. i eensidige Ur, parrede. Blstbl. hjerteformig=lancetformige; de øverste farvede (blaae), uden Blst. (Kronen guul). 1 — $1\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul. 3 Krat. Ved Lundehuset; i Topshøj Skovvænge; ved Suserup. F. D. T. 305.

4 *U. M. pratense.* Eng = Koeføde.

Kronen næsten luft (lyseguul); Underlæben fremstaaende. Blst. eensidige, hver Klump (Par) Blomster i nogen Afstand fra hverandre. De øverste Bl. og Blomsterbladene ved Grunden tandede. (De øverste Blstbl. lysrøde). 1 F. ☉. Jul. 3 Skove. Ved Sorø. F. D. T.

5 *U. M. silvaticum.* Skov = Koeføde.

Kronen gabende (mørkguul); Underlæben nedbøjet. Blst. eensidige; hver Klump (Par) Blomster i nogen Afstand fra hverandre. Blstbl. heelrandede (grønne). 1 F. ☉. Jul. 3 Skove. F. D. T. 145.

6 Slægt. *Veronica.* Vrenpriis.

Bæg. 4—5deelt. Kronen sædvanlig 4kløvet; den nederste Flig smaldest. 2 Støvdr. siddende paa Svælget. Kaps. mangefrøet. * Bæg. 4deelt. Urter. Stgl. trind. Blst. afværende.

17 *U. V. verna.* Vaar = Gørenpris.

Stgl. rank, stivhaaret. De nederste Bl. næsten halvfinnede, de øverste 3deelte; Bl. ved Blst. udeelte, ligebred = lancetformige, længere end Blstik, men kortere end Bæg. (Blst. blaae). 2—4 L. ☉. April. Paa tørre Steder. F. D. T. 655.

18 *U. V. peregrina.* Fremmed Gørenpris.

Slat. Stgl. opret. Bl. aflange, sædvanlig savtakkede, længere end Bæg. Blst. fiddende. (Blst. blaaagtige). 3—6 L. ☉. Jul. Paa dyrkede Steder. F. D. T. 407.

Polygala. See 1 Underklasse, 2 Afdeling, 5 Orden.

9 Orden.

Labiatae. Krandsblomstrede.

Bæg. sædvanlig rørformigt. Kronen med Rør, 2læbet; Overlæben sædvanlig heel eller 2kløvet; Underlæben bredere, 3kløvet. Støvdr. 2 lange og 2 korte, eller sjældnere 2 lige lange. 4 Frugtknuder. 1 Griff. mellem Frugtknuderne. Nrret sædvanlig 2kløvet. 1—4 negne Frøe. Hviden sædvanlig 0. Embryonet opret. Sædvanlig Urter med 4kantede Stgl. og modsatte Grene. Bl. modsatte, enkelte. Blst. sædvanlig flere samlede i modsatte Blad-hjørner, hvorved de danne Krands. Indeholde sædvanlig en ætheriskolie.

I. Bæg. 2læbet. 4 ulige lange Støvdr.

1 Slægt. *Prunella.* Prunel.

Bægerets Overlæbe 3tandet, flad, trykt til Kronen; Underlæben 2tandet. Kronens Overlæbe udeelt; Underlæben 3kløvet. Støvdragernes Stifter opstigende, mod Enden 2kløvede. Støvknapperne 2knoppede. * Bl. ægformig = aflange.

1 *U. P. vulgaris.* Almindelig Prunel.

Bægerets Overlæbe affumpet, 3braaddet. Kronen dobbelt saa lang som Bæg. Lidt haaret. Stgl. opstigende. Bl. ofte tandede. (Blst. violette, sjældnere hvide). $\frac{1}{2}$ F. Jun.—Aug. Paa Eng og i Krat. Ved Sorøe. F. D. T. 910.

2 *U. P. grandiflora.* Størblomstret Prunel.

Bægerets Overlæbe 3kløvet. Kronen 4 Gange saa lang som Bæg. Bl. ved Grunden tandede. $\frac{1}{2}$ —1 F. 2. Paa Kridtkapper. F. D. T. 1933.

2 Slægt. *Thymus*. Timian.

Vægerets Overløbe 3tandet; Underløben 2tandet; Svælget efter Blomstringen lukket med Haar. Kronens Overløbe 2kløvet; Underløben 3kløvet. Støvdr. opstigende.

1 U. *T. Serpyllum*. Bild Timian.

Bæg. stivhaaret. Støvdr. omtrent af Kronens Længde. Stgl. nedliggende. Grenene opstigende. Bld. sædvanlig ægformige, ved Grunden randhaarede. Blst. deels i et Hoved, deels i Krandsf. (Bæg. brunt. Kronen lystød). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul, Aug. Paa tørre Steder. Ved Sorø. F. D. T. 1165.

- 1 Afart: *ciliatus*. Bld. randhaarede lige til Spidsen.
- 2 — *major*. Støvdr. længere end Kronen. Bld. langstilkede.
- 3 — *hirsutus*. Stgl. og Bld. haarede.
- 4 — *citriodorus*. Bld. ægformige, glatte, med citronagtig Lugt.
- 5 — *angustifolius*. Bld. linieformig = fileformige.

2 U. *T. Acinos*. Basiliken = Timian.

Bæg. nedentil puffed, stivhaaret, halv saa langt som Kronen. Stgl. opret, grenet, laaden. Bld. aflange, spidse, sædvanlig savtakkede og ruc. Blomsterkrandsene 6blomstrede. (Kronen violet). $\frac{1}{2}$ —1 F. 3. Jul, Aug. Paa tørre Marker. F. D. T. 814.

Afart: *villosus*. uldhaaret. F. D. T. 1822.

3 Slægt. *Clinopodium*. Krandsberste.

Et Svøb, bestaaende af mange høvsteformige Smaabld. Vægerets Overløbe 3tandet; Underløben 2tandet; Lænderne med Stak. Kronens Overløbe 2kløvet, omvendt hjerteformig.

1 U. *C. vulgare*. Almindelig Krandsberste.

Haaret. Stgl. opret. Bld. ægformige, butte, haarede, sjænt tandede. Svøbbladene hvas-haarede. Blomsterkrandsene mangeblomstrede, hovedformige. (Blst. røde). 2—3 F. 4. Aug. 3 Krat. Ved Vindebrohuset. F. D. T. 930.

4 Slægt. *Scutellaria*. Skjolddrager.

Vægerets Læber udeelte; den øverste danner et Laag, som efter Blomstringen bedækker Trøene. Kronen næsten maskeformig. * Stgl. opret, sædvanlig grenet. Bld. kortstilkede. Blst. modsatte, eenlige, i Bladhjørnerne, eensidige.

1 U. *S. galericulata*. Blaa Skjolddrager.

Stgl. nedad buunhaaret. Bld. hjerteformig-lancetformige, rundtakkede-savtakkede. (Blst. blaae). 1 F. 4. Jul, Aug. Paa fugtige Steder. Paa en Eng mellem Sorø og Søen. F. D. T. 637.

A. Klaserne paa Enden af Stgl.

1 N. *V. longifolia*. Langbladet Vrenpriis.

Duunhaaret. Stgl. opret. Bld. 3hobede og modsatte, lancetformig = hjerteformige, tilspidsede, dobbelt savtakkede. (Blst. blaae). 1—2 F. 4. Jul. Ved Strand- og Kabredder. F. D. T. 374.

2 N. *V. spicata*. Klyblomstret Vrenpriis.

Haaret. Stgl. opstigende. Bld. modsatte, aflange, lidt butte, rundtakkede = savtakkede, mod Enden heelrandede, stilkede. (Blst. blaae). 1 F. 4. Jul.—Sept. Ved Strandbredder. F. D. T. 52.

3 N. *V. serpyllifolia*. Glat Vrenpriis.

Glat. Stgl. opstigende. Bld. modsatte, ovale, rundtakkede, glindsende. Klaserne lang. Blst. (blegblaae) adskilte. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj—Oct. Paa hvilende Marker. Ved Sorøe. F. D. T. 492.

B. Klaserne paa Siden af Stgl. Bld. modsatte.

4 N. *V. Beccabunga*. Lykbladet Vrenpriis.

Glat. Stgl. rodflydende, opstigende. Bld. ovale, sædvanlig fiddende, butte, but savtakkede, tykke. (Blst. blaae). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun., Jul. Ved Vand. Ved Sorøe. F. D. T. 511.

5 N. *V. Anagallis*. Lancetbladet Vrenpriis.

Glat. Stgl. opret. Bld. halvomsfattende, lancetformige, spids, savtakkede. (Blst. lys = lila). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul. Ved Vand. F. D. T. 903.

6 N. *V. scutellata*. Smalbladet Vrenpriis.

Kaps. fredekrund. Sædvanlig glat. Stgl. svag, nedentil rodflydende. Bld. ligebred = lancetformige, sædvanlig heelrandede. Blomsternes Smaaastilke udspilede eller hængende. (Blst. hvide). $\frac{1}{4}$ —1 F. 4. Jun. Paa vaade Steder. F. D. T. 209.

Ufart: villosa. Bld. haarede. Ved Sorøe Mølle. Paa Engen ved Skjolden. F. D. T. 1561.

7 N. *V. officinalis*. Løge = Vrenpriis.

Laaden. Stgl. opstigende. Bld. omvendt = ægformig = rundagtige, savtakkede. Klaserne arformige, stilkede. (Blst. lila). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun. Paa tørre Steder, især i aabne Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 248.

8 N. *V. Teucrium*. Bredbladet Vrenpriis.

Stgl. opret. Bld. ægformig = aflange, lidt spids, fjernt savtakkede, fiddende. (Blst. blaae). 1 F. 4. Jul. 3 Krat. F. D. T. 2161.

9 U. V. Chamædrys. Tveffjægget Vrenpriis.

Stgl. opstigende, haaret til 2 Sider. Bld. sædvanlig fiddende, hjerteformig = ægformige, indstaaren = savtakfede, rynkede, haarede. (Blst. store, blaae). $\frac{1}{2}$ F. Jun. Ved Gjærder og i Krat. Ved Sorøe. F. D. T. 448.

10 U. V. prostrata. Fremliggende Vrenpriis.

Stgl. opstigende. Bld. aflang = lancetformige, butte, savtakfede, graaagtig duunhaarede. (Blst. blaae). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. Paa Heber. F. D. T.

11 U. V. montana. Bjerg = Vrenpriis.

Stgl. nedentil rodskydende, lidt laaden. Bld. stilkede, hjerteformig = ægformige, lidt butte, tandede, nepe rynkede, haarede. Klaserne saablomstrede, flappe. (Blst. blegblaae). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun., Jul. I høit liggende Skove. I Hjortenæs. I Gyrstinge Skov. F. D. T. 1201.

C. Blst. eenlige.

12 U. V. arvensis. Mark = Vrenpriis.

Bægerfligene ulige store. Duunhaaret. Stgl. opstigende. De nederste Bld. hjerteformig = ægformige, sædvanlig rundtakfede, stilkede; Bld. ved Blst. fiddende, lancetformige, meget længere end Blststik. (Blst. blaae). $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj, Jun. Paa Agre. Ved Sorøe. F. D. T. 515.

13 U. V. agrestis. Ager = Vrenpriis.

Bæg. efter Blomstringen tudende; detts Flige ovale. Duunhaaret. Stgl. opstigende. Bld. stilkede, hjerteformig = ægformige, savtakfede, kortere end Blststik. (Blst. tyseblaae eller hvide). $\frac{1}{2}$ F. ☉. Apr.—Sept. Paa Agre. Ved Sorøe. F. D. T. 449.

14 U. V. Buxbaumii Tenore. Buxbaums Vrenpriis.

Griff. lidt fremragende. Kapfl. brede, omvendt hjerteformig = trekantede. Stgl. fremliggende. Bld. hjerteformig = ægformige, dybt savtakfede, meget kortere end Blststik. (Blst. blaae). $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj—Jul. Ved Byer. F. D. T. 1982.

15 U. V. hederæfolia. Webbladet Vrenpriis.

Bægerets Flige hjerteformige, spidse, randhaarede. Duunhaaret. Stgl. liggende. Bld. stilkede, kortere end Blststik, hjerteformige, 3—5lappede, den midterste Flig længst. (Blst. lila). 1—8 Komm. ☉. Apr.—Sept. Paa tørre Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 428.

16 U. V. triphyllos. Trebladet Vrenpriis.

Duunhaaret. Stgl. opret, grenet. De nederste Bld. stilkede, rundagtige, udeelte; de øverste fingerformig = deelte. Blststik. længere end Bæg., udstaende. (Blst. mørkeblaae). 2—6 Komm. ☉. Apr.—Jun. Paa Agre. Mellem Rug paa Agrene ved Skjolden. F. D. T. 627.

2 *U. S. hastifolia.* Spyddbladet Skjoldbrager.

Stgl. opad duunhaaret. Bl. lancetformige, ved Grunden spydformige, sædvanlig heelrandede. (Blst. blaac). $\frac{1}{2}$ —1 \mathcal{F} . 4. Jul., Aug. Paa fugtige Enge. F. D. T. 1823.

Origanum vulgare. See 7 Slægt.

II. Bøgerets Krave næsten ligedannet, 5 eller 10tandet. 4 ulige lange Støvdr.

5 Slægt. *Ajuga.* Læbels.

Bøg. Skløvet. Kronens Overlæbe meget kort, udrandet. Støvdr. fremstaaende, opstiggende. Støvknapperne eenrummede. Frøene netformig aarede.

1 *U. A. reptans.* Krybende Læbels.

Underlæbens midterste Flig omvendt hjerteformig. Blat. Bl. aflange, butte, ved Grunden smalkere, sædvanlig tandede. Krybende Sideskud. Blst. i Bladaxterne, siddende, flere samlede, danne et fegleformigt Kr. (Blst. blaac og hvide). $\frac{1}{2}$ \mathcal{F} . 4. Maj. I aabne Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 925.

2 *U. A. pyramidalis.* Pyramideformig Læbels.

Underlæbens midterste Flig forlænget, udrandet. Rodbl. meget store, omvendt ægformig aflange, rundtakkede. Blomsterfrandsene mangeblomstrede, tætte. Hele Planten 4kantet = pyramideformig, uldhaaret. (Blst. lyseblaac). $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ \mathcal{F} . 3. Jun., Jul. I Skove. F. D. T. 185.

3 *U. A. Chamæpitys Schreber.* *Teucrium Chamæpitys Linn.* Rødprikket Læbels.

Stgl. grenet, opret. Bl. 3kløvede, haarede. Blst. eenlige, i Bladhjørnerne, fortere end Bl. (Kronen guul med røde Prikker). $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ \mathcal{F} . \odot . Maj. Paa Enge. F. D. T. 733.

6 Slægt. *Teucrium.* Kortlæbe.

Bøg. Skløvet. Kronens Overlæbe meget kort, med en Kløft, som gaaer ned i Kæret. Sidefligene tilbagebøjede; Underlæbens midterste Flig bred, udrandet. Støvdr. opstiggende, i Overlæbens Kløft.

1 *U. T. Scordium.* Løgagtig Kortlæbe.

Stgl. laaden, liggende. Bl. aflange, siddende, ved Grunden smalkere, stort savtakkede, temmelig glatte. Blst. stilkede, 2 sammen i Bladhjørnerne (lyserøde). 1 Lomm. 4. Jul., Aug. Paa fugtige Steder. 4. F. D. T. 593.

2 *U. T. Scorodonia.* Salviebladet Kortlæbe.

Bøgerets øverste Flig ægformig. Bl. hjerteformig aflange, rundtakkede, duunhaarede. Klazjerne i Bladhjørnerne, eenfaldige, oprette, noget slappe. Blst. stilkede, korte. (Blst. lyserøde). 1— $1\frac{1}{2}$ \mathcal{F} . 4. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 484.

7 Slægt. *Origanum*. Merian.

Blst. i Ur eller Duffer med taglagte Blsttbl. Bæg. Standet eller fjeldnere Klæbet. Kronens Overlæbe heel; Underlæben 3fløvet.

1 U. *O. vulgare*. Wild Merian.

Dufferne samlede, stilkede, rundagtige, efter Blomstringen forlængede. Blsttbl. glatte, farvede (brunnrøde) af Bøgerets Længde. Bæg. i Svælget haaret. Stgl. opret, haaret. Bl. ægformige, heelrandede, næsten glatte, randhaarede. (Blst. røde). 1—2 F. 4. Jul.—Sept. 3 Kraft. F. D. T. 1581.

8 Slægt. *Mentha*. Mynte.

Bæg. Standet. Kronen 4fløvet, næsten regelmæssig; den øverste Flig størst, udbrændt; (eller Kronen Klæbet; Overlæben udbrændt; Underlæben 3deelt med udspilede Flige). Støvdragerne adskilte fra hverandre, rette. * Blst. smaae. Bl. sædvanlig rynkede, takkede.

A. Blomsterkrandsene samlede til Ur.

1 U. *M. viridis*. Grøn Mynte.

Støvdr. udstaaende. Stgl. opret, glat. Bl. aflang = lancetformige, tilspidse, savtaktede, glatte. Arene nedentil mellembrudte. Smaaalkene glatte. Blsttbl. og Bæg. lidt haarede. (Blst. hvide). 1—2 F. 4. Aug. Ved Bjærder paa fugtige Steder. F. D. T. 1876.

2 U. *M. silvestris*. Skov = Mynte.

Støvdr. kortere end Kronen. Bl. næsten hjerteformig = aflange, næsten siddende, savtaktede, nedenunder sædvanlig laaden = uldhaarede. Blomsterkrandsene samlede til Ur, nedentil adskilte. Blsttbl. og Bæg. stivhaarede. (Blst. rødlig). 2—3 F. 4. Aug., Sept. 3 Skove. F. D. T. 1932.

1 Ufart: *nemorosa*. Bl. lige savtaktede. F. D. T. 484.

2 — *gratissima*. Bl. bred = oval = hjerteformige.

3 U. *M. rotundifolia*. Rundbladet Mynte.

Støvdr. længere end Kronen. Blomsterkrandsene noget adskilte og arformige. Bl. næsten siddende, ægformig = kredsformige, rynkede, laadne, tandede. Blsttbl. og Bæg. lidt stivhaarede. (Blst. lysrøde). 1—1½ F. 4. Aug.—Sept. . . . F. D. T.

B. Blomsterkrandsene samlede til et Hoved.

4 U. *M. aquatica*. Vand = Mynte.

Bæg. haaret. Støvdr. af Kronens Længde eller længere. Laaden. Bl. ægformige, savtaktede, stilkede. (Blst. blegrøde). 1—2 F. 4. Jul., Aug. Paa fugtige Steder. Ved Søer. F. D. T.

- 1 Afart: *hirsuta*. Tættere haaret. F. D. T. 638.
- 2 — *pumila*. Bld. fiv, butte.
- 3 — *acutifolia*. Bld. ved begge Ender tilspidsede. F. D. T. 794?

C. Blomsterkrandsene adskilte.

5 N. *M. arvensis*. Uger = Mynte.

Bæg. næsten kloffeformigt, stivhaaret, med korte Tænder. Støvdr. kortere end Kronen. Sæd-
vantig laaden. Stgl. opstigende. Bld. silkede, ægformige, spidse, savtakkede. Blstf. temmelig glatte.
(Blst. lys = lila). $\frac{1}{4}$ —1 F. 2. Aug., Sept. Paa Stubagre. Ved Sorø. F. D. T. 512.

- 1 Afart: *pumila*. *M. agrestis* Smith. Bld. hjerteformige.
- 2 — *austriaca*. Stgl. opret. Bld. glatte. (Synes at være forskjellig fra *M. austriaca* hos Sprengel).

6 N. *M. gentilis*. Tvetydig Mynte.

Bæg. temmelig glat. Støvdr. omtrent af Kronens længde. Bld. ægformig = aflange, savtak-
kede, temmelig stivhaarede. Blstf. glatte. (Blst. blegede). 1 F. Aug. F. D. T. 736?

Afart: *rubra*. Bægetænderne haarede. Ved Aar.

7 N. *M. Pulegium*. Pølej = Mynte.

Bæg. temmelig hvashaaret. Støvdr. fremstaaende. Bld. sædvanlig ovale og tandede, butte,
tilløbende i en Stilk, lidt haarede. Blstf. lidt hvashaarede. (Blst. lys = violette eller hvide). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 2.
Aug., Sept. Paa fugtige, sandige Steder. F. D. T. 1755.

D. Blst. i Qvaster.

8 N. *M. sativa*. *M. hirsuta sativa* Gorn. Plant. Have = Mynte. Krandsblomstret
laaden Mynte Gorn. Plant.

Bæg. lidt stivhaaret. Støvdr. indsluttede. Bld. silkede, sædvanlig ægformige, savtakkede,
duunhaarede. Blstf. i Bladhjørnerne, være nøgleformige Qvaster; Smaasilkene lidt stivhaarede. (Blst.
røde). 1 F. 2. Jul.—Sept. Paa fugtige Steder. F. D. T.

Afart: *gracilis*. Bld. lancetformige. F. D. T.

Anm. Jeg har, i den store Uvisshed om Mynternes rigtige Inddeling, ganske fulgt Sprengels
Autoritet.

9 Slægt. *Galeobdolon*. Barfvælg.

Bæg. Skløvet, uregelmæssigt, med Staf. Kronens Overløbe udeelt, hvælvet. Under-
løben Skløvet, med spidse Flige.

1 *U. G. luteum.* Gul Blåbær.

Blst. sikkede, ægformig = hjerteformige, stivhaarede, savtakket = rundtaktede. (Blst. gule). $\frac{1}{2}$ F.
24. Maj, Juni. I Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 1272.

10 Slægt. *Galeopsis.* Hanekrøe.

Bæg. Standet, med Stak. Kronens Overløbe udeelt, hvælvet; Underløbens Sideflige med hule Pukler ved Svælget; den midterste Flig rundtakket. Støvknappernes Klapper randhaarede.

1 *U. G. Ladanum.* Smalbladet Hanekrøe.

Bægetænderne sikkende. Kronens Rør 3 Gange saa langt som Bæg. Stykkerne af Stgl. mellem Leddene omtrent lige tykke, oven til hjertlet = laadne. Bl. aflange, smalle i begge Ender, fjernt savtaktede, grønne paa begge Sider. Bl. ved Blst. lancetformige, smaat savtaktede. Blst. sylformige, sædvanlig tilbagebøjede. (Blst. røde). $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jul., Aug. Paa Agre. Ved Pedersborg. F. D. T. 1757.

2 *U. G. ochroleuca Lamarck.* Gul Hanekrøe.

Bæg. laadent, sikkende, uregelmæssigt. Kronen 4 Gange saa lang som Bæg. Overløben i Enden 2fløvet. Stykkerne af Stgl. mellem Leddene lige tykke, duunhaarede. Bl. duunhaarede med tiltrykte Haar, nedenunder næsten sikkede. (Blst. lysegule). $\frac{1}{4}$ —1 F. ☉. Jul. Paa sandige Agre. F. D. T. 1650.

Anm. Den maa ikke forveksles med *Galeobdolon luteum*, som i Horn. Plant. 1ste Udg. kaldes gul Hanekrøe.

3 *U. G. Tetrahit.* Almindelig Hanekrøe.

Bæg. med lang Stak, af samme Længde som Kronens Rør. (Kronen rød, ell. sjældnere hvid). Stykkerne af Stgl. mellem Leddene oven til tykkere. Grenene forthaarede med sædvanlig tilbagevendte Haar. Bl. ægformig = aflange, savtakket = tandede, stivhaarede. De øverste Blomsterkrandsse sædvanlig tæt sammen. 1—1 $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul., Aug. Paa Agre. Ved Sorøe. F. D. T. 1271.

Ufart: lævigata. Stgl. og Grenene nedentil glatte.

4 *U. G. versicolor Curtis. G. cannabina Roth.* Hampartet Hanekrøe.

Bæg. sikkende (med lang Stak). Kronen (gulhvid med en violet Plet), meget større end Bæg.; Overløben i Enden smaatakket; Svælget oppustet. Stykkerne af Stgl. mellem Leddene oven til tykkere, forthaarede. Grenene forthaarede. Bl. ægformig = aflange, savtakket = tandede, stivhaarede. De øverste Blomsterkrandsse sædvanlig tæt sammen. 1—1 $\frac{1}{2}$ F. Jul., August. I Kornet! Ved Sorøe. F. D. T. 929.

11 Slægt. *Lamium*. Løvetand.

Væg, Standet. Kronens Rør oppustet. Overlæben hvælvet, udeelt. Underlæbens Sideslignende meget korte, sædvanlig endende sig i Tænder; dens midterste Flig udbrandet. (Eller: Svælget tandet; Underlæben udbrandet). Støvknapperne Rum flæggede eller fryndse.

A. Stgl. opret. Bl. silkede, hjerteformige, tilspidsede, tandede eller savtakkede. Flere end 6 Blst. i hver Krands. 4.

1 U. *L. maculatum*. Plettet Løvetand.

Kronens Overlæbe spidst udbrandet. Næsten glat. Bl. ulige tandede. Blomsterkrandsene 10blomstrede. (Blst. røde). 1—2 F. 4. Jul. Ved Gårder. F. D. T. 1649.

2 U. *L. album*. Hvid Løvetand.

Kronens Overlæbe but, heelrandet. Lidt haaret. Bl. tandet-savtakkede. Blomsterkrandsene 12—20blomstrede. (Blst. hvide, med 3 smaae grønne Pletter indvendig). 1—2 F. 4. Maj, Jun. Ved Gårder. Ved Sorøe. F. D. T. 594.

B. Stgl. sædvanlig opstigende. Bl. butte, but tandede, indskaarne eller rundtakkede. ☉.

3 U. *L. purpureum*. Rød Løvetand.

Kronens Rør indvendig flægget. Stiohaaret. Bl. næsten hjerteformige, silkede, ulige but tandede. (Blst. røde). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Apr., Maj. I haver. Ved Sorøe. F. D. T. 523.

4 U. *L. incisum Smith*. Fliget Løvetand.

Kronens Rør indvendig uden Skæg. Underlæbens Sideslignende but tandede. Bl. hjerteformige, silkede, ulige indskaarne, temmelig glatte; de øverste sammentrængte. (Blst. røde). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul., Aug. Ved Veje og Diger. F. D. T.

5 U. *L. amplexicaule*. Riden Løvetand.

Tænderne paa Kronens Sideslignende utydelige. Bl. ved Blst. rundtattet-indskaarne. (Blst. røde). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj, Jun. Ved Gårder og Veje. Ved Sorøe. F. D. T. 752.

Ufart: intermedium. Bl. ved Blst. indskaarne. F. D. T. 1701.

12 Slægt. *Glechoma*. Rørsknop.

Væg, Skløvet. Kronens Rør langt; Overlæben Skløvet; Underlæben Skløvet; dens midterste Flig udbrandet. Støvknapperne sidde parviis i Form af to Rør.

1 *U. G. hederaceum.* Almindelig Korsknop.

Bøgerets Lænder sylformige. Næsten glat. Bl. nyreformig = rundagtige, rundtakkede. Stgl. sædvanlig krybende. (Blst. violet = blaae). 1-3 Lomm. 4. Apr. - Jun. Ved Gårder. Ved Sorøe. F. D. T. 789.

13 Slægt. *Nepeta.* Katteurt.

Bæg. Standet. Kronens Overlæbe udeelt. Underlæbens midterste Flig hattetformig (krammerhuusformig); Sidesligene ferte, butte, tilbagebøjede. Støvd. tætstaaende.

1 *U. N. Cattaria.* Almindelig Katteurt.

Bæg. hvidgraat, med langspidsede Lænder. Blomsterqvasterne i Bladhjørnerne, stilkede, eventil sammentrængte, danne et Kr. Bl. hjerteformig = ægformige, savtakkede, graalige. (Blst. hvide med røde Prikker). 2-3 F. 4. Jul. Ved Gårder. I Sorøe Strøde. F. D. T. 580.

14 Slægt. *Stachys.* Galtetand.

Bæg. Skløvet. Kronens Overlæbe udeelt; Underlæben 3kløvet; Sidesligene tilbagebøjede. Støvd. efter Blomstringen bøjede til Siderne.

1 *U. S. arvensis.* Ager = Galtetand.

Bæg. sædvanlig oddet, af samme Længde som Kronens Kør. Stgl. stivhaaret, svag. Bl. stilkede, hjerteformige, butte, rundtakkede. Blomsterkrandsene 4-6blomstrede. (Blst. lysrøde). 1-1 F. 0. Jul., Aug. Paa Ager. F. D. T. 587.

2 *U. S. silvatica.* Skov = Galtetand.

Bæg. tilspidsede. Stgl. opret, laaden = stivhaaret, tæt. Bl. hjerteformige, savtakkede = tandede, laadne. Blomsterkrandsene 6blomstrede. (Blst. mørkerøde; Underlæben hvidpletet). 2-3 F. 4. Jul. I Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 1102.

3 *U. S. palustris.* Smalbladet Galtetand.

Bæg. stikkende. Stgl. opret, hvashaaret med tilbage vendte Haar. Bl. omfattende, lancetformige, savtakkede, duunhaarede. Blomsterkrandsene 6-10blomstrede, stivhaarede, danne samlede et Kr. (Blst. røde). 1-2 F. 4. Jul., Aug. I Løvemoser og ved Grøfter. Ved Sorøe. F. D. T. 1103.

15 Slægt. *Leonurus.* Hjertespend.

Bæg. Standet, med Stak. Kronens Overlæbe udeelt; Underlæben 3kløvet, med udeelte Flige. Støvknappernes Rum parallelle.

1 U. L. *Cardiaca*. Almindelig Hjertespand.

Bægerets Lænder stikkende. Kronen længere end Bæg. (indvendig lysrød, udbvendig hviduldet); Underlæbens midterste Flig spids. Rodtbl. næsten haandformige, med indstaarne Flige. Bld. ved Blst. næsten lancetformige med 3 spidse Flige. Blomsterkrandsene mange, mangeblomstrede. 2—4 F. 4. Jul., Aug. Ved Gårder. Ved Sorø; ved Søverup. F. D. T. 727. En Usart T. 1756.

16 Slægt. *Ballota*. Landbæger.

Bæg. 5kantet, 10stribet, 5tandet. Kronens Overlæbe udeelt, lige, uden paa haaret; Underlæben 3kløvet; den midterste Flig udbrændt.

1 U. B. *nigra* *Smith*. Mørk Landbæger.

Bæg. oventil udvidet, næsten tragtformigt; dets Lænder næsten ægformige, oddede, udstaende, sædvanlig længere end Kronens Rør. Stgl. opret, haaret. Bld. ægformig = hjerteformige, duunhaarede, butte, rundtakkede = savtakkede. (Blst. violet = røde). Ved Gårder. Ved Sorø. F. D. T. 673.

17 Slægt. *Betonica*. Betonie.

Bæg. 5tandet. Kronens Rør langt, valseformigt; Overlæben udeelt, perpendicular, flad; Underlæben 3kløvet, den midterste Flig rundtakkede.

1 U. B. *officinalis*. Læge = Betonie.

Bæg. randhaaret, temmelig glat. Den midterste Flig paa Kronens Underlæbe sædvanlig udbrændt. Stgl. opstigende, noget slap. Bld. hjerteformig = aflange, rundtakkede. Rret mellembrudt, kort. 1—2 F. 4. Jul., Aug. 3 Skove. F. D. T. 726.

18 Slægt. *Marrubium*. Marube.

Bæg. 10stribet, 5- eller 10tandet. Kronens Overlæbe lige, ligebred, 2kløvet.

1 U. M. *vulgare*. Almindelig Marube.

Bægerets Lænder 10, børsteformig = krogformige. Bld. rundagtig = ægformige, tandede, aaretrunkede, hvidgraae. Blsttbl. børsteformige, krumme. (Blst. hvide.) 1½—2 F. 4. Jul., Aug. Paa grusede Steder. F. D. T. 1036.

III. Støvdragerne 2.

19 Slægt. *Lycopus*. Svartevæld.

Bæg. 5kløvet. Kronen rørformig, 4kløvet; den øverste Flig bredere, udbrændt; (eller Kronen 2kløvet; Overlæben udbrændt; Underlæben 3deelt). Støvdr. staae ud fra hverandre.

1 *U.* *L. europæus.* Almindelig Sværtevæld.

Lidt laaden. Stgl. rank. Bld. æg-lanceformige, bugtet-halvsinnede eller savtakkede. Krandsene mangelsomstrede. (Blst. smaae, hvide med rødplettede Flige). 2—3 F. 4. Aug. Ved Kåbredder og Grøfter. Ved Sorø; ved Fævejen. F. D. T. 1081.

20 Slægt. *Salvia.* *Salvie.*

Væg. 2kløvet, 3- eller 5standet. Kronens Overløbe hvalvet; Underløben 2kløvet. Støvsnavperne hæftede paa en Dværstilk.

1 *U.* *S. pratensis.* Eng-Salvie.

Væg. 5standet. Kronens Overløbe seglformig, klæbrig. Bld. hjerteformig-aflange, ulige rundtakkede, næsten indskaarne eller bugtede, rynkede, nedenunder laadne; de øverste omfattende. Blomstretandsens 6blomsrede, sædvanlig klæbrige. (Blst. blaae). 1—2 F. 4. Paa Enge. F. D. T.

10 Orden.

Verbenaceæ. Ternurtartede.

Væg. rørformigt. Kronen med Rør, sædvanlig uregelmæssig. Støvdr. sædvanlig 2 lange og 2 korte. 1 Frugtknude med 1 Griff. Frøegjemmet 2- eller 4rummet; 1 eller 2 Frøe i hvert Rum. Hviden sædvanlig 0. Embryonet opret. Bld. sædvanlig modsatte. Blst. sædvanlig i Halvsfjerne, Hoveder eller Nr.

1 Slægt. *Verbena.* Ternurt.

Væg. 5kløvet; een Tand sædvanlig kortere end de andre. Kronen uregelmæssig, 5kløvet. Støvdr. indsluttede. En 4frøet Hindefrugt, som aabner sig før Modenheden, saa at Frøene ved Modenheden synes nøgne.

1 *U.* *V. officinalis.* Almindelig Ternurt.

Stgl. opret, lidt hvasshaaret. Bld. 3kløvet-fligede, tandede, ujevne. Årene traadformige, danne en Top. Blst. noget adskilte (lys-violette). 1—2 F. 4. Jul., Aug. Ved Landsbyer og paa Kirkegaarde. Paa Bjernede Kirkegaard. F. D. T. 628.

11 Orden.

Orobanchææ. Skjælvodartede.

Væg. deelt. Kronen uregelmæssig, vedvarende. 2 lange og 2 korte Støvdr. 1 Frugtknude. 1 Griff. Et 2deelt Nr. En 2klappet, 1rummet Kapsel. Frøestolene befæstede

paa Klapperne. Mange Frøe. Hviden fjædet. Embryonet omvendt. Snylteplanter med Skjæl istedenfor Bl. Blst. paa Enden af Stg.

1 Slægt. Orobanche. Ghelqvæler.

Bæg. 4—5kløvet, omgivet med Blstbl. Kronen med Rør, Blæbet; Overlæben hvælvet; Underlæben 3kløvet, tilbagebøjet. Frøene befæstede ved Klappernes indbøjede Rande. * Bæg. næsten Blædet. Sædvanlig duunhaarede. Blst. i Nr.

1 U. O. caryophyllacea. Kruiset Ghelqvæler.

Kronens Overlæbe udrandet; Underlæbens Flige butte, freyndset = krusede. Støvdr. nedentil haarede. Frugtkauden glat. Arret bruunt. (Blst. lysrøde). 1—2 F. 4. Jul. 3 Kratføve. F. D. T.

2 U. O. elatior Sutt. Høj Ghelqvæler.

Kronens Krave paa alle Sider smaat = rundtattet; Overlæben udrandet; Underlæbens Flige omtrent lige store. Støvdr. ved Grunden duunhaarede. Griff. glat. Arret guult. Blst. (lyserøde) i et tæt Nr, mange. Blstbl. omtrent af Kronens Længde, slappe, tilbagebøjede. 1—2 F. 4. Jul., Aug. 3 Krat, især paa Rødderne af *Centaurea Jacea*. F. D. T. 1338.

3 U. O. minor Smith. Lidet Ghelqvæler.

Kronens Overlæbe heelrandet; Underlæben med butte Flige, bøjet; den midterste Flig stærk, 3kløvet. Støvdr. ved Grunden randhaarede. Griff. glat. Skaflets Skjæl adskilte. Arret saabloomjret. (Blst. lysegule). $\frac{1}{2}$ —1 F. Jul., Aug. 3 Kratføve. F. D. T. 1219.

4 U. O. ramosa. Grenet Ghelqvæler.

Bæg. 4kløvet, næsten regelmæssigt. Kronens Rør ved Grunden haaret. Kraven regelmæssig, 5kløvet. Støvdr. glatte, iadsluttede. Skaflet grenet. Blst. (lyseblaae) i Nr, adskilte, afværende. Blstbl. enkelte, af Bægerets Længde (eller 3 sammen, hvoraf det midterste er bredest). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4 (?). Aug. Paa Rødderne af andre Planter, især paa Hamp og Tobak. F. D. T.

2 Slægt. Lathræa. Skjælvrod.

Bæg. Aedeelt, farvet, omgivet med Blstbl. Kronen Blæbet; Overlæben udeelt eller 2kløvet; Underlæben 3randet. Støvkapperne pølsformige, haarede. Kapsl. 2klappet. Frøestolene danne ufuldstændige Skillevægge.

1 U. L. Squamaria. Bruun Skjælvrod.

Roden og Skaflet belagte med Skjæl. Skaflet enkelt. Blst. i en arformig, eensidig Klasse. Blstbl. i 2 Rader paa den modsatte Side. (Bæg. rødt. Kronen lysrød, med hvidt Rør). $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. 3 Skove paa Rødderne af Træer. F. D. T. 136.

12 Orden.

Lentibulariæ. Blæverodartede.

Kronen Blæbet, med Spore. Støvdr. 2. Støvkapperne enkelte. Kapsl. Trummet, mangefræet. Frøestolene i Midten. Hviden 0. Vand- eller Sumpplanter.

1 Slægt. **Pinguicula.** Vibesidt.

Væg. Blæbet; Overlæben 3fløvet; Underlæben 2fløvet. Kronen gabende; Overlæben 2fløvet; Underlæben 3fløvet. Støvdr. meget korte. Arret 2fløvet. Et 1blomstret Skaft.

1 *U. P. vulgaris.* Almindeligt Vibesidt.

Sporen næsten valsførmig, lige, af Kronens længde. Kronens Flige aflange, næsten lige store. Bl. aflange, overtrukne med en sidtagtig Vædste, indbøjede i Randen. (Blst. mørkeblaae) 2—5 L. 24. Maj, Jun. Paa vaade Enge. F. D. T. 93.

2 Slægt. **Utricularia.** Blæverod.

Væg. Bladet. Kronen masseførmig. * Vandplanter med Blæver paa Rødderne eller Bl. Bl. samlede ved Roden, deelte, haarførmige. Skaftet opret, udeelt, faablomstret. Blst. Bl. æg- eller lancetførmige. Blst. gule.

1 *U. U. vulgaris.* Almindelig Blæverod.

Sporen kugledannet. Overlæben af Ganens længde. Bl. finnet-mangedeelte, med Blæver. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 24. Jun., Jul. 3 Vand. 3 Blommen. F. D. T. 138.
Ufart: neglecta. Underlæben flad. F. D. T. 1981.

2 *U. U. intermedia.* Storblæbet Blæverod.

Sporen kugledannet. Overlæben dobbelt saa lang som Ganen. Bl. 3deelte; Fligene tvædeelte. Rødderne med Blæver. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 24. Jul. 3 Vand. F. D. T. 1262.

3 *U. U. minor.* Liden Blæverod.

Sporen kjolet, kort. Overlæben af Ganens længde. Bl. 3deelte, med Blæver; Fligene tvædeelte. 3—4 Komm. 24. Jun., Jul. 3 Vand. F. D. T. 128.

13 Orden.

Primulacæ. Hjulblomster.

Kronen sædvanlig 5fløvet og regelmæssig. 1 Støvdr. indenfor hver af Kronens Flige. 1 Frugtknude med 1 Griff. og 1 Ar. Frøegjemmet Trummet, sædvanlig en Kapsel med 10 eller 5 Klapper. Frøestolen i Midten. Hviden kjedet, omgiver Embryonet. Urter.

1 Slægt. *Primula*. Koedriver.

Bæg. rørformigt, Sklovet eller Standet. Kronen med Rør og Sklovet Krave. Kaps. mangefrøet, aabner sig i Spidsen med 10 Tander. * Stgl. 0. Bld. omtrent aflange, ubeelte, butte.

A. Bæg. Skantet, duunhaaret. Bld. aflange, tandede, rynkede, nedenunder laadne.

1 N. *P. veris Willd. P. officinalis Roth. P. veris a officinalis Linn.*

Huulkravet Koedriver.

Kronens Krave huul, kort. Skaflet opret, trindt, duunhaaret, bærende en enkelt Skjerm med Svøb. Blst. rikkende (æggeblommegule med 5 bruungule Pletter ved Svølget). $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. 4. Apr. Paa aabne Steder i Skove. Ved Sorø. F. D. T. 433.

Ufart: Med fyldte Blomster.

2 N. *P. acaulis Allioni. P. veris γ acaulis Linn.* Rodstillet Koedriver.

Kronens Krave flad, meget stor. Mange eenblomstrede, haarede Blst. komme ud fra Roden. (Blst. bleggule, med en mørkgul Stjerne i Midten). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Apr. 3 Skove. F. D. T. 194.

3 N. *P. elatior Jacquin. P. veris β elatior Linn.* Gladkravet Koedriver.

Kronens Krave flad. Skaflet opret, trindt, duunhaaret, bærende en enkelt Skjerm med Svøb. Bld. paa begge Sider laadne. (Blst. sædvanlig svøvgule, uden Lugt). $\frac{3}{4}$ —1 F. 4. Apr. 3 Skove. 3 Søeffoven. F. D. T. 434.

Ann. Omendkjøndt disse Arter, dyrkede, upaatvilelig løbe over i hinanden, kunne de dog maaskee holdes for mere end blotte Ufarter, da de i den vilde Tilstand holde sig adskilte.

4 N. *P. farinosa.* Melet Koedriver.

Bægerfligene noget butte. Kronens Krave flad (violet=rød), næsten af Rørets Længde; Mundingen besat med Kjertler. Bld. spatelformig=lanceformige, rundtakket=tandede, nedenunder melete. Skaflet glat, trindt, bærer en mangelblomstret Skjerm med Svøb. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. April. Paa Enge. Ved Bringstrup. F. D. T. 125.

2 Slægt. *Hottonia*. Hottonie.

Bæg. Sdeelt. Kronen med Rør og Sklovet Krave. Griff. vedvarende. Kaps. fugleformig, ikke opspringende.

1 N. *H. palustris.* Kjør = Hottonie.

Kronen længere end Bæg., huulkravet (rødlig=hvid, sjældnere rød). Stgl. under Vandet bladet, over Vandet nøgen. Bld. kamformig=halsfannede. Blst. i Krandsen paa Enden af Stgl., stilkede.

Stykkerne af Stgl. mellem Krandsene jevntykke. $\frac{1}{2}$ —1 F. ovenfor Vandet. 4. Jun., Juli. 3 Vand. Ved Sorøe. F. D. T. 1062 og 1867.

Anm. Støvdr., som efter den linneiske Character skalde sidde ovenfor Kronens Rør, træffes snart siddende ovenfor dette, snart i det.

3 Slægt. *Trientalis*. Skovstjerne.

Væg. 5—8deelt. Kronen hjulformig, 5—8deelt. Kapsl. bæragtig, mangefrøet.

1 N. *T. europæa*. Almindelig Skovstjerne.

Stat. Stgl. udeelt; den bærer paa Enden 5—6 aflang=lancetformige, heelrandede Bld. i en Krands og 1—4 eenblomstrede Blstik. (Blst. hvide). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun. 3 højtliggende Skove. 3 Gyrstinge Skov. F. D. T. 84.

4 Slægt. *Lysimachia*. Fredløs.

Væg. Sklovet. Kronen hjulformig, 5deelt. Støvdragernes Stifter ved Grunden udvidede, næsten sammenvorne. Kapsl. kugleformig, 5- eller 10klappet. * Bld. modsatte eller sjeldnere 3hobede, udeelte, heelrandede. Blst. gule.

A. Blstik. flerblomstrede. Stgl. opret.

1 N. *L. vulgaris*. Almindelig Fredløs.

Duunhaaret. Bld. modsatte eller 3hobede, aflang=lancetformige. Blomsterklaserne paa Enden af Stgl., sammensatte. 2—4 F. 4. Jul. Ved Grøfter og Gjerder paa sde Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 689.

2 N. *L. thyrsoflora*. Duffet Fredløs.

Stat. Støvdr. længere end Kronen. Bld. modsatte, lancetformige, siddende, prikkede. Blomsterdustene i Bladhjørnerne, stilkede, ægformige. $1\frac{1}{2}$ —2 F. 4. Jun., Jul. Paa sde Steder. Ved Sorøe Søe. F. D. T. 517.

B. Blstik. eenblomstrede, i Bladhjørnerne. Glatte. Stgl. liggende. Bld. modsatte.

3 N. *L. nemorum*. Urveagtig Fredløs.

Støvdr. jevne. Stgl. nedentil rodstødende. Bld. ægformige, spidse, forstilkede. Blstik. længere end Bld. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Jun., Jul. 3 Skove. F. D. T. 174.

4 N. *L. Nummularia*. Pengebladet Fredløs.

Støvdragernes Stifter fjertlede. Stgl. krybende. Bld. kredsformig=hjerteformige. Blstik. fortere end Bld. 1—2 Lomm. 4. Jun., Jul. Paa fugtige, noget skyggesfulde Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 493.

5 Slægt. *Anagallis*. Urve.

Bæg. 5deelt. Kronen hjulformig, 5deelt. Støvdragernes Stifter nedentil laadne. Kapsf. opspringende paa Tværs, manglefret. * Blatte Urter. Stgl. Afantet. Bld. modsatte, nedenunder brunprykkede, heelrandede, 3—5nervede. Blst. eenlige, stilkede, i Bladhjørnerne.

1 U. *A. phoenicea Lamarek*. *A. arvensis* β *Linn.* Rød almindelig Urve
Horn. Plant. 3 Udg. Rød Urve Horn. Plant. 2 Udg.

Bæg. heelrandet. Kronen i Randen hjertlet (sædvanlig lys-skarlagenrød). Stgl. fremliggende. Bld. ægformige. 1—4 Lomm. ☉. Jun., Jul. Paa Agre. Ved Sorøe. F. D. T. 88.

Ufart: carnea. Blst. fjødsfarvede.

2 U. *A. coerulea Schreber*. *A. arvensis* α *Linn.* Blaa almindelig Urve
Horn. Plant. 3 Udg. Blaa Urve.

Bæg. smaat taffet. Kronen uden Hjertler (blaa). Stgl. sædvanlig opret. Bld. aflang-ægformige. 3—6 Lomm. ☉. Paa Agre. F. D. T. 1570.

6 Slægt. *Centunculus*. Centunkel.

Bæg. 4deelt. Kronen næsten klokkeformig, 4kløvet. Kapsf. opspringende paa Tværs. * Bld. afværlende, siddende, heelrandede. Blst. kortstilkede, i Bladhjørnerne, hvide.

1 U. *C. minimus*. Grenet Centunkel.

Stgl. opret, grenet. Bld. bred-ægformige. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Lomm. ☉. Jun, Jul. Paa tørre Steder. F. D. T. 177.

2 U. *C. simplex Hornemann*. Udeelt Centunkel.

Stgl. opret, udeelt, saabtomstret. Bld. ovale, tilspidsede i Enden og ved Grunden. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ L. ☉. Jul. Paa Enge. F. D. T. 1567.

7 Slægt. *Samolus*. Samel.

Bæg. vexet til det Nederste af Frugtknuden. Kronen halv oversædig, næsten fladkravet; Kraven 5kløvet, med 5 Tænder mellem Fligene. Kapsf. opspringende i Spidsen med 5 Tænder.

1 U. *S. Valerandi*. Strand-Samel.

Bæg. but. Bld. alle omvendt ægformige, butte. Blst. i en halvskjermformig Klase; Smaa-silkene med et Blstbld. paa Midten. (Blst. hvide). $\frac{1}{2}$ —1 F. ♂. Jul. Ved sandige Bredder af Havet og Karr. F. D. T. 198.

8 Slægt. **Glaux.** Sandkryb.

Bæg. 5deelt, farvet. Kronen 0. Støvdr. paa Frugtbanden. Kapsl. 5frøet.

1 U. **G. maritima.** Almindelig Sandkryb.

Stgl. opstigende. Bld. siddende, de nederste afværlende, de øverste modsatte, aflange, prikkede, glatte. (Blst. lysrøde). 3-4 Lomm. 4. Sun., Sul. Ved Strandkanterne. F. D. T. 548.

Anm. Efter de bedste Botanikers Autoritet har jeg sat denne Slægt i Familien Primulaceæ, kjendt, efter min Mening, ligesaa vægtige Grunde tale for enten at hense den til Eleagneæ eller at lade den udgjøre en Familie for sig. En nøje Undersøgelse af Frøet vil gjøre det lettere at opløse denne Tvivl.

Hex. See 2 Underklasse 1 Afdeling 1 Orden 2 Ufsnit *).

Montia. See 2 Underklasse 1 Afdeling 10 Orden.

Plantago. }
Littorella. } See 4 Underklasse 2 Orden.

*) Paa dette Sted ere et Par Linier glemte. Efter Ordene: 1 Slægt. Hex. Christorn. skal staae:

Bæg. 4tandet. Kronen hjulformig. Bærret 4frøet.

1 U. **I. Aquifolium.** Almindelig Christorn.

Efterskrift.

Imod Forventning har Haandbogen, som skulde indeholde Danmarks og Solskens phanerogame Planter, ikke kunnet fuldendes i dette Hæfte. Det, som endnu staaer tilbage, er:

1 Klasse 4 Underklasse: Dicotyledones Monochlamydeæ

med Ordenerne:

Plumbagineæ,
Plantagineæ,
Amarantaceæ,
Chenopodeæ,
Polygoneæ,
Thymelææ,
Santalaceæ,
Elæagneæ,
Aristolochiaceæ,
Euphorbiaceæ,
Empetreaæ,
Urticeæ,
Amentaceæ,
Coniferaæ,

og 2 Klasse's 1 Underklasse: **Monocotyledones Phanerogamæ**

med Ordenerne:

Hydrocharideæ,

Orchideæ,

Irideæ,

Amaryllideæ,

Tulipaceæ,

Smilaceæ,

Asphodeleæ,

Colchicaceæ,

Junceæ,

Butomeæ,

Alismaceæ,

Juncagineæ,

Fluviales,

Typhaceæ,

Lemnaceæ,

Aroideæ,

Cyperaceæ,

Gramineæ.

Rettelse til første Hæfte.

Side 49, Lin. 15. Læs: Pyrola, Ledum. Sec 2 Underklasse 4 Afdeling 2 Orden.