



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Haandbog

ved

botaniske Excursioner

i Egnen om Sorø.

Første Hæfte.

Indbydelseskrift

til Examen Artium ved Sorø Akademie og Skolens Hovedexamen

den 16^{de} Juli 1834 og følgende Dage.

af

S. H. Bredsdorff,

Lector i Mineralogie og Botanik ved Akademiet.

Kjøbenhavn.

Trykt hos Andreas Seidelin,

Hof- og Universitets-Bogtrykker.

Nyckjöbing Cathedralskole.

Hvide (albumen), en fjødet, melet eller hornagtig Masse i Frøet, som ikke hænger ved Kimet.

hængende (pendulus, om Frøet), befastet ved Frøegjemmets øverste Deel.
Kjernerstykker (cotyledones), de Dele af Frøet, som umiddelbart hænge ved Kimet, og sædvanlig blive til Frøblade.

fløftet (fissus), som har indgaaende Vinkler, Bugter eller Indsnit.

ligebred (linearis), hos Hornemann lineformig.

opret (erectus, om Frøet), befastet ved Frøegjemmets nederste Deel.

Følgende Forkortninger ere brugte:

Stgl. Stangel, Bld. Blad, Bldstf. Bladstilk, Blst. Blomst, Blststf. Blomsterstilk, Bæg. Bæger, Støvdr. Støvdrager, F. Fod, Lomm. Lomme, F. D. Flora Danica, foruden flere, som let kunne forstaaes.

De anførte Maal betegne Plantens Højde fra Jorden. © betegner en eenaarig, ♂ en 2aarig, ♀ en fleeraarig Urt, og h en Busk eller et Træ. Naar en Maaned nævnes, er det den, hvori Planten blomstrer.

* betyder, at de derefter anførte Kjendetegn ikkun tilkomme de indenlandske Urter.

Andet Hæfte, som skal indeholde de øvrige Planter med tydelige Blomster, ventes at kunne udkomme næste Aar.

S. H. Bredsdorff.



Første Klasse.

Dicotyledones. Lobbladspirende.

I Blomstens Delc hersker sædvanlig Femtallet. Embryonet bestaaer af 2 Kjerne-
stykker, sjeldnere af flere. Rodspidsen forlænger sig ved Spiringen, og bliver selv til Rod.
Bladene sædvanlig med greneede Aarer.

Første Underklasse.

Thalamifloræ. Grundblomstrede.

Et Bøger tilstebe. Kronen siddende paa Frugtbunden, sædvanlig fleerbladet,
sjelden 0. Støvdragerne siddende paa Frugtbunden, sjelden paa Kronen, sædvanlig flere
end Kronbladene.

1 Afdeling.

Lipocalyces. Løsbægrede.

Bøgeret fleerbladet, af finere Substantis end Bladene, sædvanlig affaldende før
Frugten modnes. Løz, Trez eller Fivetallet ofte herskende ved Bøgerbladene, Kronbladene og
Støvdragerne. Totallet ofte herskende ved Frugtberens Delc. * Stængelbladene sædvanlig ikke
modfatte. Arelbladene 0.

1 Orden.

Ranunculaceæ. Ranunkelartede.

Bøgeret farvet, oftest affaldende tilligemed Støvdragerne. Støvdr. flere end 4,
frie. Støvknapperne aabne sig udad (undt. i 4de Affnit). 1 Griffel paa hver Frugtknude.

(1)

Frøene bedækkede. En hornagtig Hvide. Embryonet meget lidet, i en Fordybning paa den ene Ende af Hviden. * Urter. Stængelbladene, naar de ere tilstede, afverlænde.

1 Uffnit.

Anemoneæ. Anemoneartede.

Mange (over 10) Støvdragere. Mange Frugtbære. Frøegjemmerne ere eenfrøede Hindefrugter. Frøet hængende (o: befæstet ved den øverste Ende af Frøegjemmet, med Rodspidsen opad). Bladene fløstede.

1 Slægt. *Thalictrum*. Frøestjerne.

4—5 Vægerbl. Kronen O. Frøegjemmerne uden Hale. Blst. i en Top eller Klase. * 4 Vægerbl. Støvdr. længere end Væg. Frøegjemmerne furede. Roden træulet. Stgl. opret, bladet, glat. Bl. glatte, dobbelt eller 3dobbelt finneede. Smaabl. indskaarne.

1 U. *T. minus*. Lidet Frøestjerne.

Stgl. furet. Bl. 3dobbelt finneede. Smaabl. 3kløvede. Blst. lodende, i en udbredt Top. 1 F. 4. Juli. Ved Strandbredder. F. D. T. 732.

2 U. *T. flavum*. Gul Frøestjerne.

Stgl. kantet, furet. Bl. dobbelt finneede. Smaabl. 3kløvede. Blst. sædvanlig oprette, i en tæt Top. 2—3 F. 4. Juli, Aug. Ved Bakke og i Moser. Paa Steensbøg Eng og ved Flommen. F. D. T. 939.

3 U. *T. elatum*. Høj Frøestjerne.

Stgl. trind, ikke furet. Bl. 2—3dobbelt finneede. Smaabl. ægformig=hjerteformige, kun lidet indskaarne. Blst. oprette, i en udbredt Top. 2—4 F. 4. Juli, Aug. 3 Skove. F. D. T.

2 Slægt. *Anemone*. Anemone.

Et trebladet Svøb i nogen Afstand fra Blst. med noget indskaarne Smaabl. Vægerbl. 5—15, kronbladagtige, længere end Støvdr. Kronen O. * Haarede Planter. Et enkelt, opret, trindt Skaft.

A. Svøbets Smaabl. siddende, mangedeelte, med ligebrede Flige. Vægerbl. 6, sammensiddende, udenpaa haarede. Frøegjemmerne med en langhaaret Hale. Skaftet eenblomsret. Bl. dobbelt finneede, indskaarne.

1 *N. A. Pulsatilla Linn. Pulsatilla vulgaris Miller.* Almindelig Koehjelde.

Bægerbl. rette. Blst. ludeude (blaa-violet). $\frac{1}{2}$ F. 4. April, Maj. Paa Enge ved Skove. 3 Plantagen ved Bromme. F. D. T. 153.

2 *N. A. pratensis Linn. Pulsatilla pratensis Miller.* Eng Koehjelde.

Bægerbl. i Spidsen tilbagebøjede. Blst. hængende (mørkeblaa). $\frac{1}{4}$ F. 4. Maj, Juni. Paa høje Enge. F. D. T. 611.

B. Svøbets Smaaabl. silkede, 3deelte, indskaarne. Blstst. 1 ell. 2, eenblomsfede, nøgne. Bægerbl. 5—6, noget udbredte, glatte. Frøegjemmerne uden Hale. Roden valserformig, fjødet, næsten vandret. Bl. silkede, 3—5koblede, dybt indskaarne, takkede.

3 *N. A. nemorosa.* Hvid Anemone.

Svøbet eenblomsfret. Bægerbl. 6, aflange, hvid- eller rødagtige. $\frac{1}{2}$ F. 4. April, Maj. 3 Skove. Ved Sorø. F. D. T. 549 *).

4 *N. A. ranunculoides.* Ranunkelartet Anemone.

Svøbet 1—2blomsfret. Bægerbl. 5—6, rundagtig-aflange, gule. $\frac{1}{2}$ F. 4. April, Maj. 3 Skove. Ved Christiansminde; paa Halsøen i Sorø Søe efter Prof. S. C. Molbech. F. D. T. 140.

3 Slægt. *Hepatica.* Simmer.

Et trebladet, eenblomsfret Svøb tæt ved Blst. Smaaabl. udeelte. Bægerbl. 6—9, kronbladagtige, længere end Støvdr. Kronen O. Frøegjemmerne uden Hale. Flere 1blomsfede Skafter fra 1 Rod.

1 *N. H. triloba Chaix.* Anemone *Hepatica Linn.* Blaa Simmer.

Bl. 3lappede, heelrandede; Lapperne noget spidse. Skafterne og Bladst. lidt haarede. (Blst. sædvanlig blaa). $\frac{1}{4}$ F. 4. April. 3 Skove, især Kratškove. 3 Søestoven; i Philosophgangen. F. D. T. 610.

Ann. Denne og den foregaaende Slægt kunde meget vel, som hos Linné, være forenede.

4 Slægt. *Adonis.* Adonis.

Bæg. 5bladet, tiltrykt. Kronbl. 5—15 uden Honninggjemme. Hindefrugterne ærformig sammenhobede paa den forlængede Frugtbund, ærformige, tilspidsede ved en kort Griffel. Embryonet ærformigt; Kjernestykkerne staae lidt ud fra hinanden. Stængelbl. mangedeelte.

*) En Monstrositet, hvori de 3 yderste Bægerbl. havde faaet Form, Farve og Structur som Svøbblade, har jeg fundet i Philosophgangen.

1 *A. autumnalis.* Høst: Abonit.

Bæg. glat. Kronbl. 6—8, hule, sammenbøjede, kun lidt større end Bægerbl. Hindefrugterne næsten netformig rynkede, samlede i en ægformig=valsformig Klynge. St. Stgl. opret, grenet. Bl. dobbelt halvfinnet; Fligene ligebred=traadformige. Blst. eenlige (højrede). 1—1½ F. ☉. Juli, Aug. 3 Korn. F. D. T.

2 *A. f. nit.*

Ranunculeæ. Ranunkellignende.

Bæger- og Kronbladene, før de aabne sig, tegllagte. Kronbl. 2-læbede eller indvendig ved Neglen forsynede med et Skjæl. Mange eenfrøede Hindefrugter. Frøet opret (o: med Rodspidsen nedad).

1 Slægt. *Myosurus.* Muskehale.

Bæg. 5-bladet. Bægerbl. forlængede nedenfor Tilhæftningspunktet. 5 (smaa) Kronbl. med en traadformig=rørformig Negl. Stovdr. 5—20. Hindefrugterne 3-læbede, ægformig sammenhobede paa den stærkt forlængede Frugt bund, lidt tilspidsede ved en kort Griffel. Eenblomsfrøede Skafter. Bl. heeltrandede.

1 *A. M. minimus.* Liden Muskehale.

Glat. Bl. næsten ligebrede, af samme længde som Skafterne. (Blst. gullagtige). 2 L. ☉. Maj, Juni. Paa tørre Steder. Ved Sorøe *). F. D. T. 406.

2 Slægt. *Ranunculus.* Ranunkel.

Bæg. 5-bladet. Bægerbl. ikke nedentil forlængede. Kronbl. 5 (ell. flere) indvendig nedentil forsynede med et Skjæl eller i det Mindste med en kjendelig Fordybning. Stovdr. og Frugtbørene mange. Ægformige, lidt sammentrykte Hindefrugter, endende sig i en Spids eller et Horn, som sjelden er længere end Frøet, samlede i en kugleformig eller cylindrisk Klynge. * Stgl. bladet, trind. Blst. eenlige.

A. Batrachium. Frøegjemmerne rynket; sribede paa Tværs. Kronbl. med en Grube ved Neglen. Bl. glatte. Blst. hvide med en gual Plet neden til. Vandplanter.

*) Dog har jeg kun fundet den i en Urtepotte, hvori den af sig selv var kommen op.

1 *N. R. hederaceus*. Vædbende; Ranunkel.

Kronbl. aflange, neppe længere end Bøgerbl. Stovdr. 5—12. Hindefrugterne glatte. Stgl. krybende. Bl. nyreformig = rundagtige, 3—5-lappede. Fligene brede, udeelte, meget stumpe. $\frac{1}{2}$ F. 24. Juni—Aug. Paa fugtige Steder, især ved rindende Vand. F. D. T. 321.

2 *N. R. aquatilis*. Vand; Ranunkel.

Kronbl. omvendt ægformige, større end Bøgerbl. Stgl. svømmende eller krybende. Bl. enten rundagtige, 3deelte, indskaarne, eller mangedeelte med haarformige Flige. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 24. Maj—Aug. I Vand.

- a) heterophyllus. De øverste Blade (over Vandet) 3deelte, de nederste (under Vandet) haarformige, mangedeelte. F. D. T.
- β) capillaceus. Alle Bl. under Vandet, silkede, deelte i traadformige Flige. F. D. T.
- γ) cæspitosus. Alle Bl. over Vandet, rundagtige, deelte i fra hinanden staaende Flige. F. D. T.
- δ) stagnatilis. Alle Bl. under Vandet, siddende, haarformig mangedeelte. F. D. T.
- ε) peucedanifolius. Alle Bl. under Vandet, silkede, deelte i lange parallelle Flige. F. D. T. 376.

Num. Om alle disse af de Candolle anførte Afarter forekomme i Danmark, er uvist.

B. Hecatonia. Frugten rundagtig, sjældnere noget aflang. Frøegjenmerne jævne, rundt agtig ægformige. Kronbl. med et (undertiden meget kort) Skjæl. Roden trævlet.

- a) Blst. gule. Stgl. glat. Bl. udeelte, ligebrede eller lancetformige, ovenpaa glatte.

3 *N. R. Lingua*. Langbladet Ranunkel.

Stgl. oprejst. Bl. lancetformige, heelrandede ell. lidt savtaktede, halvomsfattende. 2—3 F. 24. Jul. Ved Bredder af Aar og Søer. Ved Sorøe Sø og Grøfterne i Flommen. F. D. T. 755.

4 *N. R. Flammula*. Nebbøjet Ranunkel.

Stgl. ved Grunden nedliggende. Bl. glatte, ligebrede, lancetformige ell. næsten ægformige, de nederste silkede. $\frac{1}{2}$ F. 24. Jun.—Aug. Paa sive Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 575.

Num. Den findes oftest med heelrandede, men undertiden med tandede Bl.

5 *N. R. reptans*. Krybende Ranunkel.

Stgl. krybende, rodstyvende ved alle Led. Bl. ligebrede. 1—2 L. 24. Jul., Aug. Ved Bredderne af Moser og Søer. Skal være funden ved Sorøe af Prof. J. C. Molbech. F. D. T. 108.

- b) Blst. gule. Den blomsterbærende Stgl. opret, fleerblomstret. Bl. kløstede, de nederste silkede.

6 N. R. sceleratus. Tigger; Ranunkel.

Bæg. næsten glat. Frugten aflang. Bld. glatte. Rodbld. 3deelte, Fligene 3lappede, flumpe, undertiden indskaarne. De øverste Bld. 3deelte; Fligene aflang = ligebrede, heelrandede. Bld. ved Blst. aflange. 2 F. ☉. Jun.—Aug. I Grøfter og paa vaade Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 571.

7 N. R. auricomus. Nyrebladet Ranunkel.

Bæg. farvet, duunhaaret, kortere end Kronbld. Rodbld. næsten nyreformige, sædvanlig tredeelte ell. treslappede. Stængelbld. fingerformig deelte med ligebrede Flige. 1½—2 F. ☿. April, Maj. I Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 665.

Anm. Den forekommer undertiden uden Kronbld.

8 N. R. bulbosus. Logrodet Ranunkel.

Bæg. tilbagebøjet. Rodbld. 3koblede ell. dybt 3deelte; Smaa bld. indskaarne. Stgl. faablomstret, ved Grunden løgformig. Blomsterstf. furede. ½—1 F. ♃. Maj—Jul. Paa tørre Marker. Ved Sorøe. F. D. T. 551.

9 N. R. repens. Vandgrenet Ranunkel Viborg. Krybende Ranunkel Hornemann.

Bægerbld. trykte til Kronen. Frøegjemmerne med en ret Spids. Stgl. skyder sædvanlig krybende Vandgrene. Bld. 3koblede ell. dobbelt 3koblede. Smaa bld. 3klovede, kileformige ved Grunden. Blomsterstf. furede. 1 F. ♃. Jun.—Aug. Paa dyrkede Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 705.

10 N. R. polyanthemos. Mangleblomstret Ranunkel.

Bæg. haaret, ikke tilbagebøjet. Frøegjemmerne butte, med en liden Kroge. Stgl. haaret. Bld. mangedeelte med ligebrede Flige. Blomsterstf. furede. 1 F. ♃. Jul. Ved Byer og i haver. F. D. T. 1700.

11 N. R. acris. Vidende Ranunkel.

Bæg. blødhhaaret. Frøegjemmerne endes i en næsten ret Braad. Stgl. mestendeels duunhaaret. Bld. 3—5deelte; Fligene ligebrede, indskaarne, spidse; de øverste ligebrede, heelrandede. Blomsterstf. trinde, uden Furer. 1—2 F. ♃. Jun., Jul. Paa Enge og Marker; i Kratføve. Ved Sorøe. F. D. T.

12 N. R. lanuginosus. Uldhaaret Ranunkel.

Bægerbld. tiltrykte. Frøegjemmerne sammentrykte, med en krum Braad. — Løvhhaaret. Bld. 3—5deelte; Fligene brede, buttakkede, glindsende af guulagtige Haar. Blststf. trinde, uden Furer. 2—3 F. ♃. Jul. Paa Enge. F. D. T. 397.

C. Echinella. Frugten kugleformig. Frøegjemmerne sammentrykte, vortede eller piggede. Noden trævlet. Stgl. flerblostmstrede. Bld. kløfede. Blst. gule.

13 *N. R. Philonotis.* Stivhaaret Ranunkel.

Bægerbl. tilbagebøjede, især efter Blomstringen. Frøegjemmerne i Randen besatte med smaae Vorter. Stgl. opret, haaret. Bl. dybt 3kløvede eller 3koblede, indskaarne, haarede. Blst. furede. $\frac{1}{2}$ —1 F. J. Jul, Aug. Paa Enge, især ved Strandkanterne. F. D. T. 1453.

14 *N. R. arvensis.* Uger Ranunkel.

Bæg. aabent, haaret. Frøegjemmerne spidspiggede. Stgl. opret, temmelig glat. Bl. glatte, de nederste dobbelt 3koblede. Smaa-bl. ligebrede. De øverste Bl. 3deelte. 1— $\frac{1}{2}$ F. O. Maj, Jun. Smellem Korn. F. D. T. 219.

15 *N. R. parviflorus.* Smaa-blomstret Ranunkel.

Bægerbl. tilfældigt tilbagebøjede. Frøegjemmerne vortede. Stgl. fremliggende, haarede. Rod-bl. næsten kredsrunde, 3- eller 5lappede, indskaarne; de øverste fortskiftede, 3deelte. Bl. ved Blst. lancetformige, laadne. 1—2 Tom. O. Juli. Paa tørre Steder. F. D. T. 1218.

3 Slægt. *Ficaria.* Vorterod.

Bæg. 3—5bladet, affaldende. Kron-bl. 8—12, ulige store, indvendig med et Skjæl. Støvdr. mange. Frøegjemmerne mange, jævne, sammentrykte. Glatte, fleeraarige Planter.

1 *N. F. ranunculoides* Mönch. *Ranunculus Ficaria* Linn. Hjertebladet Ranunkel.

Kron-bl. aflange (gule). Roden knippeformig knoldet; Knolderne aflange. Stgl. opstigende, bladet. Bl. hjerteformige, bugtede. $\frac{1}{2}$ F. 4. Apr.—Jun. Paa skyggesfulde Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 499.

3 Afsnit.

Helleboreæ. Nyserodartede.

Bæg. og Krone før Blomstringen tegllagte. Bæg. kronbladagtigt. Kron-bl. 0 ell. smaae og mere ell. mindre hule (Gønninggjemmer Linn.) Flerfrøede, Irummede, 2klappede Kapsler, som aabne sig indentil. * Stgl. trind. Bladene af rundagtigt Omfang, indskaarne eller takkede, mestendeels glatte. Blst. i Enden af Stgl., eenlige ell. i Nr.

1 Slægt. *Caltha.* Rabbeleje.

Bæg. farvet, 5bladet. Bægerbl. næsten kredsrunde. Kron-bl. 0. Støvdr. mange. Kapslerne 5—10 sammentrykte, frastaaende. Fleeraarige, glatte Urter.

1 *N. C. palustris.* Almindelig Rabbeleje.

Bægerbl. affaldende (stærkt gule). Stgl. opret ell. opstigende, bladet. Bl. nyreformig-hjerteformige, rundtakkede. $\frac{1}{2}$ F. 4. Apr., Maj. Paa vaade Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 668.

2 Slægt. *Trollius*. Engblomme.

Bæg. farvet, 5, 10; ell. 15bladet. Bægerbld. affaldende, kronbladagtige. Kronbld. smaae, nedentil rørformige, eenlæbete. Støvdr. mange. Kapslerne mange, siddende, næsten cylindriske. Fleeraarige, oprejste, glatte Urter.

1 A. *T. europæus*. Almindelig Engblomme.

Bægerbld. omtrent 15, sammenbøjede næsten til en Kugle (gule). Kronbld. 5—10, af Støvdragernes Længde. Bld. 5; ell. 7deelte, indskaarne. 1—2 F. 4. Maj, Jun. Paa Enge. Ved Parnas. F. D. T. 133.

3 Slægt. *Eranthis*. Winterblomme.

Et Svøb, kløftet i flere Flige, umiddelbart under Blst. Bægerbld. farvede, kronbladagtige, affaldende. Kronbld. 6—8, med Nær, oventil 2læbete, meget korte. Støvdr. mange. Kapslerne 5—6, stilkede. Frøene kugleformige, i een Række.

1 A. *E. hyemalis* *Salisbury*. *Helleborus hiemalis* *Linn.* Gul Winterblomme.

Bægerbld. 6—8, aflange (gule). Rodbld. skjoldformigt, fredekrundt, stærkt indskaaret. Skæftet opret. $\frac{1}{2}$ F. 4. Jan., Febr. I Skove. Funden ved Antvorskov af Kammerjunker Brun. F. D. T. 1391.

4 Slægt. *Aquilegia*. Ukeleje.

Bæg. 5bladet, farvet, affaldende. Kronbld. 5, rørformige, oventil udbredte, utydelig 2læbete, nedentil forlængede i Sporer, som gaae ud imellem Bægerbld. Kapslerne oprette, tilspidsede.

1 A. *A. vulgaris*. Almindelig Ukeleje.

Sporerne krumme. Griflerne ikke længere end Støvdr. Kapslerne duunhaarede. Stgl. bladet. Bld. glatte, butte, indskaarne. Rodbld. dobbelt 3koblede. Stangelbld. 3koblede. 2—3 F. 4. I Skove. I Søstøven tæt ved Indgangen, mellem denne og Grusgraven, hvor den formodentlig fra først af har været plantet. (Denne har mørk-violette Blst.). F. D. T. 695.

5 Slægt. *Delphinium*. Ridder-spore.

Bæg. affaldende, farvet, 5bladet, uregelmæssigt; det øverste Blad med en Spore. Kronen 2—4bladet eller 4kløvet, uregelmæssigt, med 1 eller 2 Sporer, som ere indsluttede i Bægerets Spore. 1—5 Kapsler.

1 A. *D. Consolida*. Blid Ridder-spore.

Kronen 1bladet, med 1 Spore. Kapslen 1, glat. Stgl. opret, næsten glat, udspilet grenet. Blst. (blaae) i Klaser, adskilte. Blomster = Smaa-silken længere end Blomsterbld. Bld. mangedeelte, med smalle, ligebrede Flige. 1—2 F. 0. Paa Ager. Ved Sorø. F. D. T. 683.

6 Slægt. *Aconitum*. Stormhat.

Væg. affaldende eller visnende; det øverste Vægerblad. huult, hjelmformigt. 2 Kronblad., stillede, hule, forlængede i en Spore, skjulte i det hjelmformige Vægerblad. Bl. haandformig deelte.

1 U. *A. Napellus*. Almindelig Giftehætte Viborg.

Vægerblad. affaldende (blaae), det øverste rundhvalvet, sjelden baadformigt. Kronblad. næsten kugleformige. Sporerne korte, tykke og bøjede. Støvdragernes Binger oddede ell. 0. Frugtknuderne 3 ell. 5, glatte ell. haarede. Roden knolbet. Bladenes Flige kileformige, fligede. Blst. i Ur ell. i en Top. 4—5 F. 24. Juli.

Ufart. *A. neomontanum* *Wulffen*. Have Stormhat. Bl. glindsende; Fligene bred-lanceformige, korttandede. Blst. glatte. (Blst. mørkeblaae). Paa Bøgholm i Sorøe Søe, hvor den uden Tvivl fra først af har været plantet. F. D. T. 1698.

U. m. Da *A. Napellus* er saa overmaade ustadig i sine Former, har jeg hellere med Sprengel villet ansee denne Plante for en Ufart deraf end for en særskilt Art.

4 U f s n i t.

Pæoniaceæ. Pionartede.

Støvknapperne aabne sig indad.

1 Slægt. *Actæa*. Druemunke.

Væg. affaldende, 4bladet. Kronblad. 4. Frøegjemmerne mangesædede.

1 U. *A. spicata*. Urblomstrende Druemunke.

Kronblad. ligesaa lange som Støvdr. (hvide). Een Frugtbar. Et kugleformigt Bar. Stgl. opret. Bl. dobbelt ell. 3dobbelt 3koblede. Smaabl. æg-lanceformige, indskaarne ell. savtakkede, glatte. Klafen ægformig. 1—2 F. 24. Juni, Juli. I Philosophgangen ved Ledvogterens Huus; i Gyrstinge Skov. F. D. T. 498.

2. O r d e n.

Berberideæ. Berberisartede.

Vægerblad. 3, 4 ell. 6, affaldende, omgivne med kronbladagtige Skjæl. Kronblad. sædvanlig af Vægerbladenes Antal, eet indenfor hvert, undersædige. Støvdragerne af Kronbladenes Antal, een indenfor hver. Støvknapperne 2rummede, aabne sig ved en Klap nedefra opad. Frøegjettet eenligt, lidt skjævt, eenrummet. Frøene 1—3, befæstede ved Grunden af

en ved Siden liggende Frøestol. Hviden sædvanlig kjødet. Embryonet lige, i Midten af Hviden. Buske eller fleeraarige Urter.

1 Slægt. *Berberis*. Berberisfe.

Bægerbl. 6, med 3 Skjæl. Kronbl. 6, hvert med 2 Kjerter indvendig. Støvdr. uden Tænder. 2—3 Frøe, oprette, med temmelig haard Skal. Buske. De første Blade ikke udviklede, undertiden forvandlede til Torne, de følgende knippeviis samlede.

1. *B. vulgaris*. Almindelig Berberisfe.

Tornene 3deelte. Bl. næsten omvendt ægformige, tandede; Tænderne oddede. Klaserne mangeblomstrede, hængende. (Blst. gule). 5—6 F. h. Juni. 3 Krat. 3 Philosophgangen, formodentlig plantet. F. D. T. 904.

3 Orden.

Nymphæacea. Naefandeartede.

Frugtbunden udvidet til et topformigt ell. buget Legeme, som tildeels ell. ganske indflutter Frugtknuderne. Bæg. 4—6bladet, indvendig farvet. Kronbl. i flere Rader inden for hverandre. Støvdr. mange; Stifterne noget flade. Embryonet indsluttet i en særegen Hinde. Vandplanter. * Frugtknuderne mange, mangefrøede, ganske indsluttede i den udvidede Frugtbund, hvorved dannes en bæragtig, mangleddet Frugt. Frøene befæstede paa Skillevæggene, omgivne med en Frøehud. Hviden meelagtig. Urrene sammensvorne, straalformige. Roden tyk, vandret, med Sidetrævler, liggende paa Bunden af Vandet. Bl. næsten hjerteformige, heelrandede, glatte, med en Bladstilk, som naaer fra Roden til Vandets Overflade. Skaflet af samme Længde, trindt, glat.

1 Slægt. *Nymphæa*. Nøkkeblomst.

Bægerbl. paa den nederste Deel af Frugtbunden. Kronbl. og Støvdr. efter Længden noget voxede til Frugtbunden. Frugten derved tilsyneladende halvundersædig.

1. *N. alba*. Hvid Naefande.

Bæg. 4bladet, af Kronbladene Længde. Bægerbl. (udvendig brunagtig grønne, indvendig hvide) og Kronbl. (hvide) aflange. Krret 15—20straalet, huult, lappet. Bl. hjerteformige. 4. Juli. 3 Søer o. s. v. Ved Sorøe. F. D. T. 602.

2 Slægt. *Nuphar*. *Naefande*.

Bægerbl., Kronbl. og Støvdr. paa den nederste Deel af Frugtbunden. Frugten oversædig.

1. *Nuphar lutea Smith*. *Nymphaea lutea Linn.* Gul Naefande.

Bæg. 5bladet (gult), større end Kronen. Arret heelt, 12—20straalet, med en dyb Navle. Bl. rundagtig-hjerteformige. Bladst. 3kantet. Frugten buget, oventil forlænget i en Hals, (saa at den ligner en Flaske). 4. Juni, Juli. 3 Søer. Ved Sorø. F. D. T. 603.

4 Orden.

Papaveraceæ. *Balmueartede*.

Bæg. 2bladet, affaldende. Kronen undersædig, regelmæssig. Kronbl. 4, sjældnere 0, 8 ell. 12. Støvdr. frie. Støvnapperne 2rummede, opspringende paa Siden. Griffelen kort ell. 0. 2 ell. flere Nr. Frøene paa 2 ell. flere Frøestole, som ere befæstede paa Kapselens Sidevægge. Frøene næsten kugleformige. Hviden kjødet, olieagtig. Embryonet meget lidet, lige, ved Hvidens nedre Ende. Urter, sjelden Halvbuske, med en melkagtig, hvid eller farvet Saft. Roden trævlet. Bladene afveklende, flestede. * Kronbl. 4. Støvdr. mange. Stgl. urtagtig, oftest opret.

1 Slægt. *Papaver*. *Balmue*.

Bæg. affaldende før Kronen. Griffelen 0. Arret 4—20straalet. Kapselen 1rummet, aabner sig ved Huller under det vedvarende Nr. Frøestolene forlængede til ufuldstændige Skillevægge. Blstst. eenlige, før Blomstringen bøjede. Stgl. med hvid Saft. * Stgl. mangeblomstret. Bl. langagtige, omtrent halvfinnede.

A. Kapslerne stivhaarede.

1. *P. Argemone*. *Kjelle-Balmue*.

Kapslerne kjelleformige. Bl. dobbelt halvfinnede. (Blst. lys = farlagenrøde). 1—1½ F. ☉. Jun., Jul. Paa Diger og i Korn. Ved Sorø. F. D. T. 867.

B. Kapslerne glatte.

2. *P. dubium*. *Glat Balmue*.

Kapslerne aflange. Stgl. haaret. Haarene paa Blstst. tiltrykte. Bl. dobbelt halvfinnede. (Blst. lys = farlagenrøde). 1—1½ F. ☉. Paa Diger og mellem Korn. Ved Sorø. F. D. T. 1580.

(2*)

3. *P. Rhoëas.* Korn : Valmue.

Kapslerne næsten fugleformige. Stgl. stibhaaret; alle Haarene udstaaende. Blb. halvfinne, ind-
skaarne. (Blst. mørk-skarlagensrøde). 1—2 F. ☉. Juni, Juli. Mellem Korn og ved Gjerder. F. D. T. 1580.

4. *P. somniferum.* Opiat : Valmue.

Kapslerne næsten fugleformige. Stgl., Blb. og Bæg. glatte. Blb. omfattende, indskaarne.
2 F. ☉. Jul. I haver og flere St. F. D. T.

2 Slægt. *Glaucium.* Hornskulpe.

Kapselen (Skulpen) lang, 2klappet, 2rummet. Frøene næsten nyreformige. 2aarige
Planter med rødguul Saft, blaagraae paa Overfladen.

1 N. *G. flavum Cranz.* *Chelidonium Glaucium Linn.* *Glaucium luteum Gærtner.*
Blaagraa Hornskulpe.

Kapselen ru, vortet. Stgl. opstigende, glat. Stglblb. rundbugtede, (Blst. gule). 1—1½ F.
J. Aug. Ved Strandbredder. F. D. T. 585.

3 Slægt. *Chelidonium.* Svaleurt.

Kapselen (Skulpen) lang, 2klappet, 1rummet. Klapperne aabne sig nedenfra opad.
Frøene med en hjertlet Kam. Fleeraarige Planter med guul Saft. Blst. gule. * Blststf. danne
Skjerme. Blb. finne.

1 N. *Ch. majus.* Almindelig Svaleurt.

Kronblb. aflange, hekrandede. Smaaabl. rundagtige, lappede, rundstakkede. 2 F. 24.
Juni—Aug. Ved Gjerder. Ved Sorøe. F. D. T. 542.

2 N. *Ch. laciniatum.* Fliget Svaleurt.

Kronblb. indskaarne. Smaaabl. fligede, spidstakkede. 2 F. 24. Juli, Aug. Ved Møg-
dynger. F. D. T. 676.

5 Orden.

Fumariaceæ. Sordrøgartede.

Bæg. 2bladet, affaldende, hindeagtigt. Kronblb. 4, de 2 yderste større, de 2
inderste mindre. Støvdr. 6; 3 og 3 sammenborne. Støvknapperne 6; den midterste i hver
Afdeling 2rummet, de øvrige 4 eenrummede. Griffelen traadformig. Urret 2klappet. Frøene

befæstede paa Sidevæggen af det tørre Frøegjemme. Hviden kjedagtig. Embryonet ved den nederste Ende. Urter uden melkagtig Saft. * Blatte. Bl. dobbelt sammensatte. Blst. i Klaser med korte Smaaastilke. Et Blstbl. ved hver Blst.

1 Slægt. *Corydalis*. Huulrod.

Et (det øverste) af de ydre Kronbl. ved Grunden sporet. Kapselen 2klappet, sammentrykt, mangefrøet.

A. Roden eenknoldet. Stgl. enkelt, sædvanlig kun med 2 Bl. og 1 Blomsterklase. Bl. dobbelt 3koblede, butte, indskaarne. Blst. violetagtig-røde, sjældnere hvide.

1 *U. C. tuberosa De Cand.* *Fumaria bulbosa* var. *major Linn.* *Corydalis bulbosa Persoon.* Almindelig Huulrod.

Sporen krummet. Blomsterbl. aflange. Roden knoldet, huul. Klafen mangleblomstret, (Blst. undertiden hvide). 1—1½ F. 4. Apr., Maj. 3 Skove. Ved Sorøe, F. D. T. 605.

2 *U. C. fabacea Pers.* *Fumaria bulbosa* var. *minor. Linn.* Liden Huulrod.

Sporen lige. Blomsterbl. rundagtig-aflange, heelrandede. Roden ikke huul. ½ F. 4. Apr., Maj. 3 Skove. 3 Sorøe Academies Have, F. D. T. 1394.

3 *U. C. bulbosa De Cand.* *Fumaria bulbosa* var. *media Linn.* *Corydalis Halleri Willd.* Hallers Huulrod.

Sporen opstigende. Blomsterbl. kileformige, indskaarne. Roden ikke huul. ½—1 F. 4. Apr., Maj. 3 Skove. F. D. T. 1224.

B. Roden trævlet. Stgl. grenet. Stglbl. mange, afvejlende.

4 *U. C. claviculata De Cand.* *Fumaria claviculata Linn.* Klyngende Jordrøg.

Stgl. udbredt, flattrende. Bladst. ende sig i Styngetraade. Bl. dobbelt finneede. Smaaabl. ægformige, heelrandede. 2—3 F. 0. Jun., Jul. Paa tørvagtig Grund mellem Buske, F. D. T. 340.

2 Slægt. *Fumaria*. Jordrøg.

Et af de yderste Kronbl. nedentil puklet ell. sporet. Frøegjemmet ikke opspringende, eenfrøet. Griffelen affaldende efter Blomstringen. * Frøegjemmet næsten kugleformigt. Stgl. grenet, kantet, bladet. Bl. dobbelt finneede, kløstede.

1 *U.* *F. media De Cand.* *F. capreolata Lightfoot.* Stankende Jordrøg.

Frøegjemmerne lidt nedtrykte. Stgl. opret. Bladstilkene lidt slyngende. Smaa-bl. bred-
fileformige, lappede. (Blst. næsten hvide). $\frac{1}{2}$ —1 \mathcal{F} . \odot . Juni—Aug. Ved Diger. **F. D. T.**

2 *U.* *F. officinalis.* Løge Jordrøg.

Frøegjemmerne indtrykte. Stgl. udbredt. Smaa-bl. fileformig = lancetformige, indskaaene.
(Blst. lyserøde med mørk purpurfarvet Munding). $\frac{1}{2}$ —1 \mathcal{F} . \odot . Jun.—Aug. Paa Diger og i Muld-
jord. Ved Sorøe. **F. D. T. 940.**

6 Orden.

Cruciferae. Korsblomster.

Bæger-bl. 4, oftest affaldende: de 2 ydre temmelig flade, sædvanlig snallere, de
2 indre nedentil pukkede. Kron-bl. 4, afværende med Bæger-bl., sædvanlig ligestore, sjelden 0,
undertiden de to nederste større. Støvdragerne sædvanlig 6 (firemægtige, ∞) 2 kortere, inden-
for de pukkede Bæger-bl., 4 længere, indenfor de flade Bæger-bl., sjeldnere kun 4 eller 2.
2 Nr. 0 ell. 1 Griffel. 1 Frugtknude. Frøegjemmet tært, sædvanlig en Drummet Skulpe, hvori
Skillevæggen gaaer fra den ene Sæm til den anden, undertiden eenrummet, undertiden ikke
opspringende. Hviden 0. Embryonet olierigt. * Urter. Stgl. trind. Bl. sædvanlig afvæ-
rende. Blst. sædvanlig i halvskjermagtige Klaser med lange Smaastilke. Blomster-bl. 0.
Saften usarvet, skarp. Antiscorbutiske Planter.

1 *U* f f n i t.

Pleurorrhizæ siliquosæ. Gysdenlakartede.

Rjernestykkerne flade; Rodspidsen trykket ind til Ridsen mellem dem. Frøene sam-
mentrykte, sædvanlig ægformige. Skulpen cylindrisk eller prismatisk, 2klappet. Skillevæggen
ligebred. * Kron-bl. udeelte, med lange Negle. Bl. flade, aarede, langagtige, enten finne-
de, lireformige, halvfinne- eller udeelte.

1 Slægt. *Nasturtium.* Brøndkars.

Bæg. aabent. Bæger-bl. nedentil af lige Bredde. Arret næsten 2klappet. Skulpen
næsten trind, affortet ell. nedbøjet. Frøene smaae, uregelmæssig 2rædede, uden Mand.

A. 4 Kjertler ved Roden af Støvd. Frøene netformig; rynkede. Rodspidsen skjæv.
Kron-bl. hvide.

1 Art. *N. officinale* *Brown.* *Sisymbrium Nasturtium* *Linn.* Brøndkarse Gabelklap.

Skulperne nedbøjede. Bld. finneede; Smaaibld. hjerteformig-rundagtige, rundbugtede. 1—2 F. 24. Juni, Juli. Ved Bække og Kilder. 3 Grøfter ved Slommen, nær Sorøe. F. D. T. 690.

B. Frugtbundens Kjertler smaae. Skulperne noget trinde, ofte elliptiske. Kronibld. gule.

2 A. *N. silvestre* *Brown.* *Sisymbrium silvestre* *Linn.* Skov Gabelklap.

Kronibld. længere end Bæg. Roden krybende. Bld. finneede. Smaaibld. lancetformige, savtakkede ell. indskaarne. 1 F. 24. Maj—Sept. Paa sumpige Steder. F. D. T. 1881.

3 Art. *N. palustre* *De Cand.* *Sisymbrium palustre* *Smith.* Kjør-Gabelklap.

Kronibld. af Bægerets Længde. Langskulperne ved begge Ender butte, lidt opsvulmede. Roden kogleformig. Bld. halvfinneede, ved Grunden omfattende og randhaarede; Fligene tandede, glatte. 1 F. 24. Juni—Sept. Ved Manden af Grøfter. F. D. T. 409 og 931.

4 A. *N. amphibium* *Brown.* *Sisymbrium amphibium* *Linn.* Bitter Gabelklap.

Kronibld. længere end Bæg. Langskulperne elliptiske. Roden trævlet. Bld. aflange, halvfinneede ell. savtakkede. 1—2 F. 24. Jul., Aug. Ved Vand. Ved Sorøe. F. D. T.

Ufart α . Alle Bld. savtakkede.

— β . De mellemste Bld. fligede ell. indskaarne.

5 A. *N. anceps* *De Cand.* *Sisymbrium amphibium* var. *terrestre* *Linn.*

Tveægget Gabelklap.

Kronibld. længere end Bæg. Langskulperne tveæggede, spidse ved begge Ender. Stgl. krybende. Bld. halvfinneede, ved Grunden ærede, omfattende. 1—2 F. 24. Jul. Ved Kanten af Søer. F. D. T. 984 (?).

2 Slægt. *Barbarea.* Winterkars.

Bægeribld. ved Grunden af lige Bredde. Langskulpen 4kantet-tveægget. Klapperne uden Pig i Spidsen, næsten hjælformige. * De nederste Bld. lireformige, glatte. Blst. gule.

1 A. *B. vulgaris* *Brown.* *Erysimum Barbarea* *Linn.* Karseartet Hjørneklap.

De nederste Bld. med tilrundet Endestig, de øverste omvendt ægformige, tandede. 1—2 F. 24. Juni, Juli. Paa fugtige Steder. Ved Sorøe tæt udenfor Bypporten, og i Lillemarken. F. D. T. 985.

2 N. B. *præcox* *Brown.* *Erysimum præcox* *Linn.* Tidlig Hjørneklap.

De nederste Bld. med ægformig Endeflig, de øverste halvsinnede med ligebrede Flige. 1—2 F. ♂ eller ♀. Maj. F. D. T. 1759.

3 Slægt. *Turritis.* Taarnurt.

Langskulpen ligebred; Klapperne flade. Frøene danne i hvert Num 2 Rader. Blst. hvidagtige.

1. *T. glabra.* Slat Taarnurt.

Langskulperne ganske oprette, 6 Gange saa lange som Smaasilkene. Rodbl. lancetformige, tandede, haarede. Stængelbl. piilformige, omfattende, heelrandede, glatte. 2 F. ♂ ell. ♀. Jun. Paa tørre Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 809.

4 Slægt. *Arabis.* Gaasemad.

Langskulpen ligebred; Klapperne flade, eennervede. Frøene ægdannede ell. kredsrunde, sammentrykte, danne i hvert Num een Rad. * Blst. hvide. Frøene ikke vingede. Stængelbl. udeelte.

A. Kronbl. næsten ligebrede, oprette. Rodbl. udeelte, silkebe.

1 N. *A. hirsuta* *Scopoli.* *Turritis hirsuta* *Linn.* Stivhaaret Taarnurt.

Langskulperne oprette. Bld. tandede, ujevne ved sædvanlig grenede Haar; Rodbl. omvendt ægformig = aflange, ende sig i en Stilk; Stængelbl. æg = lancetformige. Klafens Smaasilke af Bøgerets Længde. $\frac{1}{2}$ —1 F. ♂. Juni. Paa Bakker, i Moser. F. D. T. 1040.

2 N. *A. Thaliana.* Almindelig Gaasemad.

Langskulperne opstigende. Stgl. grenet. Bld. haarede, tildeels tandede. Rodbl. ægformig = aflange. Blststf. meget længere end Bøg. $\frac{1}{2}$ F. ♂. Maj. Paa sandige Marker. Ved Sorøe. F. D. T. 1106.

B. Kronbladenes Blade omvendt ægformig eller fileformig, tydelig adskilt fra Neglen. Rodbl. fløftede.

3 N. *A. petraea* *Lamarck.* *A. hispida* *Linn. fil.* Stivhaaret Gaasemad.

Heret hovedformigt, Langskulperne udstaende, næsten oprette. Stgl. ofte grenet. Bld. enten glatte, randhaarede eller rue; Rodbl. indstaarne; Stglbl. aflang = ligebrede, heelrandede. $\frac{1}{2}$ F. ♀. Juli. Paa Kridtflinter og Klipper. F. D. T. 386.

4 *U. A. arenosa Scopoli. Sisymbrium arenosum Linn. Sand: Gabeklap.*

Langfulperne og Blistff. udstaaende. Stgl. grenet, hvasshaaret ved enkelte Haar. Bld. laadne ved 2kløvede Haar. Rodbl. lireformig = halvfinne; Stglbl. indfaaren = tandede. $\frac{1}{2}$ F. ☉. Juni, Juli. Paa sandige Marker. F. D. T. 1760.

5 Slægt. *Cardamine. Springklap.*

Langfulpen ligebred. Klapperne flade, uden Nerve, ofte elastisk opspringende. Fræne ægformige, uden Rand. Fræstrengene tynde. * Stgl. ikke nedliggende. Bld. finne.

1 *U. C. amara. Bitter Springklap.*

Griffelen traadformig, noget spids. Stgl. rodskydende ved Grunden. Rodbladenes Smaaabl. rundagtige, Stængelbladenes tandet = kantede. (Bist. hvide, Støvknapperne violette). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Maj, Juni. Ved Vand. I et Kjør i Sønderstoven ved Vejen til Christiansminde. F. D. T.

2 *U. C. pratensis. Eng: Springklap.*

Kronbl. 3 Gange saa lange som Bøgerbl. Griffelen meget kort, neppe tyndere end Frugt-knuden. Arret hovedformigt. Blat. Rodbladenes Smaaabl. rundagtige, Stængelbladenes lancetformige ell. ligebrede, heelrandede. (Bist. blegrode). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Apr., Maj. Paa Enge. Ved Sorø. F. D. T. 1039.
 Afart: unillora. Med eenblomstret Skaft.

3 *U. C. intermedia Horn. Plant. 3 Udg. Rundbladet Springklap.*

Kronen kun lidt længere end Bøgerbl. (hvide). Smaaabl. heelrandede. Rodbladenes frede = runde, Stængelbladenes aflange, butte. Blat. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj. Paa tørre Steder. F. D. T. 1762.

4 *U. C. hirsuta. Haaret Springklap.*

Kronbl. aflange (hvide). Langfulperne oprette. Rodbladenes Smaaabl. rundagtige, oddede, stilkede, de øverstes aflange, næsten fiddende. $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. I Skovmoser. F. D. T. 735.
 Afart: silvatica. Med større Kroner. F. D. T. 148.

5 *U. C. impatiens. Kroneløs Springklap.*

Smaaabl. oval = aflange, mestendeels tandede, de nederste nær ved Stgl., spidse, randhaarede, og ligne Kjelblade. (Bist. smaae, undertiden uden Krone, undertiden med smaae hvide Kronbl.). $\frac{1}{2}$ —1 F. Juni, I Skove. F. D. T. 1389.

6 Slægt. *Dentaria. Landrod.*

Langfulperne lancetformige. Klapperne flade, uden Nerve, ofte elastisk opspringende. Fræstolene ikke vingede. Fræstrengene udvidede. Fræne ægformige, uden Rand, i een Rad.

1 *U. D. bulbifera.* Løgbærende Tandrod.

Roden tyk, tandet. Stgl. opret. Stglbl. de nederste finnede, de mellemste trekoblede; Smaaabl. lancetformige. De øverste Bl. enkelte, lancetformige. Ofte smaae Pøg i Bladhjørnerne. (Kronerne lysrød = violette). 1½—2 F. 4. Maj. 3 høje Skove. F. D. T. 361.

2 *Uffnit.*

Pleurorrhizæ latiseptæ. Cochlearcartede.

En Rundskulpe, opspringende paa langs. Skillevæggen bred, næsten oval, hin- deagtig. Klapperne flade eller hvælvede. Frøene sammentrykte, ofte randede. Kjernestykkerne flade; Rodspidsen trykket ind til Ridsen mellem dem. * Bl. enkelte; Rodbl. udelte.

1 Slægt. *Lunaria.* Sælbæger.

De 2 Bægerbl. ved Grunden forlængede til en Pose. Kronbl. sædvanlig hele. Støv- dragerne uden Tænder. Rundskulpen stift, elliptisk ell. lancetformig med flade Klapper. Frø- strengene lange, vorede til Skillevæggen. * Stgl. opret, grenet. Bl. stilkede, hjerteformige, sæd- vanlig modsatte, noget tandede, røe.

1 *U. L. rediviva.* Vedvarende Sælbæger.

Rundskulperne lancetformige, spidse i begge Ender. Bl. med skarpe og smaae Tænder. (Blst. næsten purpurrode, vellugtende). 1—2 F. 4. Juli. Paa Bakker. F. D. T.

2 *U. L. biennis Mönch. L. annua Linn.* Eetaarig Sælbæger.

Rundskulperne elliptiske, butte i begge Ender. Bl. noget stortandede. (Blst. violet = lilla, lugtløse). 1—2 F. 3 ell. 4. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 1880.

2 Slægt. *Berteroa.* Kleyplade.

Bægerbl. nedentil ligedannede. Kronbladenes Plade 2deelt. De kortere Støvdr. tandede. Rundskulpen siddende, elliptisk ell. omvendt ægformig; Klapperne flade ell. hule. Frøene ovale, flade, med en liden Rand.

1 *U. B. incana De Cand. Alyssum incanum Linn.* Hvidgraa Krognaal.

Rundskulperne ægformig = aflange, duunhaarede, lidt bugede. Stgl. opret. Bl. lancetfor- mige, hvidgraae, heckrandede. (Kronerne hvide). 1—1½ F. 3. Jul. Paa tørre Marker og Diger. F. D. T. 1461.

3 Slægt. *Alyssum*. Krognaal.

Vægerbl. nedentil ligedannede. Kronbl. udeelte. Nogle Støvdr. tandede (hos de fleste). Mundskulpen fredekrund ell. elliptisk. Klapperne flade eller i Midten ophøjede. Frøene i hvert Rum 2—4, sammentrykte.

1 N. *A. calycinum*. Støvægret Krognaal.

Væg. vedblivende efter Blomstringen. Mundskulperne fredekrunde, lidt ubrandede, duunhaarede, 4 Gange saa lange som Griffelen. Stgl. urtagtige, graaagtige. (Blst. gule). $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jun., Juli. Paa tørre Steder. F. D. T. 1704.

4 Slægt. *Draba*. Klubblom.

Vægerbl. ligedannede. Kronbl. udeelte. Støvdr. alle uden Tænder. Mundskulpen siddende, ægformig ell. aflang. Frøene mange, uden Rand.

1 N. *D. contorta Ehrhart*. *D. incana Linn*. Hvidgraa Gjeslingeblomst.

Griffelen kort. Mundskulperne aflange, glatte, lidt snoede. Stgl. grenet, bladet, med stjerneformige Haar. Bl. ægformige, tandede. Kronbl. but udskærne (hvide). $\frac{1}{4}$ —1 F. ☉. J. Paa Bjerge og Bakker. F. D. T. 130.

5 Slægt. *Erophila*. Gjeslingeblomst.

Vægerbl. ligedannede. Kronbl. fløvede. Støvdr. uden Tænder. Mundskulpen ægformig ell. aflang, med flade Klapper. Frøene mange, uden Rand. Eenaarige Urter med Skaft. Blst. hvide.

1 N. *E. vulgaris De Cand*. *Draba verna Linn*. Vaar; Gjeslingeblomst.

Mundskulperne elliptiske, kortere end Blomsterstilkene. Skafterne 5—15blomstrede. Bl. lancetformige, tandede, stivhaarede. ☉. Marts, Apr. Paa Diger og tørre Marker. Ved Sorø. F. D. T. 983.

6 Slægt. *Cochlearia*. Cochlear.

Vægerbl. ligedannede, udstaaende. Kronbl. udeelte. Støvdr. uden Tænder. Mundskulpen siddende, ægformig; kugleformig eller aflang med bugede Klapper. Frøene flere, uden Rand. Blst. hvide. * Glatte.

A. Mundskulpen aflang. Griffelen kort, traadformig. Arret hovedformigt, næsten skiveformigt.

1 A. C. Armoracia. Peberrod ; Cochleare.

Rodtbl. lancetformig = aflange, rundtakkede. Stængelbl. deels halvfinnede, deels udeelte.
2—3 F. 4. Jun. Paa sive Steder. Som vild ved Pedersborg. F. D. T.

B. Griffelen meget kort ell. O. Rundskulpen ikke udrandet. * Rodtbl. stilkede.

2 A. C. anglica. Engelsk Cochleare.

Rundskulperne ægformige, rundagtige, netformig aarede, halv saa lange som Blomsterstf. Rodtbl. ægformige, udeelte. Stængelbl. aflange. $\frac{1}{2}$ F. O. J. Jun. Ved Strandbredder. F. D. T. 329.

3 A. C. officinalis. Læge ; Cochleare.

Rundskulperne ægformig = kugleformige, halv saa lange som Blststf. Rodtbl. hjerteformige ell. nyreformig = kredsrunde. Stglbl. aflange, omfattende, ved Grunden pilformige. $\frac{1}{2}$ —1 F. O. Maj, Jun. Ved Strandbredder. F. D. T. 135.

4 A. C. danica. Dansk Cochleare.

Rundskulperne elliptiske, af Blomsterstilkens Længde. Alle Bl. stilkede, næsten muursteefformige.
2—4 Tom. O. Maj, Juni. Ved Strandbredder. F. D. T. 100. En Afart T. 1934.

3 Affnit.

Pleurorrhizæ angustiseptæ. Hyrdetafseartede.

Rundskulpen 2klappet. Klapperne baadformige. Stilleræggen meget smal. Frøene ægformige, undertiden randede. Kjernestykkerne flade ; Rodspidsen trykt ind til Ridsen imellem dem. * Væg. aabent. Kronbl. hele, med korte Negle, hvide. Rundskulpen oventil udrandet, med 2 eller flere Frøe i hvert Rum. Bl. enkelte ; Stglbl. langagtige, udeelte.

1 Slægt. Thlaspi. Pengeurt.

Vægerbl. nedentil ligedannede. Kronbl. ligestore. Rundskulpens Klapper paa Ryggen vingede.

1 A. T. arvense. Ager ; Hyrdetafse.

Rundskulperne ombendt ægformig = kredsrunde, kortere end Blststf. Klapperne vingede langs med hele Ryggen. Frøene mange, strøbete. Stgl. opret. Bl. aflange, tandede, glatte. $\frac{1}{2}$ —1 F. O. Maj—Jul. Paa Ager ic. Ved Sorøe. F. D. T. 793.

2 Slægt. *Capsella*. Hjørdetasse.

Rundskulpen omvendt hjerteformig, næsten trekantet. Klapperne uvingede. Nummene mangefrøede.

1 N. *C. Bursa pastoris Mönch.* *Thlaspi Bursa pastoris Linn.* Almindelig Hjørdetasse.

Rodtbl. halvfinne. Stgltbl. hjerteformig = pilsformige, næsten heelrandede. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ F. ☉. Marts—Sept. Ved Veje og Diger. Ved Sorø. F. D. T. 729.

3 Slægt. *Teesdalia*. Sandkars.

Støvdr. med et Skjel indentil. Rundskulpen ægformig. Nummene 2frøede. Rodtbl. halvfinne. Blst. smaae.

1 N. *T. Iberis De Cand.* *Iberis nudicaulis Linn.* Nøgenstænglet Filipkrave.

De 2 yderste Kronbl. større end de andre. Stgl. næsten nøgen. $\frac{1}{2}$ F. ☉. Maj, Jun. Paa sandige Marker. Ved Pedersborg. F. D. T. 323.

4 Af snit.

Pleurorrhizæ lomentaceæ. Strandvaanerartede.

Skulpen deler sig paa tværs i Led. Frøene uden Rand. Rodspidsen trykket ind til Ridsen imellem Skjernestykkerne.

1 Slægt. *Cakile*. Strandvaaner.

Rundskulpen 2ledet, sammentrykt; eet Frø i hvert Led, i det øverste opret, i det nederste hængende.

1 N. *Cakile maritima Roth.* *Bunias Cakile Linn.* Lykbladet Strandvaaner.

Rundskulpens øverste Led sværdformigt. Bl. fjødede, halvfinne eller tandede. (Kronerne violette). 1 F. ☉. Jul, Aug. Ved Strandbredder. F. D. T. 1168. En Afart T. 1583.

5 Af snit.

Notorrhizæ siliquosæ. Natviolartede.

Langskulpen Drummet, opspringende paa langs. Klapperne noget hule. Frøene ægformige eller aflange, uden Rand. Skjernestykkerne flade; Rodspidsen trykket ind til Ryggen af det ene. * Stgl. opret, bladet, sædvanlig grenet.

1 Slægt. *Hesperis*. Aftenstjerne.

De 2 Bægerblade ved Grunden forlængede til en Pose. Støvdr. uden Tænder. 2 Nr, som i Spidsen støde sammen. Langskulpen næsten trind ell. næsten Afkantet. Frøene langagtige, næsten 3kantede. * Kronbladenes Plader omvendt ægformige. Skilleæggen hindeagtig. Frøestregene vingede.

1 N. *H. matronalis*. Kronoddet Aftenstjerne Kiølsen.

Langskulperne oprette, knudrede, glatte, ikke tykkere i Randen. Stgl. næsten enkelt. Bld. æglancetformige, tandede. Blstfkk. af Bægerens Længde. (Kronen lila eller hvid). 2-3 F. Jun. 4. 3 Kratter. F. D. T. 921.

Ufart: *silvestris*. *Hesperis inodora* Linn. Lugtløs Aftenstjerne. De nederste Bld. ved Grunden hjerteformige og grovt tandede. (Blst. lila). 3 Kratter. F. D. T. 924.

2 Slægt. *Sisymbrium*. Gabeclap.

Bægerbld. ved Grunden ligedannede. Støvdr. tandløse. 2 Nr, næsten adskilte eller sammenvorne til et Hoved. Langskulpen næsten trind, siddende. Frøene ægformige eller aflange. Kjernestykkerne flade, undertiden skjæve. * Bld. kløftede. Blst. smaae, gule.

1 N. *S. officinale Scopoli*. *Erysimum officinale* Linn. Løge Hjørneclap.

Langskulperne sylformige, nedtil bredere, trykkede til Aftilken. Stgl. haaret. Bld. høvlførmige, haarede. Blstfkk. meget korte. 1-2 F. Jul. Paa grusede Steder. F. D. T. 560.

2 N. *S. Sophia*. Smaablomstret Gabeclap.

Kronbld. mindre end Bægerbld. Langskulperne trinde. Bld. dobbelt finneede. Smaabld. halvfinneede, med smalle ligebrede Flige. Blstfkk. 4 Gange saa lange som Bægerene. 2 F. Jul., Jul. Ved Gårder oc. Ved Sorøe f. Gr. i Strædet. F. D. T. 528.

3 Slægt. *Alliaria*. Løgurt.

Bæg. flapt. Langskulpen næsten trind, men ved fremstaaende Nerver firekantet. Frøene næsten valseformige. Kjernestykkerne ligebred; aflange, flade. * Blst. hvide.

1 N. *A. officinalis Andrzejowski*. *Erysimum Alliaria* Linn. Løglugtende Hjørneclap.

Langskulperne prismatiske, meget længere end Blstfkk. Bld. hjerteformige, fliske, tandede. 1-2 F. Maj. 4. Maj. 3 Stove. Ved Sorøe f. Gr. ved Parnas. F. D. T. 935.

4 Slægt. *Erysimum*. Hjørneflap.

Væg. luffet. Langskulpen firekantet. Kjernestykkerne flade, aflange. * Griffelen kort ell. O. Bld. lancetformige. Skulperne længere end Stilkene. Blst. gule.

1 N. *E. hieracifolium*. Rankskulpet Hjørneflap.

Langskulperne oprette, mange Gange længere end Stilkene. Bld. nedtil smallere, skarpt bugtet=tandede. O. Jul. Paa Klipper og Kridtklinter. F. D. T. 229.

2 N. *E. cheiranthoides*. Gyldenaf Hjørneflap.

Langskulperne opret=udstaaende, 2 Gange saa lange som Stilkene. Bld. faatandede ell. heelrandede. 1—2 F. O. Jul. Paa grusede Steder. Jeg har eengang fundet den i Philosophgangen. F. D. T. 731 og bedre T. 923.

6 Afsnit.

Notorrhizæ latisepæ. Dodderartede.

Rundskulpen Drummet, opspringende med hule Klapper. Skillevæggen elliptisk, af Skulpens Brede. Frøene ægformige. Kjernestykkerne flade; Rodspidsen trykket ind til Ryggen af det ene. * Stgl. opret, bladet. Bld. lancetformig=pilformige, omfattende. Blst. gule.

1 Slægt. *Camelina*. Dodder.

Griffelen traadformig. Rundskulpen omvendt ægformig eller næsten fugleformig med mangefrøede Rum. Frøene aflange, uden Rand.

1 N. *C. sativa* *Crantz.* *Myagrum sativum* *Linn.* Almindelig Dodder.

Rundskulperne omvendt ægformige, 4ribbede, endte med en temmelig lang Griffel. Bld. næsten heelrandede. 1½ F. O. Jun. Paa Agre. F. D. T. 1038.

Ufart: dentata. Med tandede, glatte Bld. F. D. T. 1824.

2 Slægt. *Neslia*. Rundskulpe.

Rundskulpen næsten fugleformig, ikke opspringende. Skillevæggen forsvindende ell. hindeagtig. 1 ell. 2 Frøe. Kjernestykkerne ægformige, tykke.

1 N. *N. paniculata* *Desv.* *Myagrum paniculatum* *Linn.* *Rapistrum paniculatum* *Gærtn.*
Toppet Rundskulpe.

Stgl. kun i Toppen grenet, stiohaaret. 1—2 F. O. Jun. Paa Agre. F. D. T. 204.

Notorrhizeæ angustiseptæ. Karseartede.

Rundskulpen med en meget smal Skillevej. Klapperne sædvanlig baadformige. Frøene eenlige eller faa i hvert Rum, ægformige, uden Rand. Kjernestykkerne flade; Rodspidsen trykket mod det enes Ryg. * Bl. taffede eller fløstede. Kronbl. med korte Nogle, hvide, hos een Art 0.

1 Slægt. *Senebiera*. Navnesod.

Rundskulpen 2knoppet, ofte ikke opspringende. Nummene eenfrøede. Klapperne bugede. Frøene næsten 3kantede. Kjernestykkerne ligebrede. Klaserne modsatte Bladene.

1 U. S. *Coronopus Poir.* *Cochlearia Coronopus Linn.* *Coronopus Ruellii Gærtn.*
Liggende Navnesod.

Rundskulpen ikke udbrandet, spidsagtig, lidt sammentrykt. Klapperne med en rynket, næsten pigget Rand paa Ryggen. Bl. halvfinne; Fligene udeelte, tandede ell. halvfinne. $\frac{1}{4}$ F. ☉, ☿, ♀. Jun.—Aug. Ved Veje og paa Diger. F. D. T. 202.

2 Slægt. *Lepidium*. Karse.

Rundskulpen næsten ægformig eller hjerteformig, opspringende. Frøene næsten 3kantede eller sammentrykte. Klaserne i Enden af Stgl. * Stgl. noget grenet. Bl. smaae.

1 U. *L. sativum*. Have: Karse.

Rundskulpen kredsrund, udbrandet. Klapperne paa Ryggen vingede. Frøbladene deelte. Bl. fligede, glatte. $1-1\frac{1}{2}$ F. ☉. Jun., Jul. Paa fugtige Steder. F. D. T. 1761.

2 U. *L. campestre Brown.* *Thlaspi campestre Linn.* Mark: Hyrdetasse.

Griffelen meget kort. Rundskulpen næsten ægformig, udbrandet, skjæletsprykket. Klapperne paa Ryggen vingede. Frøbladene udeelte. Stængelbl. pilformige, tandede, hvidgraae. 1 F. ♀. Juni. Paa Diger. Mellem Pedersborg og Sorøe. F. D. T. 1221.

3 U. *L. ruderales*. Stinkende Karse.

Kronen 0. 2 Støvdr. Griffelen meget kort. Rundskulpen rundagtig, lidt udbrandet, kortere end Stilk. Klapperne uvingede. Bl. glatte; Rodbl. halvfinne, Stglbl. ligebrede. $\frac{1}{2}-1$ F. ♀. Paa tørre Steder. F. D. T. 184.

4 *U. L. latifolium.* Dredbladet Karfe.

Griffelen meget kort. Rundskulpen ægformig, tilspidset ved Arret. Klapperne uvingede. Bld. æg=lancetformige, lidt savtakkede, de nederste langstilkede. 2—3 F . 4. Jul., Aug. Ved Strandbredder. **F. D. T. 557.**

8 *Affnit.*

Notorrhizæ nucamentacæ. Bajdartede.

Som de Forrige, men Frægjemmet eenrummet, eenfræet, ikke opspringende.

Neslia. See 6 *Affnit.*

Senebiera. See 7 *Affnit.*

9 *Affnit.*

Orthoplocæ siliquosæ. Kaalartede.

Langskulpen opspringende efter Længden, med ligebred Stillelæg. Fræene kugleformige, uden Rand. Kjernestykkerne sammenlagte; Rodspidsen indsluttet i Folden. * Kronbld. med lange Negle, temmelig store, gule. Langskulpen sædvanlig trind. Fræene i een Råd. Stgl. opret. De nederste Bld. næsten lireformige, stivhaarede eller glatte.

1 Slægt. *Brassica.* Kaal.

Bøgerbld. sammenstødende. Langskulpen med en kort, but Griffel. * Bld. blaagrønne; de øverste glatte, omfattende.

1 *U. B. campestris.* Ager; Kaal.

Bld. lidt kjødede; de nederste, medens de ere unge, lidt stivhaarede ell. randhaarede, tandede; de øvrige hjerteformige, spidse. 2 F . \odot , J . Jun. Mellem Baarkorn. Ved Sorøe. **F. D. T. 550** (maadelig).

2 *U. B. Napus.* Kapsæd; Kaal.

Bld. glatte; de nederste Stglbld. halvfinnede og rundtakkede, de øverste hjerteformige=lancetformige. Langskulpen udstaaende. 1—3 F . J . Maj. Paa Agre. **F. D. T.**

2 Slægt. *Sinapis.* Sennep.

Bæg. aabent. Langskulpen med nerveede Klapper og en kort spids Griffel.

1 *U. S. nigra.* Sort Sennep.

Langskulperne næsten firekantede, uden Næb, glatte, jævne, indtrykte til Klasestilken. De øverste Bld. lancetformige, heelrandede, stilkede. 2—3 F . \odot . Jun. J Baarkornet. **F. D. T. 1582.**

2 *U. S. arvensis.* Uger; Sennep.

Langskulperne mangelante, knudrede, 3 Gange saa lange som det tynde, næsten tværggede Næb. Stgl. og Bld. siddende. De øverste Bld. ægformige. 1—2 F. ☉. Maj, Jun. 3 Aar fornet. Ved Sorø. F. D. T. 753.

3. *U. S. alba.* Hvid Sennep.

Langskulperne siddende, udstaaende, næsten smallere end det sværdformige Næb. Næsten glat. Bld. lireformige. 2—3 F. ☉. Jun. 3 Aar fornet. F. D. T. 1393.

10 Ufsnit.

Orthoploceæ lomentaceæ. Røddikeartede.

Skulpen deles sig paa tværs i een- eller faafrøede Led. Frøene kugleformige. Kjerne-
stykkerne sammenlagte; Rodspidsen indsluttet i Følben. * Vægerbld. sammenslødende. Kro-
nerne temmelig store, lyse. Stgl. opret. Bld. enkelte, løstede fra Eiderne.

1 Slægt. *Crambe.* Røstnaal.

Rundskulpen 2leddet; det nederste Led uden Frøe, det øverste kugleformigt, eenfrøet. Kjerne-
stykkerne tykke, næsten bladagtige, dybt udrandede. Blst. hvide.

1 *U. C. maritima.* Strand; Røstnaal.

De lange Stovdr. 2frøede. Rundskulpen uden Dd. Glat. Bld. rundagtige, bugtede, tandede, bølgede, blaagrønne. 1—1½ F. 4. Jun., Jul. Ved Strandbredder. F. D. T. 316.

2 Slægt. *Raphanus.* Røddike.

Langskulpen deles sig paa tværs i flere Led. Frøene i een Rød, hængende. Kjerne-
stykkerne noget tykke.

1 *U. R. Raphanistrum Linn.* Røddik; Røddike.

Langskulpen trind, stribet, 3- til 8frøet, indtrykt mellem hvert Frøe. Leddene eenfrøede. De
nederste Bld. lireformige. (Blst. bleggule). 1—2 F. ☉. Jun. 3 Aar fornet. Ved Sorø. F. D. T. 678.

11 Ufsnit.

Spirolobæ nucamentaceæ. Taffelapartede.

Frøegjemmet ikke opspringende, 2- til 4rummet. Frøene næsten kugleformige. Kjerne-
stykkerne spiralførmig indrullede.

1 Slægt. *Bunias*. Taffeklap.

1 A. *B. orientalis*. Orientalst Taffeklap.

Frøegjemmet 2rummet, ægformigt, uden fremstaaende Kande, næsten vortet. De nederste Bld. høvlformige; ell. finnet-lireformige, de øverste lancetformige. (Blst. gule). 1-2 F. 2. Jul., Aug. Paa Euge. F. D. T. 1651.

12 Afsnit.

Diplectolobæ latiseptæ. Sylbladartede.

Urret siddende. Rundskulpen næsten ægformig. Stillevæggen elliptisk. Klapperne bugede. Rummene mangefræede. Sjernestykkerne 2 Gange sammenlagte paa tværs.

1 Slægt. *Subularia*. Sylblad.

1 A. *Subularia aquatica*. Vand; Sylblad.

Blst. paa et Skaf (hvide). Bld. sylformige. $\frac{1}{2}$ -1 Tom. ☉. Jul. Ved Bredder af Søer. F. D. T. 35.

7 Orden.

Balsamineæ. Balsaminartede.

Bæg. Bladet, affaldende. Kronbld. 4; de 2 yderste afverlende med Bægerbld., tykke i Spidsen, det øverste udbrandet, det nederste heelt, udtruffet i en Spore; de 2 inderste afverlende med hine, indbyrdes ligedannede. Støvdr. 5; Støvkapperne næsten sammenvorne, opspringende paa langs. 1 Griffel. 5 Nr. Kapselen 5klappet, elastisk opspringende. Frøene paa en Skantet Frøestuel, uden Hvide. Urter. Bld. enkelte. Blstst. i Bladhjørnerne.

1 Slægt. *Impatiens*. Uroe.

De 2 øverste Støvdrageres Knapper eenrummede. Urvene sammenvorne.

1 A. *I. Noli tangere*. Spring; Balsamine.

Sporen i Spidsen tilbagebøjet. Stængelens Knæ ophovuede. Bld. ægformige, grovt tandede. Blstst. 3-4blomstrede, kortere end Bld., udstaaende nedenfor Bld. Blst. hængende (lysegule). 2 F. ☉. Jun., Jul. 3 fugtige Stove. Ved Sorøe f. Ex. ved Ledvogterhuset i Philosophgangen ic. F. D. T. 582.

* *Tilia*. See 2 Afdeling, 9 Orden. *Monotropa*. See 2 Underklasse, 3 Afdeling, 4 Orden.

Stereocalyces. Fastbægrede.

Bæg. af lignende Substants med Bladene, vedblivende indtil Frugten modnes. Bægerbl. sædvanlig mere ell. mindre sammenhængende, saa at Bæg. bliver eenbladet. Tallet 5 (eller i dets Sted 4) herskende ved Bægerbl., Kronbl. og Støvdr. Tallet 2, 3 ell. 5 herskende ved Frugt bærens Dele. (Tallet 4 kommer istedenfor 5, naar Bægerbl. ere 4).

1 Orden.

Cistineæ. Soeløjeartede.

Det ydre Bæger 2bladet ell. 0, det indre 3bladet, før Blomstringen snoet. Kronbladene sædvanlig 5, ligedannede, før Blomstringen snoede, dog i modsat Retning af Bægerbl. Støvdr. frie. 1 Griffel. 1 Kr. Frøegjemmet en mangefreet Kapsel. Hviden meelagtig, indsluttende Embryonet. Bl. enkelte, udeelte, de først fremkommende altid modsatte, med eller uden Arelbl.

1 Slægt. **Helianthemum.** Soeløje.

Kapselen 3klappet, 1. ell. 3rummet.

1 A. **H. vulgare Gärtner.** *Cistus Helianthemum Linn.* Almindelig Soeløje.

Det ydre Bægers Blade mindst. Støvdr. mange. Kaps. 1rummet, opspringende i Spidsen. Stgl. halvbuskagtig, liggende, grenet; Grenene forlængede. Bl. modsatte, i Randen neppe tilbagerullede, paa Underfladen graasillede; de nederste rundagtige, de mellemste ægformig = elliptiske, de øverste aflange. Arelbl. aflang = ligebrede, randhaarede, længere end Bladst. Klaserne slappe. Blstf. og Bæg. haarede. (Blst. gule). $\frac{1}{4}$ F. K. Jun., Jul. Paa Bakker. Ved Sorø. F. D. T. 101.

2 Orden.

Resedacea. Bauartede.

Bæg. 1bladet. Kronen uregelmæssig (ell. 0). Kronbl. fligede; en stor Hjertel under de øverste. Støvdr. frie. Frøene befæstede paa Frøegjemmets Sidevægge. Bl. afvekslende. Arelbl. 0.

1 Slægt. **Reseda.** Bau.

Bæg. 4—6deelt. Støvdr. 10—30. Kapselen 1rummet, gabende i Spidsen.

1 N. R. Luteola. Farver; Bau.

Bæg. 4deelt. Kronen 4- eller 5bladet (bleggult). St. Stgl. opret. Bld. lancetformig-
ligebrede, butte, fiddende. Blst. i Nr paa Enden af Stgl. og Grenene. 2 F. O, F. Jun., Jul.
Ved Gårder. Ved Sorøe efter Prof. S. C. Molbech. F. D. T. 864.

3 Orden.

Violariæ. Violartede.

Bægerbld. 5, før Blomstringen tegllagte. Kronbld. afvejlende med Bægerbld. Støvdr. 5.
Kapselen Irummet, 3klappet. Frøene befæstede indvendig paa Klapperne, forsynede med en
fjødagtig Vorte nær ved Navlen. Hviden fjødet, omgivende Embryonet.

1 Slagt. Viola. Viol.

Bæg. uregelmæssigt; Bægerbld. nedtil forlængede. Et af Kronbld. forlænget til en
Spore. Støvdr. bære i Spidsen en tør Hinde; 2 af Stifterne have et Anhang, som gaaer ned
i Kronens Spore. Bld. afvejlende, med Arelbld. Blstff. i Bladhjørnerne eller ved Roden, eenlige,
eenblomsrede, med 2 smaae Blomsterbld., i Enden bøiede. * Bld. udeelte, sædvanlig rundtaffede.

A. Arret næbbet, med et lidet Hul nær ved Enden af Næbbet. Griffelen tyndere ne-
dentil. Kaps. sædvanlig 3kantet. Frøene 15—27. * Bld. hjertesformige eller nyre-
formige. Arelbld. smaae, sædvanlig udeelte. Blst. blaae eller blaalige.

1 N. V. palustris. Eng; Viol.

Bægerbld. ægformige, butte. Arret randet. Kapselen aflang, trekantet. Roden ledet, skjælet.
Stgl. 0. Bld. nyreformige, glatte. Arelbld. bred-ægformige, tilspidsede. (Blst. lys lila). 2 Tom. 24.
Apr., Maj. S Moser. Ved Sorøe Academiebygning og paa Slommen. F. D. T. 83.

2 N. V. hirta. Korthaaret Viol.

Bægerbld. ægformige, butte, randhaarede. De 2 mellemste Kronbld. utydelig skjægede. Sporen
næsten kogleformig. Støvdragernes sporeformige Anhang glatte. Kapslerne opsvulmede, korthaarede. Laaden.
Stgl. 0. Bld. hjertesformige, hjertlet-tandede. 2 S. 24. Apr., Maj. S udkanter af Skove. F. D. T. 618.

3 N. V. odorata. Vellugtende Viol.

Bægerbld. ægformige, butte. Sporen meget but. Arret kroget. Kapselen opsvulmet, korthaaret.
Frøene topformige. Stgl. krybende. Blstff. komme fra Roden. Bld. rundagtig hjertesformige.
2—3 Tom. 24. Marts, Apr. Paa Diger og ved udkanter af Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 309.

4 U. V. canina. Hunde; Viol.

Bægerbl. sylformige. Kronbl. stærkt flæggede. Arret vortet, lidt tilbagebøjet. Kapselen langagtig; Klapperne tilspidsede. Frøene pæreformige. Den ældre Stgl. opstigende, glat. Bl. hjerteformige. Arelbl. tilspidsede, tyndt fligede. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj. Paa skyggesulde Steder. Ved Sorø. F. D. T. 1453.

B. Støvd. 3sidede, sammenvorne. Griffelen tyndere nedentil. Arret krukkeformigt, paa begge Sider besat med Knipper af Haar; Nabningen stor, med en Læbe nedentil. Kapselen utydelig sekskantet. Frøene 40—60.

5 U. V. tricolor. Fleerfarvet Viol.

Kronbl. med korte Negle. Sporen tyk, but. Støvdragernes sporeformige Anhang korte. Frøene aflang-ægformige. Stgl. grenet, udbredt. Bl. stort rundtakkede, de nederste ægformig-hjerteformige, de øverste aflange. Arelbl. lireformig-halvsfinnede. $\frac{1}{4}$ F. ☉, ♀. Apr.—Maj.

α) V. tricolor Murray. Bæg. glat. Kronbl. betydelig længere end Bæg. Den herskende Farve violet. Paa Diger og tørre Marker, samt i haver. Ved Sorø. F. D. T. 623. (Paa Marken er den sædvanlig mørk og lys violet med lidt Svult, i haverne mere spraglet og afværende af Farver).

β) V. arvensis Murray. Uger=Viol. Bæg. ofte lidt haaret. Kronbl. neppe længere end Bæg. Den herskende Farve hvid. Paa tørre Ugre. Ved Sorø. F. D. T. 1748.

4. Orden.

Droseraceæ. Soeldugartede.

5 Bægerbl., ligestore, før Blomspringen tegllagte. Kronen regelmæssig, 5bladet ell. 5kløvet. Støvd. 5, 10, 15 ell. 20. Arrene 3, 4 ell. 5. Kapselen 3, 4 ell. 5klappet. Frøene befæstede indvendig paa Klapperne. Hviden bruskagtig eller kjødet. * Kronbl. 5, hvide. Støvd. 5. Stgl. enkelt, nogen eller 1bladet, glat. Bl. udeelte.

1 Slægt. Drosera. Soeldug.

Grifflerne 3—5. Kapselen 3—5klappet, mangefrøet, opspringende i Spidsen. Bl. omgivne med røde, hjertelbærende, irritable Randhaar. * Noden trævlet. Skafterne oprette, trinde. Bl. stilkede, concave. Blst. i en indbøjet, eensidig Klase.

1 U. D. rotundifolia. Rundbladet Soeldug.

Bl. kredebrunde. Frøene med Frøhud. $\frac{1}{4}$ F. ♀, ☉. Jul., August. 3 Torvemoser. F. D. T. 1028.

2 *A.* *D. intermedia* *Drev. et Hayn.* *D. longifolia* *Linn.* Langbladet Soelbug.

Bl. omvendt ægformig = aflange, nedløbende i en Stilk. Frøene uden Frøehud. $\frac{1}{4}$ F. 4?
Juli, Aug. S Løvemoser. Ved Sorøe. F. D. T. 1093.

Anm. Er *D. longifolia* var. *anglica* den Samme som De Candolles *D. anglica*, som kjelnes ved aflange, butte Bl. og Frøe med Frøehud?

2 Slægt. *Parnassia.* Leverurt.

5 Skjæl, 1 indenfor hvert Kronbl., som i Manden ere besatte med stilkede Kjertler. Arrene 4, fiddende. Kapselen 4klappet, trummet. Frøene midt paa Klapperne, forsynede med Frøehud. Glatte. Stgl. eenblomstret, eenbladet.

1 *A.* *P. palustris.* Hvid Leverurt.

Kronbl. næsten uden Negle. Skjællene med 9—13 Kjertler. Rodbl. hjerteformige. Stængelbladet omfattende. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Paa fide Enge. F. D. T. 584.

Uart: α) *tenuis.* Med ægformige Bl.

5 Orden.

Polygaleæ. Melkurtartede.

Væg. uregelmæssigt, dobbelt; det ydre Bladet, mindre; det indre Bladet, større, sædvanlig kronbladagtigt. Kronen uregelmæssig; Kronbl. 3—4, sædvanlig sammenvorne; Støvdragernes Stifter nedentil alle sammenvorne, ovenfor fordeelte i 2 Legemer; Støvknapperne 8, centrummede, opspringende i Spidsen. Frøegjemmet en Kapsel eller Steenfrugt, meest trummet, med Skillevægge midt paa Klapperne. Frøene eenlige, hængende. Hviden fjedret eller 0. Urter eller Halvbuske med melkagtig Saft, især i Roden. Bl. sædvanlig afværlende, ubeelte. Blst. i Klaser.

1 Slægt. *Polygala.* Melkurt.

Vægerbl. vedblivende. Kronbl. 3—5, forbundne ved Støvdragernes Rør; det nederste hjølformigt. Kapselen sammentrykt. Frøene med en Rjødvorte, uden Frøehaar. * Det hjølformige Kronbl. med en fryndset Kam. Kapselen glat. Urter. Glatte. Bl. heelrandede. 3 snart affaldende Blstbl. ved Grunden af Blstst.

1 *A.* *P. vulgaris.* Almindelig Melkurt.

Stgl. opstigende. Bl. ligebred = lancetformige. (Blst. blaae, hvide ell. røde). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj—Juli. Paa Bakker. Ved Sorøe. F. D. T. 516.

2 A. P. amara. Bitter Melkurt.

Stgl. næsten opret. Rodbl. omvendt ægformige, meget butte. Stglbl. ligebrede. (Blst. blaae). $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ F. 4. Jul. Paa Bakker. F. D. T. 1169.

6 Orden.

Caryophyllæ. Nellikeartede.

Bæg. 4—5bladet ell. 1bladet, 4—5standet. Kronbl. sædvanlig 4—5 paa en indenfor Bæg. forlænget Frugtband, sjelden 0. Støvdr. sædvanlig dobbelt saa mange som Kronbl. 1 Frugtknude. 2—5 adskilte Grifler, indvendig vortede. Kapselen oftest eenrummet. Frøene stolen i Midten. Frøene hæftede dertil ved Frøestrengene. Hviden meelagtig. Embryonet sædvanlig omgivende Hviden i Form af en Ring. Stgl. leddet. Bl. modsatte, udeelte, heelrandede. Blst. i Enden eller i Delingerne mellem Grenene. * Urter. Blst. røde eller hvide. Arelbl. sædvanlig 0.

1 Affnit.

Silencæ. Sileneartede.

Bæg. 1bladet, næsten rørformigt, 5 (sjelden 4) tandet. * Støvdr. næsten altid 10, af hvilke de 5 ofte ere hæftede til Kronbl. Stgl. trind, sædvanlig opret. Arelbl. 0.

1 Slægt. Gypsophila. Gipsurt.

Bæg. klobeformigt, kantet, næsten 5klovet. Fligene i Randen hindeagtige. Kronbl. 5, uden Negle. 2 Grifler. Kapselen 1rummet. (Nærmer sig til 2 Affnit).

1 A. G. muralis. Muur : Gipsurt.

Kronbl. ubrandede (blegrøde). Stgl. todeelt, meget grenet. Bl. ligebrede, flade, af Blomsterstilkens Længde. Blst. i Delingerne mellem Grenene, centlige. $\frac{1}{2}$ —1 F. O. Jul., Aug. Paa tørre Steder. F. D. T. 1268.

2 Slægt. Dianthus. Nellike.

Bæg. rørformigt, 5standet, med 2 ell. 4 modsatte Skjæl ved Grunden. Kronbl. 5, med lange Negle. 2 Grifler. Kapselen 1rummet. Frøene paa den ene Side flade, paa den anden hvalvede. Embryonet neppe krummet.

A. Blst. i Hoveder ell. Knipper.

1 *U. D. prolifer.* Knop; Nelliké.

Bøgerfjællene, de ydre ægformige, stivhinde, uden Stak, længere end Bæg., de indre 2, smaae, smalle. Kronbl. udrandede (blegrøde). Bl. ligebred = sylformige, glatte, i Randen røe. Blst. sammenhobede i et lidet Hoved. (Da der sædvanlig kun blomstrer 1 Krone ad Gangen, seer det ud, som om Blst. vare eenlige, med et meget tykt ægformigt Bæg.). 1—2 $\text{F. } \odot$. Jul. Paa tørre Steder. **F. D. T. 221.**

2 *U. D. Armeria.* Knippeblomstret Nelliké.

Bøgerfjællene lancetformig = sylformige, af Bøgerets Længde. Bæg. stivhaaret. Bl. næsten ligebrede, spidse, stivhaarede. Blst. i (tynde) Knipper. (Kronerne røde.) 2 $\text{F. } \odot$, $\text{F. } \text{J}$. Jul., August. 3 Krat. **F. D. T. 230.**

3 *U. D. Carthusianorum.* Kartheuser; Nelliké.

Bøgerfjællene ægformige, med Stak, kortere end Bæg. Bl. ligebrede, 3nervede. Blst. (røde), sammenhobede, dels siddende, dels stikkede, omgivne med et Svøb, som er aflangt, med Stak, og kortere end Blomsternippet. 1—1½ $\text{F. } \text{U}$. Jul. Paa sandige Steder. **F. D. T. 1693.**

B. De øverste Bl. ligebred = lancetformige, spidse. Blst. eenlige.

4 *U. D. deltoides.* Rundtakkét Nelliké.

Bøgerfjællene æg = lancetformige, spidse, sædvanlig 2. Kronbl. but savtakkede (røde). Stgl. opstigende. De nederste Bl. aflange, butte. ½—1 $\text{F. } \text{J}$. Jul., Aug. Paa Bakker, f. Gr ved Pedersborg, Lyng og Bromme. **F. D. T. 577.**

Ufart: glaucus. Med kortere og buttere Bl. **F. D. T.**

5 *U. D. superbus.* Strand; Nelliké.

Bøgerfjællene korte, ægformige, oddede. Kronbladens Plade halvfinnet, med næsten traadformige Flige (lys-violet), ved Svælget haaret. Stgl. opret, mangeblomstret, danner næsten en Top. Bl. ligebred = lancetformige. 1—1½ $\text{F. } \text{U}$. Jul., Aug. Paa Bakker; mellem Bromme Plantage og Lyng. **F. D. T. 578.**

3 Slægt. *Saponaria.* Sæbeurt.

Bæg. rørformigt, uden Skjel. Kronbl. med Negle af Bøgerets Længde. 2 Grifler. Kapselen krummet.

1 *U. S. officinalis.* Læge; Sæbeurt.

Bæg. valsførmigt. Kronbl. med Svælgrands (blegrøde). Stgl. opret. Bl. æg = lancetformige, glatte. Blst. i en halvskjermagtig Top. 1—2 $\text{F. } \text{U}$. Jul., Aug. Ved Gjerder; i Pedersborg. **F. D. T. 543.**

4 Slægt. *Silene*. *Silene*.

Stæng. rørformigt, Standet, uden Skjæl. Kronbl. med Negle, sædvanlig med Svælgfrands. 3 Grifler. Kapslerne nedentil Brummede, opspringende i Spidsen med 6 Lænder. * Stgl. sædvanlig opret, fleerblomstret.

A. Stæng. opblæst. Blst. eenlige eller i en Top.

1 *N. S. inflata* *Smith*. *Cucubalus Behen* *Linn*. Blære: Smelle.

Stæng. ægformigt. Kronbl. 2kløvede, sædvanlig uden Svælgfrands (hvide). Neglene fileformige. Stgl. grenet. Bl. sædvanlig lancetformige, glatte. Blst. i en Top. 1½ F. 4. Jun., Jul. Ved Seje og paa høje Enge. Ved Sorøe. F. D. T. 914.

Ufart: β) *angustifolia?* *Cucubalus maritimus*. Bl. ligebred = lancetformige. Stgl. nedliggende. F. D. T. 857.

B. Stgl. opret, udeelt, bladet. Blst. i Krands, samlede til 4.

2 *N. S. Otites* *Persoon*. *Cucubalus Otites* *Linn*. Smaafrøet Smelle.

Blst. tveboe. Hundblomstens Stæng. kugleformigt; Hanblomstens næsten kjælleformigt. Kronbl. ligebrede, udeelte (grønagtige). De nederste Bl. mange, spadeformige, lidt kjødede; de øverste lancetformige og ligebrede. Stgl. neppe duunhaaret. 1 F. 4. Jul., Aug. Ved Strandkanter. F. D. T. 518.

3 *N. S. viscosa* *Persoon*. *Cucubalus viscosus* *Linn*. Klæbrig Smelle.

Stæng. valseformig = kjælleformigt, 10stribet. Kronbl. 2deelte (hvide). Befrugtningsdelene meget lange. Duunhaaret, klæbrig. Bl. ligebred = lancetformige, bølgede. 1 F. 3. Aug. Ved Strandkanter. F. D. T. 1209.

C. Stæng. 10stribet. Blst. i 4, ikke modsatte.

4 *N. S. anglica*. Engelsk *Silene*.

Stæng. buget = valseformigt; dets Lænder meget lange, spidse. Kronbl. omvendt hjerteformige (hvide ell. lys = rosenrøde). Svælgfrandsens Lænder pyramidformige. ½—1 F. 6. Juli. I Korn. F. D. T. 1643.

D. Stæng. rørformigt, buget. Kronbl. 2kløvede. Klæbrig; duunhaarede. De nederste Bl. spadeformige, de øverste omtrent lancetformige. Blst. i en Top. Blstst. modsatte, korte.

5 *N. S. nutans*. Nikkende *Silene*.

Kronbl. tilbagebøjede, med en lang Svælgfrands (hvide). De øverste Bl. lancetformige ligebrede. Blst. eenfaldige, ludende. 1—1½ F. 4. Juli. Paa Bakker; paa en Bunt ved Suserup Mølle ud mod Søen. F. D. T. 242.

6 *N. S. noctiflora*. Natblomstrende *Silene* *Tr.*

Bøgerets Striber afværende aarede; Tænderne meget lange. Kronbl. fiintandede (rødlig-hvide). Stgl. grenet. De øverste Bl. lancetformige. Blst. oprette. 1—2 $\text{F. } \odot$. Jul., Aug. Som vild i Haver i Sorøe. **F. D. T.**

Ann. Den ligner meget *Lychnis dioica*.

E. Bæg. 10stribet, fjælleformigt. Blst. i Halvfjerne.

7 *N. S. Armeria*. Knippeblomstret *Silene*.

Kronbl. ombendt hjerteformige, med Svælgkrands (røde ell. hvide). Glat, paa Stgl. klæbrig. Stgl. grenet. Bl. ægformige, de øverste hjerteformige. 1 $\text{F. } \odot$. Jul., Aug. Som vild i Haver, ogsaa i Sorøe. **F. D. T. 559.**

5 Slægt. *Lychnis*. Pragtstjerne.

Bæg. rørformigt, standet, uden Skjæl. Kronbl. med Negle, ofte med Svælgkrands. 5 Grifler. Kapselen 1; ell. krummet. * Stgl. opret, bladet. Blst. i Enden.

A. Bæg. valsførmigt; fjælleformigt. Kronen med Svælgkrands. Kapselen halvkrummet.

1 *N. L. Viscaria*. Klæbrig Pragtstjerne.

Kronbladens Plade næsten udeelt (rød). Bl. ligebrede, næsten spadeformige. Blst. i en Top. 1 $\text{F. } \mathbf{4}$. Jul. Paa Bakker. Ved Suserup Mølle; ved Lyng. **F. D. T. 1032.**

B. Bæg. næsten ægformigt med korte Tænder. Kronen med Svælgkrands. Kapselen krummet. Blst. i en tvedeelt Top.

2 *N. L. silvestris Schkuhr*. *Lychnis dioica* α *Linn.* Skov: Pragtstjerne.

Blst. sædvanlig tveboe. Bæg. opblæst. Kronbladens Plade kløvet til Midten (rød). Kapslerne rundagtige. Klapperne 10, tilbagebøjede. Bl. ægformig-lancetformige, haarede. 1—2 $\text{F. } \mathbf{4}$. Jun., Jul. Paa fugtige Steder i Skove. Ved Bromme, Tersløse. **F. D. T.**

3 *N. L. dioica De Cand.* *L. dioica* β *Linn.* *L. pratensis Schkuhr*. Hvidkronet Pragtstjerne.

Blst. tveboe. Bæg. opblæst. Kronbladens Plade kløvet til Midten (hvid). Kapslerne næsten kogleformige. Klapperne 10, rette. Bl. ægformige, haarede. 1—2½ $\text{F. } \mathbf{4}$. Jun., Jul. Paa høje Enge og ved Diger. Ved Sorøe. **F. D. T. 792.**

4 *N. L. Flos cuculi*. Trævleblomstret Pragtstjerne.

Bæg. klokkeformigt, 10ribbet, Kronbl. 4fligede (røde). Stgl. næsten glat. Bl. lancetformig ligebrede. 1—1½ $\text{F. } \mathbf{4}$. Jun. Paa Enge. Ved Sorøe. **F. D. T. 590.**

C. Bæg. valsførmig; flokkeførmigt, læderagtigt, med meget lange Tænder. Kronbl. udeelte, uden Svælgkrands.

5 N. L. Githago *Lamarck*. *Agrostemma Githago Linn.* Almindelig Klinte.

Støvhaaret. Bl. ligebred = lancetførmige. Blst. langstilkede, oprette (violet = røde, sjelden hvide). 1—2 F. O. Jun., Juli, 3 Winterforret. Ved Sorøe. F. D. T. 576.

2 Af snit.

Alsineæ. Hønsedidartede.

Bægerbl. frie eller ved Grunden lidt sammenvorne. Kronbladenes Negle meget korte. * Stgl. sædvanlig svag. Blst. i Almindelighed hvide.

1 Slægt. *Sagina*. Fjirling.

Bæg. 4—5deelt. Kronbl. 4—5 ell. 0. Støvdr. 4—5. Kapselen 4—5klappet, Arummet, mangefrøet. * Glatte. Bl. næsten sylførmige. Støvdr. næsten altid 4.

1 N. *S. procumbens*. Fremliggende Fjirling.

Bægerfligene rundagtige. Kronbl. korte, butte. Stgl. liggende. Bl. ligebrede, oddede. Blstff. efter Blomstringen opstigende. 1—2 L. O. Jun., Jul. Paa tørre, udnyrkede Steder. F. D. T.

2 N. *S. stricta Fries*. Rank Fjirling.

Bægerfligene ægførmige, butte. Kronen 0. Stgl. og Blstff. oprette. Bl. næsten trinde, uden Db. 1—3 L. O. Maj, Jun. Paa Strandtuert. F. D. T. 845?

2 Slægt. *Elatine*. *Elatine*.

Bæg. 3—4deelt. Kronbl. 3—4, uden Negle. Støvdr. 3—4 ell. 6—8. 4 Grifler, med en Knop i Enden. Kapselen 4klappet, Arummet, mangefrøet. Frøene valsførmige. * Blst. 4bladede, 8hannede, eenlige i Bladhjørnerne.

Anm. Det er kun med Tvivl, at de Candolle henfører denne Slægt til *Caryophyllaceæ*. Efter min Mening burde den ifølge Griflernes og Kapslernes Beskaffenhed hellere henføres til *Lineæ*.

1 N. *E. Hydropiper*. Vidende *Elatine*.

Stgl. udbredt. Bl. modsatte. Blst. kortstilkede. 1—1 Lomm. O. Jun., Jul. 3 fersk Vand. F. D. T. 156.

2 *U.* *E. Alsinastrum.* Krandsbladet *Elatine.*

Stgl. opret. *Bld.* i Krandsf. *Blst.* stidende. 4—6 Lomm. 2. Jul. 3 rindende Vand.
F. D. T.

3 Slægt. *Holosteum.* Spidsgab.

Væg. 5bladet. Kronbld. 5, tandede. Støvdr. 3—5. 3 Grifler. Kapselen Irummet, opspringende i Spidsen med 6 Tænder. Embryonet tilbagefoldet, indenfor Hviden. *Urelbld.* 0.

1 *U.* *H. umbellatum.* Skjermblomstret Spidsgab.

Kapselens Klapper tilbagerullede. Rodbld. elliptiske, blaagraae, glatte. Stglbld. ægformige. *Blst.* i en Skjerm. Den fælles *Blststf.* klæbrig-dunet; Smaaalkene efter Blomstringen nedbøjede. $\frac{1}{2}$ F. ☉. April. Paa Agre og ved Diger. F. D. T. 1204.

4 Slægt. *Spergula.* Spergel.

Væg. 5deelt. Kronbld. 5, udeelte. Støvdr. 5—10. 5 Grifler. Kapselen Irummet, Sklappet, mangefaset. * *Blst.* næsten sylformige.

A. *Bld.* i Krandsf., med *Urelbld.* *Blst.* i en tvedeelt, udspilet Top. *Blststf.* efter Blomstringen nedbøjede.

1 *U.* *Sp. arvensis.* Almindelig Spergel.

Støvdr. 10. Frøene næsten fugleformige, med en but Rand. *Bld.* duunhaarede. $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jun.—Aug. Paa Agre. Ved Sorøe. F. D. T. 1033.

2 *U.* *Sp. pentandra.* Femhannet Spergel.

Støvdr. 5. Frøene lindseformige, vingede. *Bld.* paa Underfladen glatte. $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jun. Paa sandige Marker. F. D. T. 1930.

B. *Bld.* modsatte; de yngre i Bladhjørnet i Knipper. *Urelbld.* 0. Stgl. liggende, mod Enden opstigende.

3 *U.* *Sp. nodosa.* Knudret Spergel.

Kronbld. længere end Væg. Frøene næsten nyreformige, rynkede. Stgl. flere sammen, næsten enkelte, faablomstrede. *Bld.* næsten butte, de nederste omfædende. $\frac{1}{2}$ F. 2. Jul., Aug. Paa fugtige Steder. 3 Gruusgraven ved Vindebroehuset. F. D. T. 96.

4 *U.* *Sp. subulata.* Sylbladet Spergel.

Kronbld. af Bagerets Længde. Frøene nyreformige. Lidt haaret. *Bld.* næsten eenfædige, ligebrede, sylformige, oddede. 1—2 Lomm. 2. Jul., Aug. Paa tørre Marker. F. D. T. 858.

5 Slægt. *Larbrea*. Kløvkrone.

Bæg. 5kløvet, nedentil krukkeformigt. Kronbl. 5, 2deelte, siddende paa Bæg. Støvdr. 10, paa Bæg. Grifflerne 3—5. Kapselen 1rummet, mangefrøet, 3—5klappet. Klapperne undertiden i Spidsen fløvede. Arelbl. 0.

1 N. *L. aquatica* *St. Hilaire*. *Cerastium aquaticum* *Linn.* Vand; Hønsetarv.

Sædvanlig 5 Griffler. Stgl. tvedeelt, svag, haaret. Bld. hjerteformige, de nederste stilkede, de øverste omfattende. Blstik. efter Blomstringen nedbøjede. 1—2 F. 4. Jul. Ved Vand. I Philosophgangen; ved Vindebroehuset. F. D. T. 1337.

Num. Den ligner meget *Stellaria media*. Endskjøndt De Candolle i *Prodr.* Vol. 5, p. 566 mener, at den bør henføres til *Cerastium*, hører den dog i Følge Kronbladenes Tilhæftning og Bægerets Bestaaffenhed til *Larbrea*, og i den Tanke, at den ikke er forskjellig fra *St. Hilaire's L. aquatica*, har jeg ej villet forandre Navnet.

6 Slægt. *Stellaria*. Gladstjerne.

Bæg. 5deelt. Kronbl. 5, tvekløvede. Støvdr. 10, sjeldnere 3—9. 3 Griffler. Kapselen 1rummet, i Spidsen 6klappet, mangefrøet. * Stgl. svag, tvedeelt. Arelbl. 0.

A. Stgl. trind, med afværende Nader Haar mellem Leddene. Bld. æg- eller hjerteformige, sfjære; de nederste stilkede, de øverste siddende.

1 N. *St. nemorum*. Bredbladet Gladstjerne.

Kronbl. længere end Bægerbl. Frøene kredsrunde, sammentrykte, i Randen vortede. Stgl. opstigende. De nederste Bld. hjerteformige, de øverste æg- eller lancetformige. En tvedeelt Top. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jun. I mørke Skove. Ved Sorø. F. D. T. 271.

2 N. *St. media* *Smith*. *Alsine media* *Linn.* Almindelig Hønsesibid.

Kapslerne 6klappede, neppe længere end Bæg. Frøene næsten nyreformige, rynkede. Bld. ægformige. Frugterne nedbøjede. $\frac{1}{4}$ —1 F. 0. Høle Aaret. I Haver, Skove &c. Ved Sorø. F. D. T. 438 og 525.

Num. Støvdragernes Antal er ustadigt fra 3 til 10. Det sidste Tal er almindeligt hos de første Exemplarer.

B. Stgl. 4kantet, sædvanlig uden Haar. Bld. lancetformige eller ligebrede, alle siddende.

3 N. *St. Holostea*. Takrandet Gladstjerne.

Kronbl. ikkun fløvede til Midten, længere end Bæg. Bægerfligene lancetformige, spidse. Bld. lancetformige, i Randen besatte med fine Spidser. 1 F. 4. Maj, Jun. I Krat og ved Gjerder. Ved Sorø. F. D. T. 698. (3ffe god).

4 *U.* *St. graminea*. Græsartet Gladstjerne.

Kronbl. 2deelte, af Bøgerets Længde. Stgl. liggende. Bl. ligebrede, i Randen glatte. Blst. i en udspilet Top. $\frac{1}{4}$ —1 *F.* 24. Jun. Paa udyrkede Steder. Ved Sorø. *F. D. T.* 414.

5 *U.* *St. glauca* *Withering*. Blaagraa Gladstjerne.

Kronbl. 2deelte, længere end Bæg. Stgl. næsten opret. Bl. blaagraae, ligebred = lancetformige, i Randen glatte. Bl. ved Blst. stivhindede. $\frac{1}{2}$ —1 *F.* 24. Jun. Paa fugtige Steder. *F. D. T.*

6 *U.* *St. brevifolia* *Rafn*. *St. crassifolia* *Ehrhart?* Kortbladet Gladstjerne.

Kronbl. dybt kløvede, omtrent af Bøgerfligens Længde. Bl. lancetformige, tykke. Blst. centlige, i Bladhjørnerne, længere end Bl. $\frac{1}{4}$ *F.* 24. Jul. Paa fugtige Steder, især ved Stranden. *F. D. T.* 978.

7 *U.* *St. aquatica* *Pollich*. *St. uliginosa* *Curtis*. Sump- Gladstjerne.

Kronbl. 2deelte (Fligene stærkt udspilede fra hverandre), kortere end Bæg. Kapslerne ægformig = aflange, længere end Bæg. Stgl. næsten liggende. Bl. elliptisk = lancetformige, tynde, i Randen glatte. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ *F.* \odot . Jun., Jul. Paa sumpige Steder. *F. D. T.* 415.

7 Slægt. *Arenaria*. Sandvaaner.

Bæg. 5bladet. Kronbl. 5, udeelte. 3 Grifler. Kapselen 1rummet, i Spidsen 3- eller 6klappet, mangefrøet.

A. Kapselen 3klappet. Bl. ligebrede. Krelbl. stivhindede. * Bøgerbl. lancetformige, næsten butte, i Randen stivhindede. Blst. røde. Stgl. liggende. Blstik. efter Blomstringen nedbøjede.

1 *U.* *A. rubra*. *Alsinella rubra* *Hornem*. Rødblomstret Nørel.

Frøene kantede, næsten pæreformige, rynkede, uden Rand. Bl. ligebred = sylformige, kortere end Mellemrummene mellem Knæene. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ *F.* \odot . Jul., Aug. Paa Marker. *F. D. T.*

Ufart: β) *marina*. *Als. r. glaberrima* *Hornem*. Med glatte Bæg. og Blstik. *F. D. T.*

2 *U.* *A. media*. *Arenaria marina* *Smith*. *Alsinella marina* *Hornem*. Strand-Nørel.

Frøene sammentrykte, glatte, med en hindeagtig Rand. Bl. halvtrinde, fjødede, af samme Længde som Mellemrummene mellem Knæene. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ *F.* \odot (2?). Jul., Aug. Ved Strandbredder. *F. D. T.* 740.

B. Bøgerbl. længere end Kronbl. Kapselen 3- ell. 6klappet, omtrent af Bøgerets Længde. Blst. hvide. Krelbl. \odot .

3 *A. tenuifolia*. Smaa-bladet Sandvaaner Viborg.

Bægerbl. sylformige, sribede. Kapslerne 3klappede. Bld. sylformige, spidse. 2—4 Lomm.
 ○. Juli.

Ufart: ϵ) *viscidula*. *Alsinella viscosa* Hartmann. Smaa-bladet Morel. Stgl. og Bæg. klæbrig haarede. Paa høje Agre. F. D. T. 389 og 1754.

4 *A. serpyllifolia*. Smaakronet Sandvaaner.

Bægerbl. lancetformige, spidse, trenervede, ikke gjennemfigtige. Kapslerne ægformige, i Spidsen 6klappede. Frøene nyreformige, rynkede. Stgl. grenet. Bld. ægformige, spidse, siddende. $\frac{1}{4}$ F.
 ○. Jun., Juli. Paa tørre Marker, Diger o. s. v. Ved Sorøe. F. D. T. 977.

5 *A. trinervia*. Trenervet Sandvaaner.

Bægerbl. lancetformige, spidse, i Randen hindeagtige. Kapselen ægformig, 6klappet. Klappene i Spidsen tilbagerullede. Stgl. tynd, grenet. Bld. ægformige, spidse, stilkede, lidt randhaarede, 3nervede. Blstf. efter Blomstringen nedbøjede. $\frac{1}{2}$ F. ○, 4. Jun., Jul. 3 Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 429.

8 Slægt. *Adenarium*. Kjerstelblomst.

Bæg. dybt 5kløvet. Kronbl. 5, siddende paa Bæg., udeelte. Støvdr. 10, paa Bæg. 10 Kjerbler mellem Støvdragerne. Kapselen 3klappet, 1rummet.

1 *A. peploides* De Cand. Prodr. Tom. 3, p. 366. *Arenaria peploides* Linn.
 Strand: Sandvaaner.

Stgl. liggende. Bld. ægformige, siddende, kjødede. Blst. i Greenhjørnerne. $\frac{1}{4}$ F. 4. Maj—Juli. Ved Strandbredder. F. D. T. 624.

9 Slægt. *Cerastium*. Hønsetarm.

Bæg. 5deelt. Kronbl. 5, tvækløvede. Støvdr. indtil 10. 5 Grifler. Kapselen 1rummet, opspringende i Spidsen med 10 Tænder. * Stgl. og Bld. mere ell. mindre haarede.

1 *A. C. vulgatum* (De Cand. ?). Almindelig Hønsetarm.

Kronbl. af Bægerets længde. Kapslerne valsførmige, aflange, mod Spidsen tyndere, lidt krumme, dobbelt saa lange som Bæg. Stivhaaret, bleggøen. Bld. æg-lancetformige, butte. Blst. længere end Blstf. $\frac{1}{4}$ F. ○. Apr.—Jun. Paa hvilende Agre og Diger. Ved Sorøe. F. D. T. 1645.

Ufart: β) *glomeratum*. *Cerastium ovale* Persoon. Opret Hønsetarm. Stgl. opret. Blomstertoppen tæt, næsten hovedformig. 3 aabne Skove og paa dyrkede Steder. F. D. T. 1931.

2 *U. C. viscosum (De Cand.?)*. Klæbrig Hønsfærm.

Kronbl. af Bøgerets længde. Kapslerne trinde, dobbelt saa lange som Bæg. Klæbrig=laaden, gulagtig. Stgl. udeelt. Bl. omvendt ægformig = aflange. Blstf. i Stængelens Delinger, lidt længere end Bæg., efter Blomstringen nedbøjede. $\frac{1}{4}$ F. 4. Maj, Jun. Paa tørre Marker. F. D. T. 1211.

3 *U. C. holosteoides*. Skjermblomstret Hønsfærm.

Bæg. med stivhindet Rand, længere end Kronbl. Stgl. duunhaaret, vereblis paa den ene og paa den anden Side. Bl. aflange, glatte. Blstf. haarede, uden Hjertler. $\frac{1}{4}$ F.? ☉. Jul. Paa tørre Steder. F. D. T.

4 *U. C. semidecandrum*. Goldnaalet Hønsfærm.

Kronbl. udrandede, fortere end Bæg. 5 Støvdr. Kapslerne trinde, dobbelt saa lange som Bæg. Klæbrig=laaden. Stgl. opret. Bl. ægformige. Blstf. samlede næsten i en Skjerm, længere end Bæg., efter Blomstringen nedbøjede. 1—3 Lomm. ☉. Maj, Jun. Paa sandige Dverdrøv. 3 Bromme Plantage. F. D. T. 1212.

5 *U. C. strigosum Fries*. Stivhaaret Hønsfærm.

De indre Bøgerbl. stivhinde i Randen, sfjæggede, længere end Kronbl. Kapselen lidt krum. Graa=stivhaaret. Stgl. opret. Bl. butte, de øverste aflange. Blomstertoppen hovedformig. 2—3 Lomm. ☉. Maj. Paa tørre Bakker. F. D. T.

6 *U. C. arvense*. Størblomstret Hønsfærm.

Kronbl. dobbelt saa lange som Bæg. Kapselen aflang = cylindrisk, dobbelt saa lang som Bæg. Stgl. opstigende. Bl. ligebred = lancetformige, noget butte, lidt haarede. Blst. i en tvedeelt Top. Blstf. nedbøjede, duunhaarede. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. 4. Maj, Jun. Paa Diger og hvilende Marker. F. D. T. 626.

7 Orden.

Linæ. Hørtede.

Bøgerbl. indtil 5, før Blomstringen teglagte. Kronbl. ligesaa mange, sammenborne med Støvdragernes Ring, før Blomstringen snøede. Støvdr. ligesaa mange, nedentil sammenborne. Tænder imellem dem. Støvkapperne 2rummede. Griflerne indtil 5, hver med en Knop i Enden. Kapselen med ligesaa mange Klapper og dobbelt saa mange Rum. Frøene hængende. Hviden 0. Bl. udeelte. Krelbl. 0. Blst. stillede. * Bl. heelrandede, glatte.

1 Slægt. *Linum*. Hørt.

Bøgerbl., Kronbl. og Støvdr. 5. Bøgerbl. udeelte. Griflerne 5, fjeldnere 3.

1 *U. L. catharticum.* Bild Hør.

Blat. Stgl. opret, oven til tvedeelt. Bld. modsatte, omvendt ægformig-lancelformige. (Blst. hvide). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jun.—Aug. Paa Græsgange. Ved Gruusgraven i Hjortenas. I Sæskoven. F. D. T. 851.

2 Slægt. *Radiola.* Liinknop.

Bæg. 4kløvet, Fligene 3spidsede. Kronbld., Støvdr. og Grifterne 4.

1 *U. R. Millegrana Smith.* *Linum Radiola Linn.* Liden Liinknop.

Stgl. tvedeelt. Bld. ægformige, modsatte. 1 Somm. ☉. Jul., Aug. Paa tørre, sandige, oversvømmede Steder. F. D. T. 178.

Elatine. See 6 Orden, 2 Afsnit.

8 Orden.

Malvaceæ. Katostartede.

Bæg. 5 (sjelden 3 eller 4) kløvet; Fligene før Blomstringen sammenstødende med Randen. Kronbld. saa mange som Bægersfligene, lige store, før Blomstringen snoede, sædvanlig sammenvorne ved Neglene. Støvdragernes Stifter sammenvorne. Støvknapperne eenrummede, nyreformige, opspringende paa tværs. Flere Grifler, undertiden sammenvorne. Flere Frøegjemmer samlede omkring en Støtte. Hviden 0. Kjernestykkerne sammenviklede. Bld. afverlende, sædvanlig kløfede. 2 Krelbld. * Bæg. omgivet med et andet Bæg. Kronbld. nedentil sammenvorne, næsten fileformige. Støvdr. mange. Mange eenfrøede Kapsler sidende i en Kreds omkring Støtten. Urter. Stgl. trind. Bld. runde.

1 Slægt. *Malva.* Katost.

Det ydre Bæg. fleer (oftest 3) bladet; dets Blade næsten aflange eller bærteformige. * Bld. rundagtig; hjerteformige eller nyreformige. Blstfl. 1blomsirede i Bladhjørnerne. Blst. sædvanlig røde.

1 *U. M. Alcea.* Rosen; Katost.

Det ydre Bægers Bld. aflange, butte. Bæg. faltet. Stgl. opret. De nederste Bld. slappede, de øverste 5—7deelte, ruc. (Blst. rosenrøde). $1\frac{1}{2}$ —2 F. 4. Aug. Paa sandige Steder. F. D. T.

2 *U. M. moschata.* Moskus; Katost.

Det ydre Bægers Bld. ligebrede. Bæg. haaret. Stgl. opret. Rodbld. nyreformige, indskaarne. Stglbld. 5kløvede; Fligene finnet-mangedeelte. (Blst. lila ell. hvide). 1— $1\frac{1}{2}$ F. 4. Jul., Aug. F. D. T. 905.

3 *M. M. silvestris.* Skov; Kartoff.

Kronbl. 3 Gange saa lange som Bæg. Stgl. opret. Bl. 7lappede, spidse, oftest fastakkede. Blstf. og Bladstf. haarede. (Blst. violetagtig røde). 1½—3 F. J. Jun.—Aug. Ved Gærder, især nær ved Byer. Ved Sorøe. F. D. T. 1223.

4 *M. M. rotundifolia.* Rundbladet Kartoff.

Kronbl. dobbelt saa lange som Bæg. (ell. mindre). Stgl. liggende. Bl. hjerteformig-kredsformige, but lappede, rundtakkede. Blstf. ved Modenheden nedbøjede. Blstf. og Bladstf. duunhaarede. (Blst. lysrøde). ¼—1 F. O. Jun.—Sept. Ved Gærder, især i Byer. Ved Sorøe. F. D. T. 721.

Uart: β) *pusilla. M. pusilla Smith.* Lidet Kartoff. Kronbl. kun lidet længere end Bæg. F. D. T. 1825.

2 Slægt. *Althæa.* Althee.

Det ydre Bæg. 5—9fløvet.

1 *A. A. officinalis.* Læge; Althee.

Det ydre Bæg. sædvanlig 8—9fløvet. Bl. ægformige ell. hjerteformige, tilbeds utydelig 5-ell. 3lappede, fultede. Blstf. i Bladhjørnerne, fleerblomstrede, kortere end Bl. (Blst. blegrøde). 3—4 F. 4. Jul.—Sept. Paa fugtige Steder ved Strandbredder. F. D. T. 530.

9 Orden.

Tiliaceæ. Lindeartede.

Bæg. enkelt, næsten 4—5bladet; Bægerbl. før Blomstringen sammenslæbende med Randene. Kronbl. ligesaa mange (sjelden 0). Støvdr. frie; Støvknapperne Drummede. 4—5 Hjertler, befæstede paa Frugtindens Stilk. 1 Griffel. Kapselen fleerrummet. Flere Frøe i hvert Rum. Hviden kjødet. Embryonet opret; Kjernestykkerne bladagtige, flade. Ofteft Træer. Bl. enkelte, med Arelbl. Blst. i Bladhjørnerne.

1 Slægt. *Tilia.* Lind.

Bæg. 5deelt, affaldende. Støvdr. mange. Frugt bunden 5rummet. Frøegjemmet læderagtigt, ved ufuldkommen Udvikling eenrummet, 1—2fløvet. Basten sej.

1 *A. T. microphylla.* Smaabladet Lind.

Kronbl. uden Stjæl. Frugterne næsten fugleformige, jevne, skjøre. Bl. hjerteformig-rundagtige, tilspidse, skarpt fastakkede, glatte, i Hjørnerne af Aarerne paa Underfladen skjægede, neppe længere end Bladstilkene. 30—50 F. K. J Skove. F. D. T. 553.

Hypericineæ. Perikonartede.

Bæg. 4—5bladet ell. 4—5deelt. Kronbl. 4—5, før Blomstringen snøede. Støvdr. mange. Flere Grifler, sjelden sammenvorne til een. Frøeggenmet fleerrummet. Frøestolen enten heel, i Midten, ell. mangedeelt, saa at Stykkerne ere befæstede ved Klappernes indbøjede Rande. Hviden 0. Bl. oftest modsatte, siddende ell. forstilkede. Arelbl. 0.

1 Slægt. Hypericum. Perikon.

Bæg. 5bladet. Kronbl. 5. Støvdr. mange, nedentil sammenvorne i flere Hobe. En hindeagtig Kapsel. * Bægerbl. lige store. Støvdragernes Hobe 3. Grifterne 3. Bl. heelrandede, næsten ægformige, butte, ofte gjennemfigtig; prikkede og fortprikkede. Blst. gule.

A. Bægerbl. heelrandede. Glatte.

1 N. H. quadrangulum. Firkantet Perikon.

Bægerbl. lancetformige. Stgl. vinget=firkantet, opret. Bl. gjennemfigtig=prikkede. Blomstertoppen mangleblomstret. $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul.—Aug. I Moser. Ved Sorøe i Søeffoven. F. D. T. 640.

2 N. H. dubium Leers. (H. quadrangulum var. β De Cand.). Storbægret Perikon.

Bægerbl. ægformig=aflange, butte. Stgl. 4kantet (egentlig trind med 4, ikke hindeagtige, Ribber), opret. Blomstertoppen mangleblomstret. $1\frac{1}{2}$ —2 F. 4. Jul., Aug. I Krat. Ved Sorøe. F. D. T.

Ann. Den er upaatvibelig en egen Art, ikke en Afart af den Foregaaende.

3 N. H. humifusum. Liggende Perikon.

Bægerbl. aflange. Stgl. tvæagget, liggende. Bl. elliptiske. Blst. centige i de øverste Bladhjørner. 1—3 Lomm. 4. Jul., Aug. Paa tørre Steder. Paa Bakken ved Lille Ladegaard. Ved Vindebrohuset. F. D. T. 141.

4 N. H. perforatum. Prikbladet Perikon.

Bægerbl. lancetformige. Stgl. tvæagget (egentlig trind med 2, ikke hindeagtige, Ribber), opret. Bl. ægformig=elliptiske, butte, gjennemfigtig prikkede. Blst. i en Løp. $1\frac{1}{2}$ —2 F. 4. Jul., Aug. I Krat. Ved Sorøe. F. D. T. 1043.

B. Bægerbl. takket; fjertlede. Stgl. opret, trind. Bl. gjennemfigtig prikkede.

5 *H. hirsutum*. Laaden Perikon.

Bægerbl. ligebrede, næsten spidse. Griflerne udspilede. Stgl. stibhaaret. Bl. ægformig= aflange, nerveede, duunhaarede. Toppen lang, klaseformig. 1—1½ F. 4. Jun., Jul. 3 Skygge. F. D. T. 802.

6 *H. pulchrum*. Smuk Perikon.

Bæg. ægformige, butte. Kronen hjertlet. Glat. Bl. omfattende, hjerteformige. 1—1½ F. 4. Jul. Paa tørre Steder. F. D. T. 75.

7 *H. montanum*. Bjerg Perikon.

Bægerbl. ligebred=lanceformige, spidse. Glat. Bl. omfattende, ægformige, fint gennem= figtig=prykkede. 1—1½ F. 4. Jul. 3 Krat. F. D. T. 173.

11 Orden.

Acerineæ. Lønartede.

Bæg. eenbladet. Kronbladene af Bægerfligens Antal, oftest 5, befæstede omkring en Skive, som bærer Frugtknuden, sjelden 0. Støvdr. paa Skiven, sædvanlig 8. 1 Griffel. 2 Nr. Frugten sammensat af to 1—2fræede Vingefrugter. Frøene oprette. Hviden 0. Embryonet krumt. Træer. Bl. modsatte. Blst. i Klaser eller Halvsfjermene i Bladhjernerne. Arelbl. 0.

1 Slægt. *Acer*. Løn.

Zvekjønne og Hanblomster. Bæg. Sklovet ell. Sdeelt. Støvdr. 5—9. Bl. enkelte. * Grenene modsatte. Bl. lappede, stilkede, næsten glatte.

1 *H. Pseudo-Platanus*. Valbirk; Løn.

Støvdragernes Stifter haarede, Frugterne glatte. Bingerne noget udspilede. Bl. hjerteformige, Slappede; Lapperne spidse, ulige tandede. Klaserne hangende, tildeels sammensatte. Klasestilkken haaret. 50 F. h. Maj. 3 Skove. F. D. T. 1575.

2 *H. A. campestre*. Buskfagtig Løn.

Frugternes Binger stærkt udspilede. Grenens Bark sprukken. Bl. hjerteformige, Slappede; Lapperne but indskaarne. Klaserne oprette. 10—20 F. h. (Busk). Maj. 3 Skove. F. D. T. 1288.

3 *H. A. platanoides*. Tandbladet Løn.

Frugten glat. Bingerne udspilede. Bl. hjerteformige, Slappede; Lapperne spidse; Lænderne faa, store, spidse. Halvsfjermene næsten oprette. 30—40 F. h. Maj. 3 Skove. F. D. T.

Geraniaceæ. Storkenæbarte.

Bæg. 5bladet; Bægerbl. før Blomstringen tegllagte. Kronbl. 5. Støvdr. i een Råd, oftest 10 og ved Grunden sammenborne. Frøegjemmerne 1frøede, ikke opspringende, siddende omkring en Støtte, endende sig i en til Støtten sluttet Hale. Ved Modenheden løsne de sig fra Støtten. Frøene hængende. Hviden 0. Bl. indbyrdes modsatte eller modsatte Blststf., med Arelbl. * Urter. Stgl. trind, ledet. Bl. kløftede.

1 Slægt. Geranium. Storkenæb.

Bægerbl. 5, lige store. Kronbl. 5, lige store. Støvdr. 10, hveranden større. Kjørtler ved Grunden af de største Støvdr. Frøegjemmerne 5aler indvendig glatte. * Bl. haand; formige;lappede, sjelden fingrede. Blststf. 1—2blomstrede.

A. Fleeraarige. Blststf. eenblomstrede.

1 N. G. sanguineum. Blodrød Storkenæb.

Stgl. opret ell. udbredt, grenet. Blststf. i Bladhjørnerne, meget længere end Blststf., paa Midten med 2 Blomsterbl. Bl. modsatte, 5deelte; Lapperne 3kløvede, Smaafligene ligebrede. (Blst. røde, store). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jul., Aug. 3 Kratter og paa sandige Marker. F. D. T. 1107.

R. Fleeraarige. Blststf. 2blomstrede. Haarede, temmelig store Planter. (1—2 F.).

2 N. G. phæum. Høljekronet Storkenæb.

Kronbl. udbredte, udeelte, lidt hølgede i Randen. Støvdragernes Stifter nedentil haarede. Frøegjemmerne haarede paa tværs. Bl. Slappede, indskaaren=tandede, de øverste siddende. (Kronerne sædvanlig bruunagtig mørkerøde). 1—2 F. 4. Juni. 3 Krat. Ved et Gjærde, som gaar fra Sorøe Byeport ned mod Soen. F. D. T. 987.

3 N. G. silvaticum. Skov; Storkenæb.

Kronbl. lidt udrandede. Støvdragernes Stifter sylformige, til Midten randhaarede. Stgl. opret, glat. Bl. oftest 7lappede; Lapperne aflange, indskaaren=savtakkede. Blststf. danne næsten en Halvsjerm. (Blst. violetterøde ell. hvide). 1—1 $\frac{1}{2}$ F. 4. Jul. 3 Skove. F. D. T.

4 N. G. pratense. Eng; Storkenæb.

Kronbl. udeelte. Støvdragernes Stifter glatte, nedentil stærkt udvidede. Stgl. opret, filtet. Bl. oftest 7lappede; Lapperne ligebred=aflange, indskaaren=savtakkede. Blststf. danne næsten en Halvsjerm. (Blst. blaae). 2—3 F. 4. Jul. Paa Enge. F. D. T. 124.

5 *N. G. palustre.* Kjær Storkenæb.

Kronbl. udeelte. Støvdr. sylformige, glatte. Stgl. opstigende, med udstaaende Haar. Bl. 5—7lappede; Lapperne indstaaende=tandede. Blststf. lange, lidt haarede; Smaaestilkene nedbojede. (Blstf. rosenrøde, næsten karmosinrøde). 2—3 F. **4.** Paa fugtige Steder i Skove. I Grøften mellem Priorvænget og Philosophgangen. Ved Parnas. I Bulbjergskoven. F. D. T. 596.

6 *N. G. pyrenaicum.* Pyrenæisk Storkenæb Br.

Kronbl. udrandede, lidt større end Bagerbl. (lila ell. hvide). Frøegjemmerne uden Kam, duunhaarede. Stgl. opret, grenet. Bl. nyreformige, 7lappede; Lapperne aflange, butte, 3kløvede; Smaaestilkene 3tandede. Blomsterbl. 5deelte. 1 F. **4.** Juli. I Biergegne. Som vild ved Sorøe Akademiebygning og i Akademiehaven. F. D. T.

C. *Eenaarige*, med 2blomstrede Blomsterfilke. Haarede. Væg. aabne.

7 *N. G. molle.* Blød Storkenæb.

Væg. uden Stak. Kronbl. tvækløvede, af Bagerets Længde (lys=rosenrøde). Frøegjemmerne glatte, rynkede. Frøene jevne. Bl. nyreformige. Rodbl. 9lappede. Stglbl. 7lappede; Lapperne 3kløvede. Blststf. modsatte Bladene. $\frac{1}{2}$ —1 F. **0.** Jun.—Aug. Paa Diger o. desl. Ved Sorøe. F. D. T. 679.

8 *N. G. pusillum.* Lidet Storkenæb.

Bagerbl. uden Stak. Kronbl. udrandede (egentlig indtrykte), af Bagerbladens Længde (lila). Frøegjemmerne duunhaarede, ikke rynkede. Frøene jevne. 5 af Støvdr. ofte usfrugtbar. Bl. næsten nyreformige, 7lappede; Lapperne 3kløvede. 2—6 Lomm. **4.** Jun.—Aug. Paa tørre Steder. Ved Sorøe. F. D. T.

9 *N. G. rotundifolium.* Rundbladet Storkenæb.

Bagerbl. med Stak. Kronbl. udeelte, af Bagerbladens Længde (rosenrøde). Frøegjemmerne stivhaarede. Frøene netformig aarede. Rodbl. nyreformige, 7lappede. Stglbl. rundagtige, ved Grunden affumpede, 5lappede; Lapperne 3kløvede. $\frac{1}{2}$ —1 F. **0.** Jun., Jul. Paa Agre og Diger. F. D. T.

10 *N. G. columbinum.* Storbægret Storkenæb.

Væg. med Stak, i Randen stivhindet. Kronbl. udrandede, af Bagerets Længde (violetagtig karmosinrøde). Frøegjemmerne glatte, jevne. Frøene netformig aarede. Stgl. liggende. Bl. 5deelte, Lapperne mangedeelte, ligebrede. $\frac{1}{4}$ F. **0.** Jun., Jul. Paa Agre. Ved Sorøe. F. D. T. 1221.

11 *N. G. dissectum.* Kløftbladet Storkenæb.

Væg. med Stak. Kronbl. udrandede, af Bagerets Længde (mørk=karmosinrøde). Frøegjemmerne haarede. Frøene netformig aarede. Stgl. liggende. Bl. 5deelte; Lapperne 3kløvede, ligebrede. $\frac{1}{4}$ F. **0.** Jun. Paa Agre o. s. v. Ved Sorøe. F. D. T. 936.

D. Tenaarige, med Blomstrede Blstff. Bægerbl. sammenslødende.

12 N. G. Incidum. Skinnende Storkenab.

Bæg. pyramidiformige, kantede, rynkede paa tværs. (Kronerne rosenrøde). Frøegjemmerne paa Ryggen surede, piggede. Udeles glat. Bl. rundagtige, slappede. $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jun.—Aug. Paa gamle Mure. F. D. T. 218.

13 N. G. Robertianum. Stinkende Storkenab.

Bæg. 10kantede, med Staf. Kronbl. udeelte, dobbelt saa lange som Bæg. (rosenrøde). Frøegjemmerne glatte, netformig rynkede. Frøene jevne. Haaret. Bl. 3—5koblede; Smaaabl. 3deelt=halvsinnede, $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jun.—Aug. Paa skyggesfulde Steder. Ved Sorøe. F. D. T. 694.

2 Slægt. *Erodium*. Mejeræb.

Bægerbl. 5, ligestore. Kronbl. 5. Støvdr. 10, ved Grunden sammenvorne, de 5 golve. 5 Kjertler ved Grunden af de golve Støvdr. Frøegjemmerne 5alder indvendig skjægede.

1 N. E. cicutarium Willd. *Geranium cicutarium* Linn. Almindelig Storkenab.

Kronbl. ulige store (farmosinrøde). Stgl. liggende. Frøebld. sædvanlig slappede. Bl. sinnede; Smaaabl. fiddende, halvsinnede, indfaarne. Blstff. mangeblomstrede. 3—6 Lomm. ☉. Jun.—Aug. Paa tørre Marker. F. D. T. En Ufart T. 986.

Ufart: β) *pimpinellifolium*. E. *pimpinellifolium* Willd. Pimpernellebladet Storkenab. Kronbl. ikke længere end Bæg. Frøebld. hjerteformige, udeelte. F. D. T.

13 O r d e n.

Oxalideæ. Gjøgemadartede.

Bæg. 5bladet ell. 5deelt, ligedannet. Kronbl. 5, ligestore, for Blomstringen snoede. Støvdr. 10, sædvanligviis nedentil sammenvorne, 5 kortere, 5 længere. 5 Grifler. Urrene penselformige. Frøegjemmet drummet, en Kapsel eller et Bær. Frøene befæstede i Nummernes indre Krog, indsluttede i en kjedet Frøehud. Hviden bruskagtig kjedet.

1 Slægt. *Oxalis*. Gjøgemad.

Støvdr. nedentil sammenvorne. Frugten en Kapsel. * Bl. 3koblede, omvendt hjerteformige, heelrandede. Griflerne omtrent af de indre, større Støvdrageres Længde.

1 *H. O. stricta*. Opret Gjøgemaad.

Kronbl. udeelte (gule). Kapselen haaret. Stgl. opret, bladet. Blisff. stjermbærende, 2-6blomsfrede, af Bladens længde. $\frac{1}{2}$ F. ☉, ♃. Jul. 3 Haver. Ved Sorøe. F. D. T. 873 og 1753 (?).

2 *H. O. corniculata*. Nedliggende Gjøgemaad.

Kronbl. udrandede (gule). Kapselen glat. Stgl. liggende, grenet, rodstyvende. Blisff. næsten stjermbærende, kortere end Bladstf. $\frac{1}{4}$ F. ♃, ☉. Aug. 3 Haver. (Mon den er indenlandst?). F. D. T. 1753 (?).

3 *H. O. Acetosella*. Suur Gjøgemaad.

Kronbl. ægformige, butte (hvite med røde Aarer). Uden Stængel. Noden tandet, krybende. Bl. lidt haarede. Skafstet længere end Bladstf., med 2 Blomsferbl. ovenfor Midten. $\frac{1}{4}$ F. ♃. April, Maj. 3 Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 980.

Vicia o. a. Planter med Vertebloenster. See 2 Underklasse, 1 Afdeling, 3 Orden.

Herniaria, *Illecebrum*, *Corrigiola*. See 2 Underklasse, 1 Afdeling, 11 Orden.

Tillæa, *Sedum*, *Sempervivum*. See 2 Underklasse, 1 Afdeling, 12 Orden.

Pyrola, *Ledum*. See 2 Underklasse, 3 Afdeling, 4 Orden.

Stalice. See 4 Underklasse, 1 Afdeling, 1 Orden.

U n d e n U n d e r k l a s s e.

Calycifloræ. Bægerblomstrede.

Bæg. eenbladet. Blomsterbunden (torus α : den Deel af den udvædede Blomsterstilk, som bærer Kronen og Støvdragerne) sammenvoret med den nederste Deel af Bægeret, saa at Kronbladene og Støvdragerne synes at sidde paa Bæg. eller, naar dette er voret omkring Frugtknuden, paa denne.

1 Afdeling.

Perigynæ. Kredsfrødige.

Bægerets Rør enten frit eller voret omkring Frugtknuden; dets Krave stedse fri. Kronen sædvanlig fleerbladet. Støvdragerne i Almindelighed dobbelt saa mange som Kronbl. eller flere. Frugten sædvanlig med flere Frøe.

1 Orden.

Celastrinæ. Celasterartede.

Bæg. 4—5deelt, frit; Fligene før Blomstringen tegllagte. Kronen 4—5bladet. Støvdr. 4—5. Nrret 2, 3 eller 4kløvet. Frugtknuden omgivet med en næsten kjødet Skive. Frøegjemmet en Kapsel, et Bær, en Steenfrugt eller en Vingefrugt. Frøet hos de Fleste omgivet med Frøehud. Svanden 0 eller kjødet. Embryonet lige, langs Frøets Arel. Buske ell. Træer. * Svanden kjødet. Bl. enkelte, ikke hekrandede.

1 Afsnit.

Evonymæ. Beenvedartede.

Frøene med Frøehud, ikke ved Grunden affumpede. Kjernestykkerne bladagtige.

1 Slægt. Evonymus. Beenved.

Bæg. 4—6kløvet, fladt, nedentil bedækket med en Skive. Kronbl. 4—6, paa Skiven. Støvdr. 4—6, paa Kjertler ovenpaa Skiven. 1 Griffel. En 3—5rummet Kapsel; Skillevæggen midt paa Klapperne. 1—4 Frøe i hvert Rum. De unge Grene Afantede. Bl. sædvanlig modsatte. Blstf. i Bladhjørnerne.

1 *H. E. europæus.* Almindelig Scenved.

Kronbl. aflange, lidt spidse. Kapselens Blige butte. Grenene uden Vorter. Bl. lancet-
ægformige, fintakkede. (Blst. grønne, Kapslerne rosenrøde, Frøehuden pommerantsfarvet). 4—12 F. h.
Jun. $\text{J. Kratskove. F. D. T. 1089,}$

2 *Hffnit.*

Hiceæ. Christornartede.

Kronbl. nedentil bredere, undertiden sammenvorne. Frøegjemmet ikke opspringende.

1 Slægt. *Hlex.* Christorn.

Bl. ægformige, spidse, glindsende, bølgede, paa Lænderne og i Spidsen piggede; paa gamle
Buske mangle Piggene. Blstik. i Bladhjørnerne, korte, flermbarende. (Blst. hvide). 2—4 F. h. Jun.
 $\text{J. Skove. F. D. T. 508,}$

2 Orden.

Rhamneæ. Brietornartede.

Bægerets Rer voxet omkring Frugtknuden. Bligene 4—5, før Blomstringen sam-
menstøbende med Randene. Kronbl. ligesaa mange, (sjelden 0), afværende med Bægerbligene.
Støvdr. een indenfor hvert Kronbl. 1 Griffel. 2—4 Nr. 1 Frøegjemme. Frøene oprette,
uden Frøehud. Hviden kjedet eller 0. Embryonet lige, langs Frøets Arel. Buske. Bl.
enkelt, sædvanlig afværende, ofte med Arelbl.

1 Slægt. *Rhamnus.* Brietorn.

Frugten næsten tør ell. bæragtig, 2—4rummet; Kummene 1; ell. 2frøede. Frøene
aflange, med en dyb, nedentil bredere Fure paa Ydersiden. * Frugten bæragtig, 2—4frøet.

1 *H. R. catharticus.* Tveboe Brietorn.

Blst. sædvanlig tveboe og 4deelte. Bærret 4frøet, næsten fugleformigt. Stammen opret, med
Torne. Bl. ægformige, takkede. Blst. i Knipper. 6—12 F. h. Jul. $\text{J. Krat. F. D. T. 850.}$

2 *H. R. Frangula.* Tvefjønnet Brietorn.

Blst. tvefjønnet, 5deelte. Bærret 2frøet. Bl. aflange, heelrandede, glatte. Blst. 2—3 samlede.
4—8 $\text{F. Jun. J. fugtige Kratskove. J. Philosophgangen. F. D. T. 278.}$

Leguminosæ. Bællebærende.

Bæg. frit, sædvanlig 5spidset. Støvdr. sædvanlig 10. Støvkapperne 2rummede. 1, sjelden flere Frugtknuder, hver med 1 Griffel. Frugten en Bælle. Sviden 0. Bld. sædvanlig afverlende og stillede, med 2 Arelbld.

Papilionaceæ. Urteblomstredede: Kronen en Urteblomst. Støvdr. hæftede til det Nederste af Bæg. Rodspidsen trykket til Ridsen mellem Kjernestykkerne. Bld. enkelte eller een Gang sammensatte. * Støvdr. 10, alle sammenborne, eller oftere tredeelte 3: 9 sammenborne, 1 fri. Bællen ter. Bld. afverlende, udeelte, heelrandede eller fint tandede.

1 Affnit.

Genisteæ. Bisfartede.

Støvdr. alle sammenborne. Bællen eenrummet. Kjernestykkerne blive til Frøblade. Stgl. sædvanlig buskagtig.

1 Slægt. **Ulex.** Tornblad.

Bæg. med 2 smaae Blsbl., 2deelt; den ene Læbe 3tandet, den anden 2tandet. Bællen oval; aflang, opsvulmet, neppe længere end Bæg., med saa Frøe, laaden. Buske med torneede Grene og Bld. Blst. gule.

1 U. **U. europæus.** Opret Tornblad.

Bæg. duunhaaret; Tænderne utydelige, sammenstødende. Opret. Bld. lancetformig-ligebrede, lidt laadne. Smaagrenene lidt laadne. Blsbl. ægformige, flappe, 2-4 F. H. Jun.—Aug. Ved Gårder. Ved Kæbshuset (maaskee plantet). F. D. T. 608.

2 Slægt. **Genista.** Bisfe.

Bæg. 2læbet; Overlæben 2deelt, Underlæben 3tandet. Fanen aflang; oval. Kjølen aflang, lige, ikke ganske indsluttende Befrugtningsdelene. Bællen flad; sammentrykt, sjeldnere lidt opsvulmet, sædvanlig mangefrøet, uden Kjertler. Blst. gule. * Smaae Buske. Bld. enkelte.

A. Kjølen lidt længere end Fanen og Vingerne. Stgl. tornet. De blomsterbærende Grene uden Torne. Klaserne paa Enden af Stgl.

1 *A.* *G. anglica.* Engelsk Visse.

Bællen ægformig = cylindrisk, mangefrøet. St. Bld. ægformig = lancetformige. Tornene enkelte. Klaserne saabloomstrede. $\frac{1}{2}$ —1 *F.* *h.* Jun. Paa tørre Bakker og Heder. *F. D. T.* 619.

2 *A.* *G. germanica.* Tydsk Visse.

Bællen næsten ægformig, lidt stivhaaret, 2—4frøet. Bld. lancetformige, lidt stivhaarede. Tornene enkelte ell. greneede. 1—2 *F.* *h.* Jun. Paa tørre Bakker. *F. D. T.* 1826.

B. Uden Torne. Bld. lancetformige.

3 *A.* *G. tinctoria.* Farver; Visse.

Bællen glat. Roden krybende. Stgl. næsten opret. Grenene trinde, sribede, oprette. Bld. næsten glatte. Blst. i en arformig Klase. $\frac{1}{2}$ —1 *F.* *h.* Jul., Aug. Paa tørre Bakker og Heder. *F. D. T.* 526.

4 *A.* *G. pilosa.* Haaret Visse.

Kronen silkehaaret. Bællen buunhaaret, mangefrøet. Stgl. liggende, sribet, grenet, vortet. Bld. folbøde, paa Underfladen tiltrykt = silkehaarede. Blst. i Bladhjørnerne, fortsilkeede. $\frac{1}{2}$ —1 *F.* *h.* Jun. Paa tørre Bakker og Heder. *F. D. T.* 1225.

3 Slægt. *Cytisus.* Cytisus.

Bæg. Blæbet; den øverste Løbe sædvanlig udeelt, den nederste 3tandet. Fanen ægformig, stor. Kjølen meget but, indsluttende Befrugtningsdelene. Bællen flad, sammentrykt, mangefrøet, uden Kjertler. Nogle Bld. 3koblede.

1 *A.* *C. scoparius* *Link.* *Spartium scoparium* *Linn.* Kost; Gyvel.

Bæg. klokkeformigt. Bællen vandhaaret. Grenene kantede, glatte (altid grønne). Bld. aflange, de nederste 3koblede, silkeede; de øverste enkelte, alle aflange. Blst. i Bladhjørnerne, silkeede, eenlige (gule). 2—3 *F.* *h.* Paa sandige Bakker. *F. D. T.* 313.

4 Slægt. *Ononis.* Kragekloe.

Bæg. klokkeformigt, 5kløvet, med ligebrede Flige. Fanen stor, sribet. Bællen sædvanlig ophovnet, siddende, saafrøet. * Arelbid. vorede til Bladstf. Bld. trefoblede. Blst. næsten siddende, i Bladhjørnerne, lys; rosenrøde. Stgl. næsten urtagtig.

1 *N.* *O. altissima Lamarck. O. spinosa a Linn. O. arvensis Retzius.*

Stinkende Kragekloe.

Bøgerfligene laadne, af Bællens Længde. Stgl. opret. Grenene uden Torne, overalt laadne, lidt klæbrige. Smaaabl. aflang=lanceformige, spidse, takkede. Blst. sædvanlig parrede. 1—2 F. 4 ell. 5. Jul. Paa Marker. Paa Bakken ved Lille Ladegaard. Ved Pedersborg. F. D. T. 1584.

2 *N.* *O. spinosa.* Almindelig Kragekloe.

Bøgerfligene kortere end Bællen. Stgl. næsten liggende. Grenene i Enden tornede. Stgl. og Grene duunhaarede paa een ell. 2 Sider. Smaaabl. aflange, nedentil fileformige, lidt takkede. $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ F. 4 ell. 5. Jun., Jul. Paa Marker. Paa Bakken ved Lille Ladegaard ic. F. D. T. 783.

5 Slægt. *Anthyllis.* Rundbælle.

Bæg. rørformigt, Standet, vedvarende efter Blomstringen og da oppustet. Bingerne omtrent af Fanens og Kjælens Længde. Bællen sædvanlig ægformig og 1—2fræet.

1 *N.* *A. Vulneraria.* Gul Rundbælle.

Urtagtig, næsten opret. Bl. finne; Smaaabl. aflang=lanceformige; Endebladet størst. Blomsterhovedet ofte dobbelt, omgivet med haandformige Blstbl. (Blst. gule). $\frac{1}{2}$ —1 F. 4. Jun.—Aug. Paa sandige Marker. Ved Sorø. F. D. T. 988.

2 *N* f n i t.

Trifolieæ. Kloverartede.

Støvdr. tvedeelte (9 og 1). Bællen Irummet. Hjernefykkerne blive til Fræblade. Stgl. sædvanlig urtagtig. Bl. 3 eller 5koblede, sjældnere ulige finne. De først fremkommende Bl. ikke modsatte. * Bl. 3koblede.

1 Slægt. *Medicago.* Sneglebælle.

Bæg. næsten valseformigt, 5kløvet. Kjælen sædvanlig fjernet fra Fanen. Bællen sædvanlig manglefræet, krumbøjet (enten spiralførmig ell. seglførmig). Arelbl. ofte indskaarne. Bl. stilkede. Blst. i Bladhjørnerne, mangleblomstrede.

1 *N.* *M. lupulina.* Humteagtig Sneglebælle.

Bællen nyreførmig, 1fræet, netførmig aaret. Frøene æg-nyreførmige. Stgl. liggende. Smaaabl. omvendt ægformige, næsten fileførmige, i Spidsen takkede. Arelbl. lanceførmige. Blst. (hule) i ægformige Ar. 2—3 Lomm. ☉ ell. ♀. Maj—Sept. Paa hvilende Marker. Ved Sorø. F. D. T. 992.

Anm. Den ligner Slægten *Melilotus*, til hvilken den maaskee helst burde henføres.

2 *M. falcata*. Segl; Sneglebælle.

Bællen seglformig, temmelig glat. Frøene aflange; Rodspidsen næsten fremstaaende. Stgl. liggende. Smaaabl. aflange, i Spidsen tandede. Arelbl. heelrandede. Blst. (gule) i Klaser. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ F. Jul., Aug. Paa sandige Steder. F. D. T. 233.

3 *M. sativa*. Foder; Sneglebælle.

Bællen jevn, strueformig snæet, fint netformig aaret. Frøene uregelmæssige, ægformige ell. ufuldkommen hjerteformige. Stgl. opret, glat. Smaaabl. omvendt ægformig = aflange, tandede, obbuede. Arelbl. lancetformige, sædvanlig tandede. Blst. (blaae) i Klaser. 2 F. 4. Jun., Jul. Som vild paa Marker. F. D. T.

4 *M. minima* *Lamarck*. *M. polymorpha* var. *minima* *Linn*. Liden Sneglebælle.

Bællen strueformig, lidt laaden, fugleformig; Dmbriddene 3—5, meget smalle, fladagtige. Sammentrykte, nedentil rødede, hagede Pigge paa Bællen. Frøene nyreformige. Haaret. Stgl. liggende. Smaaabl. omvendt æg- eller hjerteformige, udeelte, i Spidsen 3tandede. Blst. 1—3blomstrede. (Blst. gule). $\frac{1}{4}$ F. Jun., Jul. Paa bratte Høje. F. D. T. 211.

2 Slægt. *Trigonella*. Trevinge.

Bæg. flokkeformigt, 5kløvet. Kjølen meget liden. Vingerne og Fanen lidt aabne, og ligne en 3bladet Krone. Bællen aflang, spids, næsten opret, mangefrøet. Det mellemste Smaaabl. stillet.

1 *M. T. ornithopodioides* *De Cand*. *Trifolium Melilotus ornithopodioides* *Linn*.

Melilotus ornithopodioides *Lamarck*. Fugleklo; Melilot.

Bællen sammentrykt, næsten seglformig, oddet, dobbelt saa lang som Bæg. Stgl. liggende. Smaaabl. omvendt hjerteformige, smaat tandede. Arelbl. lancetformige, næsten hindeagtige, meget spidse. Blst. (rødlig hvide) 2—4 sammen, næsten i Form af en Skjerm. 2—3 Lomm. O. Jul. Paa tørre Steder. F. D. T. 368.

3 Slægt. *Melilotus*. Melilot.

Bæg. rørformigt, 5standet. Kjølen omtrent af Vingernes Længde. Vingerne kortere end Fanen. Bællen længere end Bæg., 1; ell. faafrøet, neppe opspringende. Urter. Det mellemste Smaaabl. stillet. Blst. i Klaser. * Bægerets Lænder af Kårets Længde. Bællerne rynkede. Stgl. opret. Smaaabl. tandede.

1 *M. dentata Willd.* Strand Melilot.

Fanen længere end Kjølen. Bællerne tætstående, 1—2frøede, omvendt ægformige, lidt sammentrykte; den frøebærende Rand buget. Smaaabl. aflange, tæt tandede. Arelbl. fliget = tandede. (Blst. gule). 2 F. ♂. Jul., Aug. Ved Strandkanter. F. D. T. 1883.

2 *M. officinalis Willd.* *Trifolium Melilotus officinalis Linn.* Gul Melilot.

Bægerstænglerne ulige lange. Fanen lige lang med Kjølen. Bællen 2frøet, omvendt ægformig, lidt priffet. Smaaabl. lancetformig = aflange, butte, fjernt tandede. Arelbl. børsteformige. (Blst. gule). 2 F. ○. Jun., Jul. Ved Veje og i Kratlove. F. D. T. 934.

3 *M. leucantha De Cand.* *M. vulgaris Willd.* Hvid Melilot.

Bægerstænglerne ulige lange. Fanen længere endvingerne og Kjølen. Bællen 1frøet, ægformig. Smaaabl. ægformig = aflange, i Enderne afstumpede, lidt oddede, fjernt tandede. Arelbl. børsteformige. (Blst. hvide). 2—3 F. ○, ♂. Jul., Aug. Ved Strandkanter og paa Marker. F. D. T. 1705.

M. lupulina. See *Medicago lupulina* under 1 Slægt.

4 Slægt. *Trifolium.* Kløver.

Bæg. rørformigt, vedvarende, uden Kjerter, 5kløvet; Fligene sylformige. Kjølen kortere endvingerne og Fanen. Bællen neppe opspringende, sædvanlig ægformig og 1—2frøet, kortere end Bæg. og bedækket deraf. Urter. Arelbl. voxede til Bladstf. * Blst. sædvanlig i Hoveder ell. i tætte Kr., med Blstbl.

A. Aflange Kr., nedentil uden Blstbl. Bæg. laadent, ikke efter Blomstringen opblæst.

1 *T. arvense.* Harekløver.

Bæg. meget haaret; Fligene lige lange, længere end Kronen. Stgl. opret. Smaaabl. omvendt ægformige, næsten ligebrede, i Spidsen tildeels 3tandede. Arelbl. smalle, hindeagtige, nerveede, sylformige, haarede. (Kronerne rødlig hvide, men falde kun lidt i Djnene formeddelt de stærkt haarede Bægre). $\frac{1}{2}$ —1 F. ○. Jul., Aug. Paa tørre Marker. Ved Sorø. F. D. T. 724.

B. Ægformig; kegleformige Hoveder. Bæg. efter Blomstringen ikke opblæst.

2 *T. striatum.* Stribet Kløver.

Bægerets Rør stærkt nerveet, buget; Fligene smaae, ulige lange, med Stak, kortere end Kronen. Stgl. opret, grenet. Smaaabl. omvendt ægformig = aflange, i Spidsen smaat tandede. Arelbl. hindeagtige, nerveede, med en kort Spids. Hovederne tætte, i Enden og paa Siderne af Stgl., med Blstbl. neden til. (Blst. rødlig hvide.) 2—3 Lomm. ○. Jun., Jul. Paa lerede Marker. F. D. T. 1171.

C. Næsten kugleformige Hoveder. Bæg. ikke opblæst, haaret. Blst. røde.

3 *U. T. alpestre.* Skov; Kløver.

Bægerfligene vortede, smaa-piggede, den nederste kortere end Kronen, de 4 øverste meget korte. Stgl. opret, enkelt. Smaaabl. lancetformige. Krelbl. næsten fiddende, med en lang, ligebred Spids. 1 *F. 2.* Jun.—Aug. I højtliggende Skove. *F. D. T.* 662.

4 *U. T. medium.* Bugtet Kløver.

Bægerfligene lidt haarede, den nederste dobbelt saa lang som de andre, men kortere end Kronen. Kronen eenbladet. Stgl. næsten glat, lidt opret, bugtet, grenet. Smaaabl. aflange, randhaarede. Krelbl. smalle, spidse. Blomsterhovederne sædvanlig stilkede. 1 *F. 2.* Jun., Jul. I kratkove. Paa Bakken ved Lille Ladegaard. *F. D. T.* 1273.

5 *U. T. pratense.* Rød Kløver.

Bægerfligene lidt haarede, omtrent lige lange. Kronen eenbladet. Stgl. opstigende. Smaaabl. ægformige, heelrandede. Krelbl. brede, glatte, kort tilspidsede, bøjede. Blomsterhovederne næsten fiddende. 1 *F. 2.* Jun.—Aug. Paa Enge. I Philosophgangen. Ved Borod. *F. D. T.* 989.

D. Kugleformige Hoveder ell. Skjerm. Blst. efter Blomstringen nedbøjede. Bæg. ikke opblæst. Kronen vedvarende.

6 *U. T. repens.* Hvid Kløver.

Bægerfligene ulige store, tandformige, kortere end Kronen. Ballen 4frøet. Stgl. krybende, udbredt. Smaaabl. omvendt ægformig-rundagtige, lidt indtrykte, smaatandede. Krelbl. stibhindede, smalle, lancetformige, langobbede. Skjermene hovedformige, langstilkede, i Bladhjørnerne. (Blst. hvide). 1 *F. 2.* Jun.—Aug. Paa Græsmarker. Ved Sorø. *F. D. T.* 990.

7 *U. T. hybridum.* Gladhoved; Kløver.

Bægerfligene ulige store, kortere end Kåret, noget brede, meget kortere end Kronen. Ballen ikke bedækket, 4frøet. Glat. Stgl. opstigende, ikke huul. Smaaabl. omvendt hjertesformige, fileformige, smaatandede. Krelbl. meget smalle, spidse. Skjermene faablomstrede, hovedformige, stilkede, i Bladhjørnerne. (Blst. først hvide, siden rødlig). 1 *F. 2.* Jul. Paa Marker. *F. D. T.* 1706.

8 *U. T. montanum.* Bjerg; Kløver.

Bægerfligene ulige store, smalle, af Kårets længde, kortere end Kjolen. Ballen 1frøet. Duunhaaret. Stgl. opret, næsten enkelt. Smaaabl. lancetformig-aflange, butte, firtandede. Krelbl. lancetformige, noget spidse. Hovederne i Bladhjørnerne, stilkede, efter Blomstringen noget aflange. (Blst. hvide). 1/2—1 *F. 2.* Jul., Aug. Paa tørre Marker. *F. D. T.* 1172.

E. Bøgerets Overløbe efter Blomstringen større, opblæst, bedækkende Bællen.

9 A. T. fragiferum. Jordbær; Kløver.

Bæg. hindeagtigt, netformig = aaret, haaret; Fligene ulige store, kortere end Kronen. Bællen 2frøet. Stgl. liggende. Smaaabl. ægformige ell. omvendt ægformige. Arelbl. ligebrede, lange. Hovederne kugleformige, langstilkede. Blst. siddende (rødlig hvide). $\frac{1}{2}$ F. Jul. Paa Eng, især ved Strandfanterne. F. D. T. 1042.

F. Kronbl. gule, efter Blomstringen stivhinde, brune, nebbøjede. Bællen sædvanlig 1frøet. Bld. smaatandede.

10 A. T. agrarium. Humle; Kløver.

Bæg. klofformigt, kort; Fligene glatte, lange; den øverste mindst. Fanen omvendt hjerteformig. Bællen næsten ægformig, sammentrykt. Stgl. opstigende, grenet. Bld. kortstilkede. Smaaabl. aflang = ægformige, siddende. Arelbl. bladagtige, lancetformige, længere end Blst. Arene ægformige, langstilkede. $\frac{1}{2}$ —1 F. ☉. Jul., Aug. Paa tørre Marker. F. D. T. 558.

11 A. T. spadiceum. Rødderfarvet Kløver.

De nederste Bøgerflige lange, haarede, de 2 øverste meget smaae, glatte. Fanen omvendt ægformig. Bællen næsten ægformig, sammentrykt. Stgl. opret. Bld. tydelig stilkede. Smaaabl. aflang = ægformige, siddende. Arelbl. smalle, spidse. Arene langstilkede, ægformige. $\frac{1}{2}$ F. ☉. Jul., Aug. Paa Marker. F. D. T.

12 A. T. procumbens. Udstrakt Kløver.

De 2 øverste Bøgerflige meget smaae. Stgl. sædvanlig liggende. Bld. kortstilkede. Smaaabl. sædvanlig omvendt hjerteformige, det mellemste stillet. Arelbl. ægformige, randhaarede, kortere end Blst. Arene i Bladhjørnerne, ægformige. 1—2 Somm. ☉. Jul., Aug. Paa tørre Marker. Paa Bakken ved Lille Ladegaard, i Philosophgangen &c. F. D. T. 796.

β) campestre. T. campestre Schreber. Mark = Kløver. Med opret Stgl.

13 A. T. filiforme. Traadstænglet Kløver.

De 2 øverste Bøgerflige meget korte. Bællen 1—2frøet, næsten stillet. Stgl. liggende. Smaaabl. sædvanlig omvendt hjerteformige og lidt tandede, det mellemste stillet. Arelbl. ægformige, af Bladstilkens længde. Blst. haarformige; lange; Blomsterhovederne 4—6blomstrede. 1—2 Somm. ☉. Jul., Aug. Paa tørre Marker. F. D. T. 1707.

5 Slægt. Lotus. Kjellingetand.

Bæg. rørformigt, 5kløvet. Vingerne næsten saa lange som Fanen. Rjølen næbbet. Griffelen lige. Arret sylformigt. Bællen valseformig ell. sammentrykt, uden Vinger. Urter. Bld. 3koblede. Arelbl. bladagtige. Blst. i Bladhjørnerne, 1—12blomstrede.

1 *U. L. corniculatus*. Almindelig Kjellingetand.

Bæg. klokkeformigt; Fligene spidse, af Rørets Længde, meget kortere end Kronen. Bøllen cylindrisk. Arelbld. ægformige. Blstf. lange. Blstbld. lancetformige ell. ligebrede. Blomstehovederne nedtrykte, 8—10blomstrede. (Blst. gule, sjældnere gullagtig røde). 4. Jun.—Aug.

- α) *arvensis*. Temmelig glat. Stgl. næsten liggende. Smaaabl. omvendt ægformige. ¼ F. Ved Beje. Ved Sorøe. F. D. T. 991.
- β) *major (silvaticus)*. Stgl. opret, haaret, pibet. Smaaabl. omvendt ægformige, stærre. 2 F. I fugtige Skove. I Søestoven. F. D. T. 1521.

6 Slægt. *Tetragonolobus*. Vingeblælle.

Bæg. rørformigt, 5kløvet. Vingerne kortere end Fanen. Kjølen næbbet. Griffelen bugtet. Arret tragtformigt, siden med et kraat Næb. Bøllen cylindrisk, med 4 bladagtige Vinger. Urter. Arelbld. brede, bladagtige. Bld. 3koblede. Blstf. i Bladhjørnerne, 1—2blomstrede.

1 *U. T. siliquosus*. Smalvinget Vingeblælle Br.

Bøllen glat, med meget smalle Vinger. Sædvanlig haaret. Stgl. sædvanlig liggende. Smaaabl. omvendt ægformige. Arelbld. ægformige, noget butte. Blst. eenlige, langstilkede. Blstbld. omvendt ægformige, kortere end Bæg.

- β) *maritimus*. *Lotus maritimus* Linn. Strand-Kjellingetand. Bld. fjødede, glatte. ¼ F. 4. Jul. Ved Strandbredder. F. D. T. 800.

3 *Uffnit*.

Astragaleæ. Astraragelartede.

Støvdr. 2deelte (9 og 1). Bøllen formedelst en indbojet Søm Drummet ell. halv Drummet. Kjernestykkerne blive til Frøblade. Stgl. urtagtig ell. halvbuskagtig. Bld. finneede. De først fremkommende Bld. ikke modsatte.

1 Slægt. *Astragalus*. Astraragel.

Bæg. 5tandet. Kjølen but. Bøllen Drummet ell. halv Drummet ved den nederste Søms Indbøjning. * Stgl. liggende. Blstf. flørblomstrede.

1 *U. A. Hypoglottis*. Dansk Astraragel.

Bæg. haaret. Bøllen opret, ægformig-trefladet, stivhaaret. Rummene 1frøede. Haaret. Smaaabl. aflange, 16—20. Arelbld. i Begyndelsen sammenvorne, lige over for Bld. Blstf. længere end Bld. Krone hovedformige. (Blst. røde). ¼ F. 4. Jun., Jul. Paa tørre Bakker. F. D. T. 614.

2 *U.* *A. glycyphyllus.* Sød-bladet *Astragal.*

Bællen aflang = sylformig, næsten 3fladet, lidt krum, siddende, glat, opret. Temmelig glat. Smaa-*bl.* 10—12, ægformige. *Urel-*bl.** ægformige, tilspidsede. *Blstf.* kortere end *Bl.* *Urene* ægformige aflange. (*Blst.* hvidgule). 1 *F.* 4. Jun.—Aug. 3 *Krat.* Paa Bakken ved Lille Ladegaard; ved Vindebrohuset. *F. D. T.* 1108.

4 *Uffsnit.*

Hedysareæ. *Esparsetteartede.*

Støvdr. sjelden frie, ofte sammenborne ell. tveedele (9 og 1 eller 5 og 5). Bællen deelt ved Tværvægge i eenfræede Led ell. sjældnere eenfræet. * *Støvdr.* tveedele, 9 og 1. Bællen sammentrykt. *Bl.* ulige finneede.

1 *Slægt.* *Ornithopus.* Fugleklo.

Væg. omgivet med *Blst-*bl.**, rørformigt, næsten lige femtandet. Kjølen meget liden, sammentrykt. Bællen bestaaende af flere, ikke opspringende Led. *Urel-*bl.** smaae, vorede til *Blstf.*

1 *U.* *O. perpusillus.* Liden Fugleklo.

Bællen lidt sammentrykt, glat, næsten lige; Leddene rundagtige. *Blstf.* længere end *Bl.*, 2—5blomstrede. *Bl.* sædvanlig laadne; paa de øverste sidde det nederste Par Smaa-*bl.* nær ved *Stgl.* (*Blst.* hvide). 1—2 *Lomm.* *O.* Jun., Juli. Paa tørre Marker. *F. D. T.* 730.

2 *Slægt.* *Onobrychis.* *Esparsette.*

Væg. 5kløvet; *Bligene* sylformige, næsten lige store. Kjølen ligesom skjævt affumpet. *Wingerne* korte. Bællen siddende, 1leddet, sædvanlig 1fræet, den øvre Side tykkere, lige, den nedre tynd, buget. *Blstf.* i *Bladhjørnerne*, lange, arbærende.

1 *U.* *O. sativa Lamarek.* *Hedysarum Onobrychis Linn.* Foder; *Esparsette.*

Kjølen kortere end *Fanen.* *Wingerne* kortere end *Væg.* Bællen duunhaaret; *Ryggen* smaa-tandet; *Siderne* rynkede, næsten piggede. *Stgl.* temmelig opret. Smaa-*bl.* fileformig-lancetformige, oddede, glatte. *Urene* lange. 2—4 *F.* 4. Jul. Paa kalkagtig Grund. *F. D. T.*

5 *Uffsnit.*

Vicieæ. *Bikkeartede.*

Støvdr. tveedele (9 og 1). Bællen Irummet. *Kjernerstykkerne* tykke, melede, blive ikke til *Fræblade.* *Rodspidsen* krum. *Bl.* sædvanlig lige finneede.

1 Slægt. *Vicia*. Vikke.

Bæg. rørformigt, 5kløvet ell. 5tandet, de øverste Tænder kortest. Griffelen traadformig, næsten dannende en ret Vinkel med Frugtknuden, nedefor Spidsen skjægget ell. haaret paa Nedsiden. Bøllen aflang, mangefrøet. * Stgl. kantet, svag. Bld. sædvanlig med en deelt Slyngetraad. Arelbld. sædvanlig halv pilformige.

A. Blst. i langstilkede Klaser. Stgl. flattrende.

1 A. *V. dumetorum*. Krat; Vikke.

Bægertilgængene meget korte, næsten lige lange. Griffelen i Spidsen skjægget. Bøllen sammentrykt, fint netformig aaret. Næsten glat. Smaaabl. æg- eller lancetformige, tilbagebøjede, oddede, afværlende. Arelbld. tandede. Blstst. af Bladenes Længde. (Blst. lyserød-violette). 2-3 F. 4. Juli. 3 Skove. F. D. T. 1464.

2 A. *V. silvatica*. Skov; Vikke.

Bægertilgængene af Rørets Længde. Griffelen i Spidsen lidt laaden. Bøllen aflang-ligebred, sammentrykt, fint netformig aaret, i Spidsen krum. Glat. Smaaabl. mange, elliptiske-aflange, oddede, afværlende ell. modsatte. Arelbld. halv pilformige = nyreformige, med børsteformige Tænder. Blstst. længere end Bld. (Blst. hvide med violette Karer). 4-6 F. 4. 3 Skove. 3 Bullbjergskoven. F. D. T. 277.

3 A. *V. cassubica*. Casubisk Vikke.

Bægertænderne ulige store, kortere end Røret. Griffelen i Spidsen laaden. Bøllen læderagtig, netformig aaret, kort, 1-2frøet, sammentrykt, næsten glat. Smaaabl. mange, elliptiske, oddede, næsten glatte, modsatte ell. afværlende. De nederste Arelbld. halv pilformige = lancetformige, de øverste ligebrede, næsten udeelte. Blstst. af Bladenes Længde. Klaserne tætte, eensidige. (Blst. violette). 1-2 F. 4. Jul., Aug. 3 Krat. F. D. T. 1395.

4 A. *V. Cracca*. Muse; Vikke.

De øverste Bægertænder meget korte, de nederste kortere end Røret. Griffelene i Spidsen haarede. Bøllen læderagtig, netformig aaret, sammentrykt, glat. Stgl. grenet. Smaaabl. mange, aflange, afværlende og modsatte, lidt duunhaarede, oddede. Arelbld. halv pilformige = ligebrede. Blstst. mangeblomsfærdige, lige lange med ell. længere end Bld. Klaserne tætte, eensidige. (Blst. blåe). 2-3 F. 4. Jul., Aug. 3 Kratter og ved Weje. Ved Sorø. F. D. T. 804.

5 A. *V. villosa* Roth. Duunhaaret Vikke.

Bægertænderne børsteformige, haarede, længere end Røret. Griffelene i Spidsen laadne. Bøllen sammentrykt, glat. Overalt laaden. Stgl. firkantet. Slyngetraadene næsten enkelte. Smaaabl. aflange, oddede, modsatte ell. afværlende. Arelbld. halv pilformige = lancetformige, udeelte. Blstst. af Bladenes Længde. Blst. eensidige, lidt adskilte (blåe). 2-3 F. 4. Jul. F. D. T.

B. Grifflerne i Spidsen skjægede. Blst. 1—4 sammen, næsten siddende. Arelbl. halv pilsformige.

6 A. V. sativa. Foder: Vikke.

Bæg. valsførmigt; Fligene lancetförmig-ligebrede, næsten lige store, parallelle, af Rørets Længde. Bøllen sammentrykt, lidt knudret, netförmig aaret, lidt öpret. Frøene lidt fladtrykte. Smaaabl. 10—12, ömvendt ægförmige, öddede. Arelbl. tandede. Blst. 1—2, siddende (violette og røde). 1—1½ F. ☉. Maj—Jul. I Korn. F. D. T. 522.

7 A. V. angustifolia Roth. V. sativa var. Linn. og De Cand. Smalbladet Vikke.

Bæg. valsförmigt. Bøllen udstaaende. Frøene kugleförmige. Smaaabl. ligebrede, spidse, de nederste ægförmige, indtrykt-udrandede. Arelbl. tandede. (Blst. mørkerøde). 1—1½ F. ☉. Paa hvilende Marker og paa Skraaningen af Bakker. Ved Sorøe. I Bromme Plantage. F. D. T. 1340.

Anm. Den synes tilstrækkelig forskjellig fra V. sativa.

8 A. V. lathyroides. Baar: Vikke.

Bæg. valsförmigt; Fligene ligebrede, næsten lige store, parallelle, kortere end Røret. Bøllen sammentrykt, glat ell. rynket. Frøene vortede. Lidt laaden. Stgl. sædvanlig grenede. Bl. sædvanlig uden Slyngetraader. Smaaabl. 4—8, ömvendt ægförmige, indtrykte, öddede, de överste aflange ell. ligebrede, afstumpede. Arelbl. heelrandede, uden Pletter. Blst. enlige, siddende (violette). ¼ F. ☉. Apr., Maj. Paa hvilende Marker. Paa Agrene ved Skjolden. F. D. T. 58.

9 A. V. sepium. Gærde: Vikke.

Bæg. skjævt klokkeförmigt; Lønderne öventil böjede, kortere end Røret. Bøllen lancetförmig-ægförmig, næsten randhaaret, netförmig aaret. Stgl. lidt grenet. Smaaabl. 10—12, ægförmige, lidt indtrykte, randhaarede. De nederste Arelbl. tandede. Blst. 3—4, paa en kort Stilke (rødagtig-violette). 1 F. 2. Jun., Jul. I Skove. Ved Sorøe. F. D. T. 699.

2 Slægt. Ervum. Lindse.

Bæg. 5kløvet; Fligene ligebrede, spidse, næsten af Kronens Længde. Arret glat. Bøllen aflang, 2—4frøet. * Bøllen sammentrykt. Stgl. klattrende. Bl. med Slyngetraader. Smaaabl. öddede. Blst. smaae, hvide.

1 A. E. hirsutum. Laaden Lindse.

Bøgerets Flige lancetförmig-ligebrede, længere end Røret. Bøllen 2frøet, ribhaaret. Smaaabl. ligebrede, butte. Arelbl. halv pilsförmige, smalle. Blst. 3—6blomstrede, kortere end Bl. 1 F. ☉. Paa Agre. F. D. T. 639.

2 *U.* *E. tetraspermum.* Tadder; Lindse.

Bågerets Flige ulige store, temmelig brede, kortere end Røret. Bællen glat, sædvanlig 3—4fæset. Smaaabl. 4—6, aflange. Arelbl. halv pilsformig = lancetformige. Blstf. 1—4blomstrede, omtrent af Bladens Længde. 1 *Æ.* *○.* Jun., Jul. Ved Gjærder. *F. D. T.* 95.

3 Slægt. *Pisum.* Ært.

Væg. 5kløvet; Fligene bladagtige, de 2 øverste kortest. Fanen tilbagebøjet. Griffelen sammentrykt, hjælformig, oventil laaden. Bællen aflang, sammentrykt, ikke vinget. Frøene flere, næsten kugleformige; Navlen rundagtig. Cenaarige Urter. Bl. med Slyngtraader. Arelbl. store.

1 *U.* *P. maritimum.* Strand; Ært.

Stgl. kantet. Bladst. ovenpaa lidt flade. Smaaabl. 5—8, ægformige ell. rundagtige. Arelbl. halv pilsformig = ægformige. Blstf. mangeblomstrede, kortere end Bl. (Blst. violetagtig røde). 1 *Æ.* *○.* 4? Jul. Ved Strandbredder. *F. D. T.* 338.

4 Slægt. *Lathyrus.* Fladbælle.

Væg. flokkeformigt, 5kløvet, de øverste Flige kortest. Griffelen fladtrykt, oventil brede, laaden ell. duunhaaret. Bællen mangefæset. Urter med svag Stængel. Blstf. ender sig i en grenet Slyngtraad, undertiden uden Blad, oftere med 1—3 Par Smaaabl. Arelbl. halv pilsformige. Blstf. i Bladhjørnerne. * Fanen uden Tænder ved Grunden. Bællen sammentrykt. Smaaabl. modsatte. Blstf. lidt vinget. Blstf. mangeblomstrede.

A. Bl. 2koblede, sædvanlig glatte.

1 *U.* *L. silvestris.* Skov; Fladbælle.

Bællen paa langs netformig aaret. Frøene rundagtige, vortede. Stgl. vinget. Bl. ligebred-lancetformige, lidt efter lidt smallere, spidse. Arelbl. kortere end Bl. Blstf. længere end Bl. (Blst. 2farvede: rosenrøde og violette, sjældnere hvide). 3—5 *Æ.* 4. Jul., Aug. 3 Krat. *F. D. T.* 325.

2 *U.* *L. latifolius.* Vredbladet Fladbælle.

Bællen paa langs netformig aaret. Stgl. vinget. Smaaabl. ægformig-elliptiske, obdele. Arelbl. brede. Blstf. længere end Bl. (Blst. røde). 1—6 *Æ.* 4. Jul., Aug. Ved Strandbredder og i Skove. *F. D. T.* 785.

3 *U.* *L. pratensis.* Gul Fladbælle.

Væg. nervet; Tænderne næsten lige store, af Rørets Længde. Bællen paa staa netformig aaret. Stgl. 4kantet. Smaaabl. aflange ell. ligebred = lancetformige, 3nervede. Arelbl. næsten ægformige, kortere end Smaaabl. Blstf. 8—12blomstrede, dobbelt saa lange som Bl. (Blst. gule). 1 *Æ.* Jul., Aug. Paa høje Enge. Ved Sorøe. *F. D. T.* 527.

4 *U. L. tuberosus.* Knoldet Fladbælle.

Bæg. uden Nerver; Tænderne næsten lige lange, brede, omtrent af Rørets Længde. Griffelen buetformig. Bællen paa langs netformig aaret. Stgl. 4kantet. Smaaabl. aflang-elliptiske, sædvanlig oddede. Arelbl. smalle, spidse, af Bladstilkens Længde. Blstf. 3—6blomstrede, 2 ell. 3 Gange saa lange som Bld. (Blst. mørk purpurrøde). $\frac{1}{2}$ —1 F. 24. Paa Marker. F. D. T. 1463.

B. Bld. finede.

5 *U. L. palustris.* Sjævt Fladbælle.

Bægerets Flige ulige lange, næsten ligebrede, af Rørets Længde. Glat. Stgl. vinget. Bladstf. fylformig. Smaaabl. 3 Par, aflange, oddede. Arelbl. spidse, smaae. Blstf. 3—5blomstrede. (Blst. violette med rødagtig Fane). 2—3 F. 24. Jul. I Moser. F. D. T. 399.

5 Slægt. *Orob.* Glatbælle.

Bæg. flokkeformigt, 5kløvet; de 2 øverste Flige kortest. Griffelen tynd, ligebred, mod Spidsen laaden. Bællen valseformig-aflang ell. sammentrykt, mangefrøet. Arelbl. sædvanlig halv pilsformige. Bldstf. ende sig i en enkelt, lige Børste. Stilkede Klaser i Bladhjørnerne. * Griffelen knæet. Stgl. kantet ell. vinget. Smaaabl. brede, meget større end Arelbl.

A. Smaaabl. 1—4 Par.

1 *U. O. vernus.* Vaar; Glatbælle.

Bægerfligene brede, neppe saa lange som Røret. Bællen næsten sammentrykt, skjævt netformig aaret. Næsten duunhaaret. Smaaabl. 2—3 Par, lancetformige, spidse. Arelbl. heetrandede. Blstf. flere blomstrede, kortere end Bld. Blst. næsten eensidige, nikkende (violette). 1 F. 24. Jun. I Skove. I Gyrestinge Skov. F. D. T. 1226.

2 *U. O. tuberosus.* Knoldet Glatbælle.

Bægertænderne ulige store, ægformige, lidt butte, kortere end Røret. Bællen sammentrykt, utydelig aaret. Glat. Stgl. vinget-kantet. Smaaabl. 1—4 Par, oddede, prikket rynchede. Blstf. 3—4 blomstrede, neppe længere end Bld. (Blst. violette). 1 F. 24. Jun., Juli. I Krat. Paa Parnas. F. D. T. 781.

β) *tenuifolius.* Smaaabl. næsten ligebrede.

B. Smaaabl. 3—10 Par.

3 *U. O. silvaticus.* Skov; Glatbælle.

Bægertænderne korte. Bællen næsten ægformig, stillet. Stgl. grenet, liggende, stivhaaret. Smaaabl. omtrent 8 Par, æg-lancetformige, tilspidse, stivhaarede. Blstf. neppe af Bladens Længde. (Blst. hvide, med røde Aarer). 1 F. 24. Jun. Paa tørre Steder. F. D. T. 98.

4 *U. O. niger.* Sort Glatbælle.

Bægertænderne kortere end Røret. Bællen sammentrykt, utydelig aaret. Næsten glat. Stgl. grenet, kantet, bugtet. Smaaabl. 3—6 Par, elliptiske, oddede. Arelbl. ligebred-lancetformige, spidse. Blstf. længere end Bld. (Blst. violet-røde). 1—2 F. Jun., Jul. Paa skyggesfulde Steder. F. D. T. 1170.